


# OPERE ANATOMICHE, E CERUSICHE D 1 AMBROGIO BERTRANDI.



# OPERE

D I

### AMBROGIO BERTRANDI

PROFESSORE DI CHIRURGIA PRATICA NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO, MEMBRO DELLA REALE ACCADEMIA DI CHIRURGIA DI PARIGI, DELLA SOCIETA' REALE DI TORINO, E FRIMO CHIRURGO DELLA S. R. M. DEL FU RE CARLO EMANUELE

PUBBLICATE, E ACCRESCIUTE DI NOTE, E DI SUPPLEMENTI

DAI CHIRURGHI

GIO. ANTONIO PENCHIENATI

### GIOANNI BRUGNONE

PROFESSORI NELLA REGIA UNIVERSITA', E MEMERI DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

TOMO I.





TORINO MDCCLXXXVI.

PRESSO I FRATELLI REYCENDS.

Con Privilegio di S. S. R. M.





# S. R. M.

Applauso universale, con cui sono state accolte nella più colta Europa le Operazioni Chirurgi-

che di Ambrogio Bertrandi Professore in questa Regia Universuà, ha eccitato nella Repubblica Letteraria gran desiderio, che si pubblicassero anche gli altri Trattati, dal che fare non era alieno lo stesso Autore, se da morte troppo immatura non fosse stato rapito. Io, che per parecchi anni vissuo era con lui familiarmente, e che perciò dovea meglio d'ogni altro essere informato delle sue intenzioni, univa agli altrui i miei voti. Quindi tosto che l' Augusto vostro GENI-TORE, il quale già prima m' avea fatto l'onore di accogliermi più volte benignamente a' suoi piedi, e non ispregiava i miei pareri, qualunque si fossero, nelle cose di mia professione, degnossi di promuover-

mi alla stessa Cattedra, pensai di consegnargli alle stampe: ma questo mio pensiero incontrò nell'esecuzione non poche difficoltà, che non mi riusci per allora di superare; cosicche, per recarlo ad effetto, ho dovuto aspettare circostanze migliori. Queste si sono finalmente presentate fotto il Vostro Regno, o SIRE, che, siccome d'ogni scienza, e d'ogni util arte, così della Chirurgia principalmente siete sommo Protettore. Voi non solo Vi siete compiaciuto di significare tutto il Vostro gradimento, che si divolgassero questi scrivi, ma anche di conseniire, che fossero del glorioso Vostro immortal Nome fregiati. Ecco pertanto, che ossequiosamente Ve li presento parte recati a fine

sia colla scorta delle cognizioni, che da lui avea acquistate, sia con quella delle proprie offervazioni, tutti di varie note accresciuti, ed alcuni interamente composti, per non aver egli potuto porvi mano nel breve tempo, che visse. Non posso però in verun modo tacere, che, per ridurli nello stato, in cui fono, ho giudicato, nella moltiplicità de' miei affari, prevalermi dell' opra del dottissimo, ed onorato Collega Brugnoni, in cui insin da primi anni, che il praticai ancora Studente, conobbi felici disposizioni per divenire non ordinario Profesfore nell' Arte mia. Qualunque poi sia per essere l'esito di questo mio disegno, io ne sarò a pieno soddisfatto, se dalla M. V. sarà confiderato come un effetto del puro zelo, ch'ebbi in ogni tempo d'impiegarmi a util pubblico in quella scienza, cui tutto mi sono dato.

> Umiliffimo, ed obbedientiffimo Servitore, e Suddito fedeliffimo GIOANNI ANTONIO PENGHIENATI.

· ·



## RAGIONAMENTO

ISTORICO, E CRITICO

SULLA VITA, SUGLI STUDJ, E SULLE OPERE

### AMBROGIO BERTRANDI.

PPOCRATE, o chiunque fia l'Autore del giuramento comunemente attribuito a IPPOCRATE (a), faceva folennemente giu-

<sup>(</sup>a) II MERCURIALE ( nella prefazione alla fua bella edizione Greco-Laima felle Opere d'IPPOCARTE), e l'ALLERO ( Aris medica priacipes tom. 1v. pag. agr.). e lédono il giuranno dalle opere genuine d'IPPOCRATE, prima perché facendofi in effo giurare ai giovani Medici di non praticare giammai la liotomia, ma di abbandonarla vivis operatoribus hane operationem obsunishus, credono doverfi quindi dedurre, che quest' Opufcolo fia stato composto, dopo che la Medicina già era stata dività in tre parti, e destinatifi a ciascheduna parte particolari Maestri, la qual cofa non fi sece, che qualche secolo dopo IPPOCRATE, cioè a' tempi di EROPILO, e di ERASI-STRATO ( EUS. 8 prafi lib. 1); poi perchè in dely

Introduzione . giurare a' fiuoi Scolari, prima d' iniziarli nell' arte, che avrebbero tenuto quai propri fratelli germani i figliuoli del Maestro, e instruitili gratuitamente (a). Noi, che abbiamo avuto la bella sorte di avere nell' Arte Cerusica a comune Maestro il celebratissimo Ambrogio Ber-TRANDI, e che intimamente sentiamo l' eterno obbligo, che ci strigne per la paterna amorevolezza, con cui degnossi

to giuramento si proibisce il proccurare l'aborto, mentre IPPOCRATE nel lib. de natura pueri non ha roffore di raccontare di averlo egli stesso proccurato. Ma si risponde alla prima ragione, che dalle parole del giuramento in nessun modo si può conchiudere, che in que' tempi le tre parti della Medicina fossero esercitate da tre diverse persone, ma si bene che v'erano particolari operatori per la litotomia, come farebbero a' nostri di i Norcini, i quali, senza effere ne Medici, ne Cerufici, corrono per le campagne, facendo la castratura, l'emiotomia, e persino la litotomia. Si risponde all'altra con far osservare, che quel libro de natura pueri è da molti Eruditi riguardato come spurio, e che, quantunque fosse opera genuina d'IPPOCRATE, ciò niente proverebbe nel nostro caso; conciossiachè uno può dare un ortimo precetto di morale ai suoi Discepoli, e poi esso stesso non metterlo in esecuzione nell'occasione. Quel, che è certo, si è, che tutti gli Antichi attribuirono il giuramento a IPPOCRATE, tali fono GA-LENO, EROZIANO, SCRIBONIO LARGO, e moltifimi altri . Anzi dalla maggior parte degl' Interpreti credefi, che Aristofane là, dove parla del giuramento Medico, alluda a quello d'IPPOCRATE.

(a) Jurejurando affirmo ... Præceptorem quidem, qui me hanc artem edocuit , parentum loco habiturum ... giufque posteros apud me eodam loco, quo germanos frates , fore , cofque , si hanc artem ediscere volent , absque

mercede , & fyngrapha edofturum .

ammaestrarci, e indirizzare negli studi, non potendo dimostrare la nostra gratitudine inverso de' suoi Figliuoli, perchè, essendo vissuto celibe, non ne lasciò alcuno, ci eravamo fin dall' anno 1765., che Iddio il chiamo a se, determinati di usarla inverso i parti del suo ingegno, cioè inverso le sue Opere sì postume, che pubblicate prima della sua morte, con raccoglierle, ordinarle, e farvi a' debiti luoghi le necessarie aggiunte, e dilucidazioni, e poscia consegnarle alle stampe. Ci sembrava, che noi dovevamo questo figliale ufficio come alla memoria di un Precettore cotanto di noi benemerito, così pure alla Patria, la quale dalla pubblicazione, e tistampa di quelle Opere, che l' avevano in pochi anni arricchita di non pochi eccellenti Cerufici, non poteva non ritrarne fommo vantaggio, e splendore . Il nostro disegno non potè allora per certi motivi, che farebbe inutile il quì narrare, avere il fuo effetto, e fummo nostro malgrado costretti a sofpenderne l'esecuzione sino al presente. Ma fe un così lungo ritardo ci ha da una parte oltremodo afflitti, ci confola dall'altra il pensare, che il pubblico ne avrà in qualche modo il compenso, perchè possiamo ora darle corredate delle numerose, e interessanti scoperte, che fonosi

fonosi d'allora in poi fatte nella Chirurgia, e di molte osservazioni somministrateci dalla nostra pratica medesima.

Catalogo delle opere poflume del BERTRAN-

Le Opere postume del BERTRANDI unite al Trattato delle Operazioni pubblicato, mentr' era ancora in vita, fanno quasi un corso compito di Chirurgia. Sono esse distinte in tanti Trattati, che pubblicamente, e fuccessivamente dettò dalla Cattedra in questa Regia Università dall' anno 1758. fino alla sua morte. Questi Trattati, che sono de' Tumori, delle Ferite, delle Ulcere, delle malattie delle offa, delle malattie veneree, e dell' arte ostetricia, sono metodici, e chiari, fcritti in uno stile didascalico, qualche volta un po' trascurato, egli è vero, quanto alla lingua, ma affai animato, e che diletta pei fiori di eloquenza, che a tempo, e luogo fa spargervi, e per la scelta erudizione, onde sono ornati. Noi li pubblichiamo collo stesso ordine, con cui gli abbiamo cennati, avendovi aggiunto, ov' era d' uopo, delle postille, e i necessari supplementi a que Trattati, che lascio imperfetti, quali sono quelli de' tumori, delle malattie veneree, e dell' arte oftetricia; anzi perchè niente manchi al compimento di un corfo intero di Chirurgia, diamo pure un Trattato della malattie degli occhi, delle orecchie.

da noi vi fi aggiunga

della

della bocca, argomento lasciato intatto dal BERTRANDI. I fuoi Opuscoli anatomici, e Cerufici già stampati si premettono a que' Trattati; ai quali per la materia, che trattano, vanno naturalmente uniti; così alla Sezione de' tumori umorali, che tratta de' tumori caldi, facciamo precedere le Differtazioni de hepate, & de hepatis abscessibus, qui vulneribus capitis superveniunt, e a quella de tumori freddi la Dissertazione de hydrocele. Al Trattato delle malattie degli occhi mettiamo innanzi l' Ophtalmographia, e all' arte oftetricia le offervazioni de glanduloso ovarii corpore, de placenta, & de utero gravido. Quel, che è nostro, sarà messo tutto a piè di pagina, e avvertiremo a fuo luogo dei supplementi, che saremo obbligati di fare. Ne siavi chi voglia attribuire a vanagloria questo nostro procedere; è all' opposto nostra intenzione, ciò adoprando, di far sì, che il Lettore non attribuifca all' Autore i nostri errori. A ciaschedun Trattato si premette un breve estratto delle cose più essenziali conte-nutevi: prima però abbiam creduto cosa convenevole di dare un fuccinto ragguaglio della vita, e degli studi del BER-TRANDI, e del giudizio portato dai Let-terati fulle Opere da lui medefimo pubblicate.

Nascita del bertran-DI,

Gioanni Ambrogio Maria BERTRANDI (a) nacque in Torino ai diciaffette di Ottobre dell' anno 1723 (b). Il suo Padre Giuseppe era un semplice, e meschino Flebotomista, e Barbiere; ma la fua Madre Vittoria SERRA, comecchè povera dei beni di fortuna, era però ricca di senno, e di sodo giudizio, donna onesta, laboriosa, ed economa, la quale fuppliva col lavoro delle fue mani al poco guadagno, che il marito ritraeva dalla fua professione, insufficientissimo al mantenimento della numerosa famiglia, cioè di quattro figlie, nostro Ambrogio, alla cui educazione vegliava attentamente. Dall' affidua follecitudine di questa ottima Madre, più

<sup>(</sup>a) Tal è il fuo nome intero, non già Domenico Ambrogio, come per errore scrive il eruditissimo signor Conte Bava di San Paolo a pag. 6. del suo Elogo storico di Ambrogio BERTRANDI stampato in Vercelli il anno 1782. in 8.

<sup>(</sup>é) Noi abbiamo ricavate quefle notitie dal Libro autentico de Bartefini renuto nella Chiefa Metropolitana di S. Gioanni, nella quale il Bertrando.

Corregganfi adunque e il Signor Louss (Éloge hifiorique de Mr. Ambrojfe Bertrando I Turin 1967, 8.) e il lodato signor Conte, i quali il fanno nafecre l'anno 1977, amendue ai 18. di Ottobre. Il
precifo anno della nafcita è indicato dall' ELOY
[Diffionaire hisforique de la Medicane tom. 1988 399.), e dal signor PORTAL (Hisfore de l'Anatomic, 6 de
la Chiungie tom. v. pga, 343.), fostamene ne mettono, come gli altri, il giorno ai 18. di Ottobre, che fu ai 17.

che da quella del Padre, uomo idiota anzi che no, e poco curante, ha fempre riconofciuto il grato, e amorevole Figliuolo l'inclinazione, che mai fempre ebbe alla virtù, e allo studio, e al procacciarsi col bene oprare un nome durevole.

Seppe egli fin da giovanetto distin- suoi studi guersi nelle classi inferiori fra i suoi coe- nelle Be tanei, ed uguali per la vivacità, ed acu- nella Filome del suo ingegno; e dopo avere apprese fondatamente le lingue Latina, ed Italiana, e fufficientemente la Greca dieffi allo studio della Logica, della Geometria, delle Matematiche, e della Fifica, fenza obbliare l'Eloquenza, nelle quali scienze tutte fece egli sì rapidi progressi, che si meritò l'universale applauso della Reale Università, e l'amore di tutt' i Professori, e principalmente del Padre Garro Religioso de' Minimi, che vi occupava allora la Cattedra di Fifica

Finiti questi studi preparativi, bisognava applicarsi a qualche scienza particolare, e scegliersi uno stato. La poverta, ond erano oppressi i suoi Parenti, loro non permetteva di poter fare le spese occorrenti si per continuare gli fludi, che per ottenere i gradi, a qualunque scienza si fosse egli addetto . Esti perciò l'avrebbero volentieri desti-

sperimentale.

BEATRANDI TUM. TOM. I.

Vuol entrare nel chioftro tra i Minumi.

nato allo stato Ecclesiastico, perchè in questo più, che in qualunque altro, era facile di ottenere dalla Reale Munificenza dei sussidj, che avrebbero servito e per se, e pel figliuolo. Questi però, se pur dovea abbracciare quello stato, voleva abbandonare affatto il fecolo, ed entrare nel Chiostro tra i Minimi, invaghitosene per le accoglienze, e forse anche per le persuasioni del nominato Padre GARRO; e per tal fine studio trattanto per due anni la Teologia. Mentre i Parenti, i quali, se va a sequestrarsi nel Chiostro, si vedono interamente frustrati delle speranze, che hanno in eslo fondate pel fostegno della loro vecchiaja, si sforzano con tutt' i mezzi possibili di distorlo da quella determinazione, e sono tuttavia incerti a che farlo applicare, eccoti che la generosità di un loro Amico viene a trarli d'ogni incertezza, e timore, con rifolvere il Figliuolo allo studio della Chirurgia, e con fomministrargli tutt' i comodi per riuscirne un valente Professore; intendiamo parlare di Sebastiano KLINGHER Senese, allora Professore di Chirurgia, e Cerufico del Re, uomo dotto, e virtuoso, peritissimo della sua Arte, i cui Trattati Cerusici, dettati con non ordinaria precisione, e chiarezza, e con purità di lingua, corrono

N'è diffolto dal KLIN-GVER, il qual lo perfuade allo fludio della Chirurgia; e lo fa entrare nel Real Collegio delle Province. ancora manoscritti per le mani dei dotti, e si fan leggere con piacere. Siccome i Professori hanno il dritto di nominare uno Studente per Alunno nel Real Coldelle Province, se ne valse il KLINGHER a benefizio del BERTRANDI. destinandolo per la Chirurgia.

Appena entrato in quest utilissimo sta- Vi si applibilimento del Re VITTORIO AME-DEO II., con tanto fervore fi mife nella intrapresa carriera, e principalmente mostrò tanta inclinazione per la Notomia, che tirò a se gli sguardi tutt' i fuoi Superiori , e forpassò in breve tutti gli altri Studenti: facevasi sovra tutto ammirare colla sua facondia nel conversare, e coll'acutezza, e prontezza del fuo spirito nello sciogliere ex abrupto ogni più astrusa quistione, che gli fosse proposta: non passava giorno, che non isparasse qualche animale o vivo, o morto, e che non portasse dallo Spedale a cafa qualche pezzo di cadavere umano; fempre ne avea la camera guernita, e piene le saccocce persino a tavola. Tre anni dopo fu fatto Ripetitore E fatto Rid' Anatomia, e l' anno feguente, effendo morto quello di Pratica, dopo averne recitata una eloquente Orazione funebre, fu nominato al fuo luogo, ficchè ebbe poi egli folo le due cariche di Ripetitore di Anatomia, e di Pratica,

ca con gran mente alla

E delle In-

che fogliono conferirsi a due diversi soggetti; anzi tanta era la stima, che si aveva del suo sapere, e della sua facilità nel discorrere con molta eleganza in Latino, che gli fu anche conferita la carica di Ripetitore delle Instituzioni di Medicina, che si suol dare ai migliori fra gli Studenti Laureandi di Medicina, non mai a quelli di Chirurgia (a).

flituzioni Mediche .

> Era il BERTRANDI debitore di tutti questi riguardi, e distinzioni al perspicace avvedimento del Dottor Collegiato Francesco CARAMELLI allora Prefetto della Facoltà Medico-Cerufica nello steffo Real Collegio delle Province, epperciò fuo immediato Superiore . Era il CARAMELLI uomo dotto, e molto in-

<sup>(</sup>a) Bisogna qui correggere un equivoco scappato al signor Louis (pag. 10. del suo Elogio), il quale dice, che Mr. Bertrandi en moins de deux ans / (dopo esser entrato in Collegio) dévint Préset de sa Faculté, e ai signori PORTAL, ed ELOY, i quali, dopo aver copiato il Louis riguardo alla pretefa Prefettura, foggiungono: Et bientôt après Répétiteur de pratique, quasi che l'impiego di Presetto di Chi-rurgia, o di Presetto del Collegio di Chirurgia sosse inferiore a quello di Ripetitore. Vuolfi dunque fapere, non esservi presso di noi alcun impiego, che porti il titolo di Presetto di Chirurgia, ma bensi quello di Prefetto di Medicina, che è un impiego, che si conferisce dal Re nel Collegio delle Province sempre a un Medico già laureato, e che mai non ebbe il Ber-TRANDI; bensi ebbe quello di Riperitore, che fi dà dal Governatore di quel Collegio agli Studenti, che più si distinguono colla loro saggia condotta, colla loro applicazione, e riuscita nello studio.

gegnoso, affai versato nella Geometria. e in tutte le parti della Fisica. Già, prima che il BERTRANDI intraprendesse lo studio della Chirurgia, avea egli composto cinque ragionamenti, ne quali cer-cava di spiegare l'uso della milza, del timo, de' reni succenturiati, e delle mammelle nell'uomo, e stava lavorando attorno diversi altri punti difficilissimi di Fisiologia, come circa l'uso della placenta, e circa la circolazione del sangue ec. Per quanto speciose sossero le conghietture del CARAMELLI, potevano però riguardarsi, come tante altre di belli spiriti, quai sogni d'un uomo, che vegghia, se non erano appoggiate sulla struttura delle parti. Il BERTRANDI, cui il CARAMELLI fece leggere quelle Differtazioni, le trovò ben ragionate, ma lo configliò a non fidarsi a quelle apparenze di verità, e di esaminar prima esattamente, se l'Anatomia niente diceva in contrario, e si esibì di fargli esso stesfo le necessarie preparazioni. Si accinse all' opra il giovane, e destro incisore, e fra le cinque differtazioni soltanto quella de lienis usu gli sembrò fiancheggiata da fode, e vere ragioni anatomiche, ond' essa sola si mandò per le stampe a Pavia nel 1746. (a): Eam, in qua de lie-

Ajuta il CA-RAMELLI nella compofizione di varj Opufcoli filiologici,

E principalmente di uno full'ufo della milta.

<sup>(</sup>a) Eccone il titolo, che noi portiamo tutto inpero, perchè di questo libricciuolo non fanno men-

ne agitur, delegi ( dice il CARAMELLI nella Prefazione).... hac præsertim de caussa, quod hanc viro sapientissimo ( e intende parlare del BERTRANDI ) quique apud me plurimum valet, nuperrime probari intellexi. Già lo SCHEL-LAMMERO (a), lo STUKELEY (b), e il DUVERNOY (c) aveano riguardata la milza quale scaricatojo del sangue; già il celebre LIEUTEAUD (d) avea fatto offervare, com' effa, quando il ventricolo è disteso, resti picciola, e quando è vuoto; divenga turgida, e grossa; niuno però meglio del CARAMELLI, nè con più forti argomenti ha dimostrato, che quell' alterna turgescenza, e impicciolimento della milza fono prodotti dal fangue, il quale, nel tempo che il ven-

Breve anslift de quest' opujcolo.

zione ne l'Allero, ne il Portal, ne alcun altro Bibliografo, che noi fappiamo: De lienis ufu, & de mira phialarum quarmdam viterarum diffatione Differtationes, Audore Francifo Caramella Taurinenfi, Medicina Collegio Doftore, ejudiemanu Facultatis in Regio Provinciarum Collegio Profetto. Ticnii Regii na apud Joannem Benedictum Rovedinum in via nova fub figno Jfu, fenza data di anno, ma che fappiamo dal Bertrando de hopotamo del distro della rota (2) pag. 11. della fua Differtazione de hopate effere del 1346.

tricolo è pieno, e dilatato, portafi in

questo

<sup>(</sup>a) Introductio in Physiolog. pag. 224. (b) In una fua Opera Inglese intitolata Anatomia della milza Londra 1723. in sol.

<sup>(</sup>c) Academ. Petropolit. 10m. IV. pag. 162. (d) Histoire de l'Academ. Royale des Sciences de Paris. 1733.

questo sacco in copia molto maggiore, che quando è ristretto, e contratto. Ora il fangue, che dall' arteria celiaca dovrebbe per mezzo delle stomaciche esfere spinto nel ventricolo, portasi per la splenica nella milza, che ne rimane perciò gonfia. Queste alterne dilatazioni, cui va foggetto questo viscere spugnoso, crede il BERTRANDI essere la cagione, per cui vi si osservano sì frequentemente tante incifure, e scissure (a). Ella è stata veramente una gran perdita per la Repubblica Letteraria, che il CARAMELLI nel fiore della fua età, è nel mezzo de' fuoi lavori scientifici siaci stato rapito dalla morte: il BERTRANDI non cesta di compiangerlo in più luoghi delle sue Differtazioni de hepate, & oculo.

Tra gli altri punti fisiologici presi a Compone, illustrare dall' acuto CARAMELLI uno era una quello della vista; e conciossiachè nel 1745. dovesse egli pubblicare su ciò le fue idee col titolo di nuova Teoria sull' Ottica, il BERTRANDI compose allora, e lesse pubblicamente nel Real Collegio delle Province l'accennata fua Differtazione full'occhio intitolata Ophtalmogra-

<sup>(</sup>a) Nella sua Dissertazione de hepate pag. 11.

phia (a), la quale però non vide la luce, che nel 1748. Chi nol sapesse, mai non s' indurrebbe a credere, effer deffa lavoro di un giovane Anatomico appena giunto all'età di 22. anni, il quale solamente da due anni indietro si fosse addetto alla diffecazione de' cadaveri umani, e de' bruti; vi brillano l' ordine non meno, che l'efattezza delle descrizioni. la varia erudizione, e il buon giudizio nel sapere scegliere i migliori fra i punti controversi. L'ALLERO (b), ed il POR-TAL (c) ne fanno grandi elogi, e il celebre Zinn (d) mostra non poco rammarico di non aver potuto proccurarfela per fervirsene nella bellissima descrizione, che ci ha poi data dell'occhio umano. Fa il BERTRANDI offervare, che, quantunque la figura del bulbo fi accosti nell' uomo a quella di un globo, fuol effere

Analifi di questa distertazione.

> (a) Hae dissertatio (dic'egli pag. 66. nota † ) conferipta surest antecederet novam Optices theoriam, quam prope diem editurus erat ingeniossimus, saque dostissimus Amicus meus Franciscus CARAMELLI, cujus mortem adhue lugent omnes boni 6e., e pag. 49. nota † Hanc dissertationem in Regio Provinciarum Collegio jam recitaversm ab anno 1747., dum citam ophalamotomiam.

peragebam.

(f) Method. stud. medici tom. 1. pag. 563. dell' edizione di Venezia, e Bibliotheca Anatom. tom. 11. pag.

però

<sup>(</sup>c) Histoire de l'Anatomie, & de la Chirurgie tom. E;

pag. 434.

(d) In più luoghi del suo libro de oculo umano.

però quasi sempre alquanto più lunga, che larga; che nei capretti, nei buoi, e nei cavalli effo bulbo è meno convesso posteriormente, che anteriormente, che negli uccelli è piano anteriormente, e ne' pesci tanto anteriormente, che posteriormente : infine che nell' uomo medefimo è fempre più, o meno appianato nel fito della sclerotica, dove vengono a inferirsi i tendini de' muscoli retti. Dimostra, che, se nell' uomo la circonferenza della cornea lucida non è esternamente affatto circolare, ciò dipende dall' avanzamento irregolare fopra di essa della congiuntiva: fa vedere. ch' effa cornea è sempre più sottile nel centro, che verso la periferia, e ne descrive maravigliosamente l' elegantissima rete fibrofa. Degno di effere letto è maffimamente quanto scrive sulla moltiplicità, e fulla conformazione degli occhi ne' diversi insetti: sostiene, contro il sentimento di varj Anatomici, effere piana, e non convessa l'iride: nega l'esistenza delle glandule nella coroidea fuppostevi dal MERY, e dice con molta probabilità, effere forse stati presi per glandule alcuni piccoli nodi, o varici di quella vascolosissima tunica, massime che in un cane mastino, cui avea allacciato la vena jugulare di un lato, trovò moltiplicate dette varici full' occhio dello stef-

so lato, mentre non se ne offervarono dall' altro lato. Cosa v' ha di più esatto, e di più fino, che la descrizione, che fa del corso, e dell' intreccio de' vasi sanguigni arteriosi, e venosi, che scorrono per la medesima tunica, e da questa passano nella sclerotica, e sull' uvea, formanti que' bellissimi cerchi vascolari attorno il ligamento cigliare? Chi non ammira la sua pazienza, e destrezza nell'aver faputo, e potuto feguitare il corfo de' vafi pellucidi, ch' egli allora credea arterie, e vene linfatiche, i quali dice, che dalla coroidea, e da que'cerchi si rislettono sulla retina, e sulla capfula cristallina? E acciocchè ognuno potesse ugualmente scoprirli, e vederli, indica i mezzi, onde si è servito, per rendergli apparenti, accertandoci, effere così poco immaginaria la descrizione, che ne ha data, che anzi ella è molto inferiore a quel, che ha veduto: Nos certe singula, qua vidimus ( dice egli ) minus luculenter, quam videre contigit, descripsimus. Basti questo piccolo saggio in prova della bontà di questo sucoso discorso, del quale inoltre il citato AL-LERO (a) raccomanda la lettura a chi defi-

<sup>(</sup>a) Method. fludii medici pag. 417. della citata edizione.

defidera d'informarsi delle principali diftribuzioni de' diversi rami della prima branca del quinto pajo de' nervi; che quì il BERTRANDI è veramente originale, da che niente avea potuto imparare dalla descrizione dello stesso nervo, che nell' anno medesimo 1748. ne pubblicò il chiarissimo MECKEL (a).

Mentre con tanta affiduità lavorava pel fuo Amico, pei fuoi allievi, e pel pubblico non tralasciava però di occuparfi intorno agli studi del rimanente dell' Anatomia sì istorica, che pratica, e di tutte le parti della Chirurgia, di esporsi con onore ai diversi esami privati, e pubblici, prescritti dalla Legge intorno tutte quelle materie, per ottenere il libero esercizio della professione. Non ignorava egli, che questi esami sarebbero stati a suo riguardo tanto più rigorosi, quanto maggiore era la fama, che già per tutta la Città correva della fua dottrina, fama, che in certi spiriti bassi avea eccitata gelosia, come dicesi, di mestiere, oltre che non avea egli penfato a cattivarsi l'animo de' Cerusici. che doveano esaminarlo. Ma in que' diversi cimenti seppe egli con tanta pre-

Prende con applaufo tutti gli efami, ed è aggregato al Collegio di Chirurgia.

<sup>(</sup>a) Joannis Friderici MECKEL Traflatus Anatomicophysiologicus de quinto pare nervorum cerebri. Gottingæ 1748. in 4,

cifione, e prontezza foddisfare a tutte le questioni fattegli, che l' invidia dovette tacere, e confumarii dentro se stessa, e quegli stessi, che più erangli indisposti contro, acclamarlo a voci unanimi. Così su aggregato al Collegio di

Chirurgia nel 1747.

Avea egli infatti bifogno di tutto quel capitale di scienza, per tirarsene decorofamente; poichè di que giorni avea avuto la difgrazia di perdere, come si è detto, per morte il CARAMELLI, e per diffenfioni nate per le ragioni, che diranno, la buona grazia del BIANCHI, i quali avrebbero potuto in quell'occafione proteggerlo, raccomandarlo, ed effergli di grandissimo aiuto. Appena il BIANCHI avea avuto notizia dell' abilità del nostro Ambrogio nell' arte di tagliare i cadaveri, che l'attirò a se con molte carezze, e regali: ne' tempi fcolastici il volea quasi sempre in casa per commenfale, e nelle vacanze feco lo conduceva in villeggiatura: dell' opera sua si serviva per preparare le diverse parti, di cui abbifognava per la quarta edizione, che meditava, della sua Storia epatica, e per le altre opere anatomiche, e fisiologiche, che stava lavorando. Furono d'accordo, ed Amici per alcuni anni; ma quando il BIANCHI volle obbligarlo a tradir la verità, onde avere

E' chiamato dal BIAN-CHI, accarezzato, e regalato.

effo in rottura, e' per-

avere un appoggio in fuo favore nelle viene con note querele tra esso insorte, e il Mon-GAGNI, il BERTRANDI, cui era bensì cara, anzi lucrosa, e quasi necessaria l' amicizia del BIANCHI, preferì da vero Filosofo la verità all'amicizia, e all' interesse, e si allontanò da chi cercava tiranneggiargli lo spirito, e il cuore: se ne allontano fenza far motto, nè lagnarsi, e continuò e in particolare, e in pubblico, e a voce, e in iscritto a mostrarsi grato de' benefizj ricevuti, sempte chiamandolo suo stimatissimo, e amantissimo Maestro. Sentasi ciò, che ne dice a pag. 88. dell' Ophtalmographia: Plura adhuc de lacrymalibus dudibus mihi superessent dicenda, quæ tamen prætereo, utpote Præceptori meo reservata; cujus certe opera de hisce ductibus historiam anatomico-pathologicam numeris omnibus absolutam habebimus cum iconibus, quæ certe non improbabuntur; mea enim diligentia, & industria, qua utebatur amantissimus Præceptor, non exigua, ni fallor, fuit in præparandis partibus ex optimis cadaveribus (a).

<sup>(</sup>a) Nè la quarta edizione della Storia epatica, nè la dissertazione fui condotti lagrimali qui accennata dal nostro Autore non sappiamo, che siansi mai dal BIANCHI pubblicate

Terminarono col finire dell' anno scolastico 1747. i sei anni di stanza nel Collegio assegnati dai Regi Statuti, e dovea il BERTRANDI uscirne, e andarsi a procacciare il vitto coll' esercizio della fua professione; ma l'Abate di RICCAL-DONE de' Marchesi di Melazzo, allora Governatore di esso Collegio, conoscendo il bisogno, che avea di un tanto soggetto per l'instruzione de Candidati di Chirurgia, facilmente ottenne dal Re la permissione di continuare a ritenervelo per Ripetitore di Chirurgia pratica, coll' obbligo inoltre d' instruirgli anche nella Geometria, e nella Fisica. Vi dimorò ancora per due anni, ne' quali vieppiù si esercitò nella dissecazione sì umana, che comparativa, nelle operazioni Cerusiche sopra i cadaveri, e nella pratica col fempre frequentare lo Spedale. Nelle vacanze dello stesso anno 1747. egli compose la sua Dissertazione ful Fegato, che pubblicò l'anno seguente insieme con quella sull' occhio, amendue dedicate a S. E. il Cardinal delle LANZE allora Grande Limofiniere S. M., dal quale il BERTRANDI ricavava di tanto in tanto dei fusfidi per fe, e pei Genitori (a). Il ragionamento

Pubblica una differrazione ful fegaro.

<sup>(</sup>a) Eccone il titolo: Ambrofii BERTRANDI dissersationes anatomica de hepate, & oculo. Augusta Tauri-

Analisi di

ful fegato fu dal Pubblico accolto cogli stessi elogi, che l'altro sull'occhio. Multa hic utiliter docet, dice l'ALLERO (a), come l'aver offervato fullo stesso soggetto, oltre la milza ordinaria, altre due piccole milze; l'origine dell'arteria epatica dall' aorta immediatamente : la mancanza della vescichetta del fiele in una donna : il folco fcolpito nella faccia posteriore del pancreate verso il suo margine superiore, per ricevere la vena fplenica, di maniera che, quando il pancreate è scirroso, questa vena restando compressa, la milza acquista un groffissimo volume: le anastomosi non tanto frequenti delle vene spermatiche, e perfino di quelle del pene, e della prostata coll'emorroidale interna: però affolutamente le anastomosi delle vene dell' utero colla stessa emorroidale supposte dallo STAL, perchè favorivano la sua ipotesi, al qual proposito fa ottimamente riflettere, che per lo più s'ingannano, quando theoretici Scriptores ad sua theoria ideam humani corporis fabricam sine Anatome accommodant . Prova contro l' EISTERO, che dalla vena ombilicale, prima d'inferirsi

norum 1748. in 4., e non in 8., come per errore mette l'Allero (Biblioth. anatom. tom. 11. pag. 429.)
(a) Bibliotheca anatom. loc. cit.

vena-porta, anzi dallo stesso condotto venoso spargonsi nella sostanza del fegato non pochi rami: ci afficura di aver veduto più d'una volta le vene epatiche sboccare nella vena-cava, dopo che questa avea già oltrepassato il diaframma. Sostiene con moltissimi argomenti cavati dall' Anatomia comparativa, dai morbi, dall'autorità di non pochi valenti Anatomici, e dalla propria sperienza l'esistenza de' condotti epatico-cistici; infine dà un' esattissima descrizione del ligamento fospensivo del fegato, e della fua capfula. Troppo fecco però ci pare il giudizio, che ne dà il PORTAL (a), il quale dice, che la description, que l'Auteur donne des ligamens du foie, est ce qu'il y a de meilleur dans cette Thele . L' ALLERO foggiunge, che il BERTRANDI confuta la struttura glandulosa di questa viscera, e il PORTAL, che vuole aggiungere qualche cosa all' analisi dell' ALLERO, che per lo più copia fenz' andare a consultare gli originali : Il nie (dice ) qu'il y ait des glandes dans le foie, mais il ne le prouve pas. Ma il BERTRANDI, dopo

Non è vero, che neghi affolutamente la firuttura glandulofa del fegato.

avere ne' tre ultimi paragrafi addotte le

<sup>(</sup>a) Histoire de l'Anatomie, & de la Chirurgie tom. F.

ragioni del MALPIGHI, che credeva il fegato glanduloso, e quelle del Ruischio, che lo voleva semplicemente vascolare, non si mette di alcun partito, præcipue quum ( dice egli ) nondum tantam habeam experimentorum copiam, ut litem hanc solvere possim; poi in una nota contentasi di dire: ipse quidem hepatis substantiam granulis, seu acinis factam perspexi, Malpighianas autem vesciculas, aut folliculos, ingenuus dicam, numquam vidi . . . Profedo facile crederem in glanduloso systemate, non minus quam in vasculoso, de acinorum differentia cogitandum esse. Chi non vede quì la favia ritenutezza del nostro Autore, e la sua prudente irre-foluzione, non già un assoluta afferzione fenza prove, come pretende il PORTAL ?

Nel 1749. ai 27. di Marzo fu accet- E accettato tato membro del Real Collegio di Chi- nel Collegio di Chirurrurgia, alla qual accettazione erafi abi- sia. litato coll' aver due anni prima preso l' esame, che dicesi di aggregazione, e lo stesso anno uso dal Collegio delle Province, per esercitare la fua Professione per la Città . I Chirurghi Colle- sua condotgiati godono del dritto di esaminare i Candidati di Chirurgia, affine di giudicare dai progressi, che hanno fatto nell' arte, se meritino, o no d'esserne am-BERTRANDI TUM. TOM. I. messi

34

messi al libero esercizio. In questi esami il BERTRANDI come si mostrò molto sagace, ed oculato, così si acquistò la fama di giusto, e disinteressato, piuttosto propenso alla clemenza, che alla severità.

Incominciava egli ad avere un numero fufficiente di ammalati fotto la fua cura, e già i Grandi, conosciutane la dottrina, e l'onestà, cercavano di ottenergli dal Sovrano qualche onorifico impiego, quando al principio dell' anno 1752, essendo restata vacante la carica di pubblico Incifore Anatomico alla Regia Università, il Cavalier Ossorio Ministro per gli affari esterni, il quale era folito nelle ore di ritaglio fentir volentieri il BERTRANDI ragionare delle cose non meno di Chirurgia, che delle altre scienze, il propose al Re per quella carica. Ma CARLO EMANUELE, il quale era informatissimo del merito del BER-TRANDI, io l'ho destinato, rispose, a qualche cosa di meglio, e fattolo da là a non molto a se chiamare, gli esibì il viaggio di Parigi, e di Londra, ove a fpele Regie sarebbe restato tre anni per vieppiù perfezionarsi nell' Arte . Ammutolì, e turboffi all'inaspettata Reale offerta; ma l'affabile, è graziofo Monarca, interrogatolo della cagione del fuo turbamento, ne prese un più alto

H Re lo manda a fue spese a Parigi, ea Londra.

concetto, quando sentì dal rispettoso Suddito ciò procedere dal rincrescimento di dover lasciare i Parenti, poveri, e attempati, privi del foccorfo, che loro proccurava coll' esercizio della sua arte, nè esitò un istante a confortarnelo, con ch' egli stesso ne avrebbe avuto cura, come infatti, finchè il figliuolo dimorò fuori della Patria, furono dalla paterna generosità di quel gran Re lar-

gamente Tostentati.

Arrivò a Parigi verso la fine del mese di Aprile dello stesso anno 1752. ove dal Marchese di San GERMANO, allora Ambasciadore del Re di Sardegna presso il Cristianissimo, fu raccomandato ai più celebri Cerufici di quella Capitale, e più particolarmente al signor MORAND Segretario perpetuo dell' Accademia Reale di Chirurgia, e Cerufico Maggiore dello Spedale degl' Invalidi, e al signor Louis, che poi succedette al MORAND nell'impiego di Segretaro; quest' ultimo sel ritiro in casa per ospite. Egli è indicibile, con quale affiduità, e premura frequentasse gli Spedali, e le lezioni di que' gran Maestri. Seppe egli colla sua docilità, e modestia talmente cattivarsene l' animo, che tutti andavano a gara per prestargli tutti gli agi da esercitarsi sia nella diffecazione, che fu sempre il suo mestier favorito, che nelle operazioni

A Parigi enne in cafa del signor

E contrae amicizia coi più celebri Cerufici , e Filofofi di quella Capi-

Cerufiche. Nè folamente coi più famosi Cerufici contrasse egli amicizia, e famigliarità, quali erano, oltre il MORAND, e il Louis già nominati, il VERDIER, il GARENGEOT, il BORDENAVE, l'An-DOUILLÉ, ma anche coi più rinomati Fisici, e Filosofi, tra i quali non vogliono tacersi il WINSLOW, il d'ALEM-BERT, il BUFFON, il MEYRAN, REAUMUR ec.; gli andava a visitare tutti almeno una volta tutt' i quindici giorni.

Non tardò il Louis a conoscere l' estensione delle cognizioni possedute dal fuo Allievo, ficche ebbe a dire all'Ambasciadore, che S. E. non uno scolaro. ma un maestro gli avea messo in casa. Egli stesso ci ha conservata la memoria d'una discussione letteraria avuta col BERTRANDI fin dal principio, che l'ebbe a pigione. Il BERTRANDI avea fovente in bocca il trito assioma, che le operazioni di Chirurgia vogliono essere fatte tuto, cito, & jucunde. L'eloquentissimo, e dotto signor Louis (a) rispondeva esfere cosa malagevole il potere scoprire le ragioni, per le quali di queste tre condizioni siasene fatto un assioma; diceva, essere anzi una falsa massima di ASCLEPIADE, comunemente attribuita a:

Discussione' avuta col Louis circa il tuto, cito, & jucunde PIADE .

(a) Pag. 22. del già citato Eloge historique.

CELSO,

CELSO, il quale la cita soltanto per condannarla, e disapprovarla; che ASCLE-PIADE ne faceva bensì la regola della sua condotta nell' esercizio della Medicina interna, ma che mai non ha inteso di applicarla alla Chirurgia; e che CELSO medesimo ne parla, nel cap. della cura delle febbri, e non dove si tratta delle operazioni Cerusiche, che anzi riguardo à queste CELSO biasima espressamente la celerità. Cette petite discussion ( foggiunge il Louis ) servit à m'attacher Mr. BERTRANDI, en qui, malgré ses lumières, & l'étendue de ses connoissances, j'ai trouvé constamment la docilité, qu'on ne rencontre pas toûjours dans ceux, en qui elle n'auroit pas même le mérite d'étre une vertu. Ella è veramente da lodarsi al sommo la prudenza del BER-TRANDI, il quale, quantunque non restasse appagato dalle apparenti ragioni, o piuttosto dai sossimi del suo Maestro. tuttavia s'infinse allora di averle per buone, e si tacque; e bisogna pure, che non l'abbiano soddisfatto, da che tanti anni dopo nell' Introduzione al suo Trattato delle Operazioni inferì, e inculcò la massima di Asclepiade. E come mai quelle ragioni avrebbero potuto convincere un uomo così perspicace, qual era il BERTRANDI, se sono portate contro una verità patentissima, e fan, dire a

Rifleffioni ritiche inorno queta discussion

CEL-

38 CELSO, la cui lettura eragli famigliariffima, l'opposto appunto di quel, che dice? Chi mai potrà mettere in dubbio. doversi dal Medico, e dal Chirurgo, se iono uomini dabbene, e onesti, cercare la guarigione de' loro ammalati coi mezzi più ficuri, più pronti, e meno ingrati, che fia possibile, che è quanto intese d'insegnare ASCLEPIADE, quando al dir di CELSO (a) lasciò scritto : Officium esse Medici, ut tuto, ut celeriter, ut jueunde curet? Havvi egli un aforismo in IPPOCRATE tanto certo, così evidente, e soggetto a minori eccezioni? ASCLEPIA-DE, egli è vero, non ha applicato quella massima particolarmente alla Chirurgia, ma l'ha estesa a tutte le parti della Medicina; non fono però da condannarsi i Cerusici, se l'hanno singolarmente applicata alla loro arte, e se in tutt' i libri di Chirurgia antichi, e moderni da CELSO in poi trovasi ripetuta, e raccomandata? Se il Romano Scrittore ne parla nel cap. della cura delle febbri, non vuolsi già da ciò conchiudere, che intendesse, non doversi quel precetto estendere alla Chirurgia, ma sibbene doversi riguardare, come lo riguardava ASCLEPIADE, qual precetto generale,

<sup>(</sup>a) De Medicina lib. 111. cap. IV.

comune a tutte le parti della Medicina. Ned è vero, che lo disapprovi, anzi si spiega a chiare note, che lo scopo del Medico debb' effere di potere nel medicare mettere in pratica tutte e tre quelle condizioni: id votum est ( dic' egli ); e perchè fuol effere per l' ordinario pericolosa la soverchia prestezza, e giocondità, si riserba, quando parlerà della cura de' morbi in particolare, di considerare, con qual moderazione dovrà il Medico regolarsi, affinchè, per quanto è possibile, quelle tre condizioni si posfano ottenere, dando però fempre la preferenza alla ficurezza (a). Ne altrimenti la discorre GALENO (b), che dice: Danda in hisce ( parla delle Operazioni di Chirurgia ) semper opera est, ut tum brevi tempore, tum citra dolorem, tum quam tutissime cures: verum, ut tuto cures tribus sis intentus oportet, unum, primumque est, ut omnino absolutionem operis consequaris. La sicurezza, e la salute dell' infermo vogliono sempre mai

<sup>(</sup>a) Sed fere periculofa effe nimia 6º fellinatio, 6º volupras folet: Qua vero moderatione utendum fit, ut, quantum fieri poteft, omnia iffa contingant, prima femper habita falute; in ipfie partibus curationum confiderandum erit. Dalla qual efprefitone in ipfa partibus curationum ognun vede, che CELSO vi comprende anche la Chizurgia, che è una parte della Medicina.
(b) Method, medand ils, XIV. cap. XIII.

essere la mira principale, e le altre due condizioni, cioè la prestezza, e la dolcezza effervi subordinate. Lo stesso As-CLEPIADE, il quale usava un metodo semplicissimo, e dolcissimo, nelle occorrenze, come nota nello stesso luogo CELSO, talmente se ne allontanava, che era riputato perfino crudele (a). Tocca adunque al perito, favio, e prudente Cerufico (dacchè noi dobbiamo restringerci alla Chirurgia ) il combinare in modo i mezzi di fare le operazioni, che si accosti, quanto più si può, alle tre condizioni, se tutte non le può, operando, ottenere. Nessuno ignora, che il non mai abbastanza lodato IPPOCRA-TE LATINO tra le altre qualità da lui ricercate nel Cerufico, vuole anche, che fia intrepido, nè troppo compassionevole, sic ut sanari velit eum, quem accepit, non ut clamore ejus motus vel magis, quam res desiderat, vel minus, quam necesse est, secet (b); ma quì, come si vede, non biasima espressamente la celerità, come pretende

<sup>(</sup>a) Quo magis falluntur, qui per omnia jucundam ejus (ASCLEPIADIS ) difiplinam esse contendunt. Is enimulterioribus quidem diebus (parla della cura delle febbri) cubanis etiam luxuria subscripsis; primis veto tora soris viciem exhibisit.

il signor Louis (a), ma sì la soverchia celerità nociva al felice esito della operazione: Sat cito, si sat bene, dice il proverbio (b).

L'anno 1753. addì 25. di Ottobre leffe il BERTRANDI in un' Adunanza della Reale Accademia di Chirurgia di Parigi una sua Dissertazione sull' idrocele. Gli Accademici decisero, que c'étoit une dissertation savante, & utile sur les causes, les symptomes, & les différences de l'hydrocele; qu'à l'histoire de la maladie exposée avec beaucoup d'érudition l'Auteur joint une pratique lumineuse sur les moyens de parvenir à la curer, & qu'en tout cet ouvrage étoit bien fait pour orner les Mémoires de l'Academie (c), come infatti fu poi essa stampata nel 111. Tom. pag. 84. dell' edizione in 4., e nel Tom. VII. pag. 357. dell' edizione in 12. Ella è scritta, come tutte le altre sue Opere, con chiarezza, con metodo, e con erudizione. L' Autore non riguarda per vere idroceli, che i raccoglimenti d'acqua in ampie cavità distinte: chepperò riduce all' edema

Legge all' Accademia Reale di Chirurgia una Differtacione full' idrocele, la quale è approvata, e stampata.

Analifi di quest' Ope-

<sup>(</sup>a) Pag. 23. del suo Elogio: à ce sujet même (delle operazioni Cerusiche) CEISE blame expressenta a célérité: Non magis, quam res desderat, properet (b) BERTRANDI Trattat. delle Operazioni nell'Intro-

<sup>(</sup>c) Conte BAVA Elogio florico pag. 49:

travasamento delle acque nel tessuto cel+ lulare dello scroto, sia esso tra la cute. e il dartos, o tra questo, e il cremastere (a); e fa notare, non rompersi le cellule di quel tessuto per formare una comune cavità, se non quando per una violenza esterna si fece l' ematocele . a cui fia fucceduta l' idrocele, o quando le acque travafate fiano divenute acri . e corrofive pel vizio univerfale degli umori, come accade negli scorbutici, e ne' sifilitici. Nega assolutamente la spezie di idrocele, che dicesi aver la sua sede tra il cremastere, e il cordone spermatico. perchè quel muscolo, essendo composto di fascetti rari, e rilassati, lascia scappare le acque nella cellulare dello scroto. o fe si raccolgono in quella del cordone, ne nasce l'idrocele, che dicesi della vaginale di esso cordone. E quì fa osservare, che quest' ultima spezie d' idrocele da principio è sempre cellulare, e fatta da un grappolo d'idatidi, perchè cellulare, e non membranosa è quella

<sup>(</sup>β) Il PORTAL ( Hißnir, de l'Anatom., 6 de la Chimp; tom ν pag. 43+, 3 dice, che qui il BERTRANDI flabilifice con molte oiservazioni la natura cellulofa del darcos, mentre il BERTRANDI fi contentat di acconnae di pafsaggio, che il dartos non è un mufcolo, ma un femplice refsuto cellulare, e le ofservazioni, che adduce, tendono a provare la polibilità, che l'inzuppamento cellulare divenga in certicafi circofcritto, e faccato.

tunica, avvertendo però tanta effere la mollezza, e l'ampiezza delle fue cellule, che facilmente cedono, si dilatano, e si rompono, per dar origine col tempo a una vera idrocele ampia, circoscritta, e saccata, e ne adduce varie osfervazioni. A torto adunque il PORTAL afferisce (a), che il BERTRANDI doute des épanchemens d'eau dans la tunique vaginale du cordon; egli è tanto lontano da questo dubbio, che fa anzi un' acerba critica al SHARP, perchè nega tale spezie d' idrocele. Poteva piuttosto il PORTAL avvertire efferfi il BERTRANDI ingannato, quando, narrando di aver be le idropiù d'una volta veduto simile idrocele ". in bambini, nei quali i testicoli uscivano con difficoltà dall' addomine, o si erano arrestati all' anello inguinale, suppone, che in essi la tunica vaginale propria del testicolo o si fosse fatta aderente al testicolo medesimo, o rottasi, volendo con ciò spiegare, perchè l' idrocele si trovasse nella sola vaginale del cordone. Ma siaci permesso, per amore della verità, di far riflettere, che le idroceli di que bambini erano congenite, e che il BERTRANDI non le conobbe, perchè allora non fi conofceva ancor bene la

. (a) Loc. cit.

Nè quelle dell' albugivera origine, e la particolare conformazione della tunica vaginale del testicolo nel feto, e ne' bambini appena nati, come dimostreremo nel nostro Supplemento al Trattato delle ernie. E perchè ignorava anche la doppia lamina, o piuttosto la doppia tunica, volgarmente conosciuta sotto il solo nome di albuginea. dubita perciò della possibilità dell' idrocele, che gli Autori hanno descritta nella stessa albuginea, confermata dal Mor-GAGNI, e da altri, come in quello stesso Supplemento faremo vedere. Dopo aver data con molta efattezza la storia della malattia, passa a indicarne succintamente la cura. Per le idroceli cellulari del cordone loda il setone, o il metodo del MARINI, che consiste nell'uso della tenta spalmata di qualche cateretico . E quì dobbiamo notare non poterfi da noi capire, fu qual fondamento l'erudito signor SABATIER (a), e poi il DELON NES (b), che lo copia quafi dappertut-

(a) Recherches historiques sur la cure radicale de l'hydrocele inserite nel v. Tomo dell' Accad. Reale di Chirurgia pag. 670.

<sup>(</sup>b) Fifthire de l'hydrocele. Paris 1985, in 8. Ecco le tue parole pag. 187. M. BERTRAPPI, en parlant de la tente, en attribue l'invention à MARINUS. Son erreur el pluis blâmable encorr, que celle de Mr. HEISTER (l'EISTERO ne fa inventore il Ruischto, eil MARINI); elle fuppoje awec raison, qu'il n'a pas lu les auvres de ce dermer, encore moins les surves de RUISCAS.

Abbaglio del Sabatier, e del Delonnes

to, afferiscano, che il BERTRANDI fa inventore il MARINI dell' uso della tenta per la cura radicale dell' idrocele, mentre, dicono essi, avanti il MARINI hanno proposto questo metodo e Guglielmo Saliceto, e il Pareo, e il Franco, e il Ruischio, ma il nostro Autore tanto in questa sua Differtazione, che nel Trattato delle Operazioni dice femplicemente, che in certe idroceli può giovare il metodo del. MARINI. cioè il metodo di fervirsi della tenta della data figura, e groffezza, e spalmata dei tali, e tali rimedi con certe particolari attenzioni tutte proprie del MARINI, il che fecondo noi non fignifica, che il MA-RINI fia l'inventore del metodo della tenta (a). Nelle idroceli del cordone an-

qui terivoit fur la fin du XVIII. fiecle. Les œuvres de RUISCII (legue egli), de MARINUS, ceax de FRANco, de SAICET beaucoup plus ancien encore, font adamoints bien Argiffant pour les Chivagians qui per cellavire. Noi crecliamo inuville di abuda della pazienza del Letrore nel far ofservare tutti gli (propofiti, che fit trovano in quefe poche righe; condonindi anche si grossolani farcasmi a uno Scrittore, che dà fuori un grosso libro intilola ossibilità della pazien, che ignora quasi affarto la struttura delle parti, che fono la sede della malattia; che ci da per proprio il metodo di guarisla proposto anticamente da Cruso, e rinnovato a' nostri di dal Douglass.

(a) Il titolo del libro del MARINI è il feguente:
Pratica delle principali operazioni, che riguardano il litotomo, e l'oculifia di Girolamo MARINO, Roma 1723.

46

tiche, e piene di materie spesse, e glutinose vuole, che al setone, e alla tenta si preferisca l'incisione, e sa in esse notare certe macchie lenticolari, che dal cordone si propagano sin contro gl' integumenti dello scroto, le quali crede fatte dall' olio della pinguedine irrancidito, e per distruggerle vuole, che si usi la pietra caustica rotta, e mescolata col sapone. E perchè quasi sempre alla cura dell' idrocele della tunica vaginale del testicolo, o di quella del cordone, quando è circoscritta (facciasi essa cura coi caustici, col taglio, o con altri mezzi) fogliono fuccedere gravissimi accidenti, egli propone un metodo fuo che dice di avere più volte sperimentato esente da que' pericoli, e che consiste nel fare col trequarti la paracentesi del facco, quando le acque vi si sono rac-

Metodo proprio del BENTRAN-DI di guarir radicalmente l'idrocele,

in 8. Quel, che v'è da notare nell' addotto passo del DELONNES, è, che configlia la lettura di ques' opera del MARINO, dopo aver detto poche linee prima, full' autorità dell' ALLERO, che è un libro atsai mediocre.

colte a una certa quantità, nel ricetere la ftessa operazione, allorchè vi si siano accumulate a una quantità minore, e poi tina terza, o quarta volta, sempre lasciandovene raccogliere copia minore; egli ha provato, che con questo meto-

do

do il facco fi restrigne, e che allora fi può poi fare l'operazione col taglio, e la cura radicale senza pericolo, facendolo suppurare, o consumare co' cateretici, o co' caustici. Avvertisce però, che questo suo metodo conviene ne' soli casi, che il sacco non è molto spesso, le acque sono limpide, e chiare, e il testicolo sano. Quando sia stato necesfario di fare la castratura, perchè esso testicolo fosse scirroso, canceroso, o in altro modo gravemente leso, vuole, che la ligatura del cordone spermatico si faccia nella parte sana, non già dov'è tumido, avendo egli non di rado offervato, che altrimenti operando, sciogliendosi poi per la suppurazione quell' inzuppamento, l'allacciatura si rallenta, e dà origine a una pericolofa emorragia, e dice potersi arditamente dilatare l'anello, e anche tagliare una porzione de' muscoli obbliquo interno, e trasverfale, qualora al di quà dell' anello esso cordone non fosse sano; Si enim funiculus in abdomine ( dice egli ) nullo morbo affectus est, nihil pertimescendum videmus . . . . Si vero morbus eumdem occupet per reliquam semitam, quod propius, aut longius injiciatur vinculum, morbum nec adauget, nec imminuit. Finalmente quando per qualche corrofione fattafi all' uretra l' urina fi spanda nello

48

scroto, consiglia, per impedire la carrerena, che presto vi fi tuole fare, le prosonde scarificazioni, e l' uso della tenta del RONCALLI, e del catetere del PETIT (a), per deviare l' urina da quel foro; che se molti sossero i fori, vuole, che si fenda per lungo l' uretra da un foro all'altro, perchè soltanto in questo modo se ne può ottenere una soda cicatrice.

Legge alla fleila Accademia una Differtatione fugli afceffi del fegato, fopravvegnenti alle serite di te-fa.

L'anno seguente, cioè nel 1754. addì 16. di Maggio lesse alla stessa Accademia un altro fuo ingegnosissimo, e dotto ragionamento fulla causa degli ascessi, cha si fanno così sovente al fegato dopo le gravi ferite di testa, il quale fu anche approvato, e inserito nel Tom. 111. pag. 484. dell' edizione in 4., e pag. 130. del Tom. IX. dell' edizione in 12. Sempre difficilissima da spiegarsi è sembrata ai Fisiologi, e Patologi la formazione di simili ascessi, osservatisi sin dai più remoti secoli. Il BERTRANDI ne attribuisce la causa al sangue, che cala allora dal capo in maggior copia, e più impetuoso nella vena-cava discendente, il quale perciò pone argine a quello, che ascende per la vena-cava inferiore,

<sup>(</sup>a) Nel Trattato delle malattie veneree nell'articolo della diffuria, e dell'isewia sono descritti gli strumen, ti, che qui si accennano.

per la qual cosa non potendosi il sangue di questa ultima vena liberamente scaricare nell'orecchietta destra del cuore, neppur potrà essa ricevere quello, vi dovrebbero mandare i proffimi suoi rami, ne' quali perciò dovrà arrestarsi, e maggiormente in quelli, che sono più vicini al cuore. Ora le vene epatiche essendo i rami della vena-cava inferiore più vicini al cuore, da che congiungono nel suo passaggio pel proprio foro del diaframma, e qualche volta medefimamente, dopo che è già entrata nel petto, queste vene non potendosi vuotare, si riempiono, e si dilatano oltre il consueto, quindi si fa stasi fanguigna nel fegato, a cui non tarda a sopraggiungere l'infiammazione, e la fuppurazione. Questa affai verisimile conghiettura, che per tale l'ha data il BER-TRANDI, e non come una verità di fatto, è stata impugnata prima dal celebre POUTEAU nelle sue Mescolanze Cerusiche (a), e poscia anche dal David nelle sue Ricerche sulla cavata di sangue (b) . Il primo suppone, che per quelle ferite le arteries, che portano il fangue alla tefta, cadano

Spiegazione della formazione di tali diseffi.

L' ipotefi del BER-TRANDI È confutata dal POU-TEAU, e dal DAVID.

<sup>(</sup>a) Mélanges de Chirurgie. A Lyon 1760. in 8. (b) Recherches sur la maniere d'agis de la saignée. Pazis 1762. in 12.

BERTRANDI TUM. TOM. L.

50

cadano in una spezie di atonia, e che perciò vi fi porti allora una minor quantità di fangue, il quale, foprabbondando nel ventricolo finistro del cuore, non lascia vuotare la corrispondente orecchierta, nè questa i polmoni, i quali perciò non possono più ammettere liberamente quello delle arterie polmonali; restano conseguentemente di soverchio pieni il ventricolo, e'l' orecchietta destri, donde viene sopraccaricata di sangue la vena-cava inferiore, e per la vicinanza le vene epatiche. Il DAVID crede, che per le gravi ferite di testa que' vasi cangino di direzione, e vi portino perciò minor quantità di fangue, onde ne accadano gli stessi sconcerti nella circolazione immaginati dal Pouteau. Noi crediamo inutile il confutare le ipotesi di questi due valenti Cerusici, conciosfiache il BERTRANDI medefimo nel fuo Tratt. delle Operazioni vi ha sufficientemente risposto, la quale apologia sarà da noi ristampata alla fine di questa stessa Dissertazione, che esaminiamo; ed è pur fomma la gloria del nostro Autore, che, quantunque questi due Scrittori fiano a lui contrari nella spiegazio-

ne di quegli asceffi, convengano però l'uno, e l'altro con lui nella pratica, cioè che nelle ferite di testa non si debbano fare così frequenti le cavate di

Sua apologia. fangue dal piede, come fi costuma dai Pratici.

Pochi giorni dopo la lettura di questo E fatto So-Discorso egli è stato, in conseguenza della favorevole relazione fattane dai Deputati, a pieni voti nominato Socio dell' Accademia, e addi 11. di Luglio fugli consegnata una Lettera del Conte d'Argenson Ministro, e Segretario Stato, colla quale lo ragguagliava, che il Re avea aggradito la nomina fatta dall' Accademia .

cio dell' Ac-Chirurgia di

Nel 11. Tomo della stessa Accademia edizione in 4. leggonfi alcune fue offer- sue offervazioni Cerufiche. La prima, che tro- vazioni Cevasi a pag. 2., è di un'ernia fatta dall' rite nella intestino ileon, che uscì dall' addomine demia. per l'incavatura ischiatica sotto i ligamenti sacro-ischiatici : questa spezie di ernia, che è affai rara, l'offervò due volte in due diversi soggetti sempre dal lato destro. La seconda trovasi a paga 373., e infegna il mezzo di fegare comodamente la porzione dell' offo, che non di rado dopo le amputazioni delle estremità, e principalmente dopo quella della cofcia, sporge oltre il livello delle carni, si allunga, e si fa prominente. Perchè colle mani fuol effere o impoffibile, o molto difficile il sostenere quel pezzo d'offo, e di avere un punto di appoggio, onde poterlo fegare, il BER-TRANDI

steffa Acca-

52

TRANDI propone, e se n' è servito con felice esito, una spezie di cavalletto fatto d'un pezzo di legno perpendicolarmente appoggiato con una larga base in terra, e incavato a mezza luna nella sua estremità superiore, nella quale incavatura vien ricevuto il pezzo d'offo, che si dee segare, mezzo quanto semplice, altrettanto utile. Lo stesso dicasi dell'altro suo mezzo rapportato a pag. 378., che tende a rendere immobili nel volerle segar le due ossa della gamba, e dell'avan-braccio, legandole infieme per mezzo di un nastro: C'est de la réunion de plusieurs petites pratiques, qui ont une utilité marquée, que nous devons attendre la perfection de nos opérations, riflette giudiziosamente a questo proposito il Louis.

Parte per . Londra .

Verso la metà di Luglio dello stesso anno 1754, parti per Londra, ov' entrò a pigione in casa del Cerusso della Corte Guglielmo Bronfellus: quivi dimorò quasi un anno, e le sue occupazioni erano, come a Parigi, il frequentare gli Spedali, il conversare coi più famosi Letterati di quella gran Metropoli, e l'attendere alle disfecazioni anatomiche. Il Bronfellus fu in Inghilterra uno de più zelanti promotori dell' apparecchio laterale, e uno di quelli, che meglio il perfezionarono. Sotto questio

Sue occupazioni, mentre ivi foggiorna . sto grande Operatore acquisto il BER-TRANDI quell' animo fermo, quella rifolutezza, e quella speditezza nelle operazioni, che da principio gli mancavano, attefo il suo naturale delicato, e per un Cerufico forse troppo compassionevole. Nel ritornare alla Patria nuovamente si fermò per alcuni mesi a Parigi, dove intervenne affiduamente alle Adunanze della Reale Accademia di Chirurgia, dalla quale fu più volte nominato Commessario ad esaminare, e a far la relazione delle Differtazioni mandatele, nel che fare ha mostrato una sagacità non ordinaria, e una finissima arte critica imparziale.

Giunto a Torino, ov' era precorsa la fama della stima acquistatasi ne' Paesi esteri, fu molto bene accolto dalla Corte, e dai Grandi, e perchè il Re allora non avea alcun impiego vacante, che fosse di sua convenienza, per mostrargli il suo Reale aggradimento si determinò di creare a suo riguardo un Professore straordinario di Chirurgia, e di Anatomia nella Regia Università, coll' obbligo d'indirizzare i giovani Studenti maffime nell' Anatomia pratica. E perchè a tal uopo non eravi per anco un fito abbastanza comodo, l' Eccellentissimo Magistrato della Riforma degli Studi fece costruire a sua sollicitazione, e a norma

Ritorna alla Patria, dov' è fatto Professorestraordinario di Chirurgia, e di Anasomia;

> Fa costruire un Teatro Anatomico.

d'un fuo difegno nello Spedal Maggiore di S. Gioanni un belliffimo Teatro Anatomico colle necessarie stanze attigue, che servirono poi, e servono tuttora non folamente per fare a dovere le dissecazioni, e per le pubbliche dimostrazioni Anatomiche, ma anche per gli esami pubblici di Anatomia pratica, e delle operazioni, che fi danno ai Candidati di Chirurgia. Nè possiamo tacere, che le stanze destinate per le dissecazioni essendosi ritrovate troppo anguste pel gran numero di Studenti, che con grande zelo, ed emulazione vi attendono, S. E. il signor Conte LANFRANCHI Capo-Reggente di quel Magistrato, sempre intenta a proccurare tutt' i mezzi, che possono contribuire all'avanzamento come di tutte le scienze, così pure della Chirurgia, ne ha a nostra istanza nello scorfo Autunno fatte costruire delle altre e più larghe, e più comode. Stette tre anni in quest' impiego, pendente i quali seppe e col suo esempio, e colle sue lezioni talmente infinuare ne' giovani Allievi l'amore del taglio de' cadaveri, che riguardava con ragione come il fondamento della Chirurgia, che non si è più d'allora in poi illanguidito.

Accadde nel 1757. cosa, la quale merita di essere narrata, perchè nel tempo stesso, che sa vedere l'alta stima, in

cui era presso degl' imparziali conoscitori, di eccellente Anatomico, e buon dicitore, così dimostra, a che possa giungere l'invidia. Era in que tempi pubblico Professore di Notomia nella Regia Università il Dottor BRUNI, Membro della Reale Società di Londra, uomo quanto dotto, altrettanto onesto, virtuoso, e spregiudicato, amico, e ammiratore del BERTRANDI. Dovea il E destinato Bruni fecondo il folito fare pubblicamente il corso delle dimostrazioni anatomiche sopra un giustiziato, ma essendo in quel frangente caduto ammalato, non esitò punto di proporre al Magiftrato il BERTRANDI per fare le sue veci; alla qual propofizione e il Magistrato, e la voce pubblica fubito fentironsi applaudire. Alcuni invidiosi però secero opposizione, quasi fosse un disonore, che ne veniva al Collegio di Medicina, e niuno vi fosse di ciò capace, tanto più che le leggi volevano espresfamente non solamente un Medico Laureato, ma di più un Medico Collegiato, e il BERTRANDI non era nè l'uno. nè l'altro. Ragioni sì frivole niente smosfero il vigilantiffimo Magistrato unicamente portato pel pubblico bene, e fi prescindette per allora dalle formalità. Non fuvvi mai tanto concorfo di gente nel Teatro Anatomico della Regia Università .

pubbliche Medici nella Regia Univertità .

Opposizio-

Numerofo concorfo di persone di ogniceto ad atcoltario.

E' confulta-

to per le Teli

Anatomiche da moltiMe-

dici .

versità, e tutti rimasero soddisfatti sì della sua eloquenza, e latinità veramente CELSIANA, che delle non più vedute preparazioni anatomiche. Si seppe poi, che quei, che fecero più forti le opposizioni, erano la maggior parte que' Dottori del Collegio, cui il BERTRANDI avea ajutato a fare le Tesi di Anatomia. da difendersi pubblicamente, per esservi aggregati. Imperciocchè non ha punto esaggerato, chiunque ha accertato il signor Louis, que dans l'espace de quinze ans il ne s'est presque point soutenu de Theses d'Anatomie aux receptions dans le College des Médécins, auxquelles Mr. BERTRANDI n'ait eû la meilleure part (a). Nessuno però ebbe la nobile ingenuità di confessarlo al Pubblico, come l'ebbe il dottiffimo nostro Signor CI-GNA (b), il quale alla fine delle fue bellissime Tesi de Utero difese nel 1757. non arrossì di dire: Quas in hac Thesi anatomicas, aut physiologicas observationes protuli, eas partim ex fidelissimis Scriptoribus recepi, partim ex accura-

Ingenuità del CIGNAZ questo proposito.

tissima .

<sup>(</sup>a) Éloge historique pag. 17. (b) Questo nostro Ragionamento è stato letto in tre Adunanze della nostra Accademia Reale delle Scienze, di cui il Cigna è uno de' più ragguardevoli Soci .

tissima, ac sape iterata experimentorum serie, que a Clarissimo BERTRANDI, Chirurgorum Parisiensium Socio, & in hac Academia Chirurgia, & Anatomes Professore extraordinario, indefessa opera instituta sunt, atque ab Audore ipso mihi humanissime communicata. Non dobbiamo però stupirci della diversa condotta degli altri, perchè levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt (a).

Cresceva di giorno in giorno sempre II Re lo nopiù per la Città, e già stendevasi per le Province il nome del BERTRANDI, che si era anche fatto conoscere per la felice riuscita in molte difficili cure intraprese, quando CARLO EMANUELE che nol perdeva di mira, addi 15. di Marzo del 1758. l'eleffe nello steffo giorno con doppia onorevoliffima Patente e in primo Chirurgo della Sua Sacra Persona, e in Professore di Chirurgia Pratica nella Regia Università. Non è necessario di dire, quali sensi di gratitudine, e d'amore siansi all'inaspettato annunzio eccitati nel cuore del tenero Suddito; gli spiega egli stesso nella Lettera dedicatoria al Re medesimo premessa al suo Trattato delle operazioni, e al principio

mina nello stesso giorno e in Prof. Horedi Chirurgia Pratica, e in Chirurgo della fua Perfena .

<sup>(</sup>a) CELS. de Medicina lib. VIII. cap. IV. pag. 515.

Nuova faccia, che fa prendere alla Chirurgia in Piemon-

dell' Orazione per gli Studj della Chirurgia, e se prima erasi mostrato tanto zelante del pubblico bene, ora al primo fuo impegno si aggiunse quello della conservazione di un tanto suo Benefattore. Come siasi comportato nell' impiego di Professore, ne fanno ora nuova testimonianza gli eccellenti diversi Trattati di Chirurgia, che pubblichiamo, e più ancora la nuova faccia, che prese la Chirurgia negli Stati tutti del Re di Sardegna. Era allora la Chirurgia Provinciale quasi intieramente nelle mani dei Chirurghi Maggiori de Reggimenti: qualunque cura un po'scabrosa, qualunque operazione un po' delicata, che si presentasse da farsi, essi soli erano chiamati ad eseguirla, e per niente erano, per così dire, riputati tutti gli altri Cerufici: la litotomia, l' erniotomia, la castratura, la deposizione della cateratta ( che quì ancora non se ne conosceva l' estrazione ) appena v'erano nella Capitale due, o tre Chirurghi, che le facessero, i quali erano all' uopo chiamati dalle Province; meritano tra gli altri d'essere con onore mentovati i VERNA, nella cui famiglia, come già una volta in quella dei COLOT in Francia, era passato come in retaggio l'esercizio di quelle operazioni. Ma dopo che il BER-TRANDI e col praticarle egli stesso, e co'

co' fuoi luminofi scritti rese quelle operazioni in certo modo familiari, esse si eseguirono dappertutto, ottimi Cerusici si sparsero per tutte le Province, tutte le Città, anzi quasi ogni terricciuola vantarono, e vantano ancora il proprio Cerufico atto ad eseguire ogni cosa:

Quando toccava al BERTRANDI il Quanto foffare il pubblico corso delle Operazioni ful cadavere nel Teatro Anatomico della Regia Università, numerosissimo era il concorso non solamente degli Studenti, ma ancora dei Chirurghi patentati, dei Medici, e dei Nobili, e persino dei Professori di Eloquenza, e delle altre Facoltà: Coloro, a' quali più vanno a cuore i slanci filosofici (dice a questo proposito il signor Conte BAVA (a) ), gl'inaspettati passaggi, le pronte allu-sioni di una scienza alle altre, che le sono sorelle, i generali prospetti delle umane cose, non rifinivan di esaltare ora il nuovo aggiunto al vecchio, e bellamente innestatovi sopra, ora i voli felici per gl' interminati regni della Fisica, quando quel misto di tante dottrine, che bollivangli in capo, quando i chiari racconti di non più notati malori, di non

<sup>(</sup>a) Elogio Storico pag. 16.

più conosciuti casi, e di cure, il tutto a tempo, e luogo asperso di sali adoprati con parsimonia, con riguardo, e con garbo: tutti poi ne lodavano il difinvolto maneggiar de' suoi ferri, e la speditezza della mano. Sarebbe difficile il potere immaginarfi, come, dopo effere stato eletto in Chirurgo del Re, e Professore, abbia potuto compiere i tanti doveri portati da questi due cospicui impieglii, di dovere cioè tutt'i giorni almeno una volta al giorno andare alla Corte, di attendere alla composizione de' diversi Trattati Cerusici, che dovette dettare, e fpiegare nella scuola, di andare alla visita de' malati nello Spedale, e agli esami de' Candidati, e inoltre di accudire con tanta esattezza al gran numero degli« ammalati per la Città, che a lui ricorrevano, e di rispondere alle diverse corrispondenze, che da ogni parte lo confultavano, se non sapessimo, qual fosse la fua vivacità, e speditezza nell'agire. la sua facilità nello scrivere, l'immensa lettura, che già avea fatto prima, e la fua maravigliofa memoria nel ricordarsi di ciò . che avea letto :

Del credito, che fempre ebbe in Corte, e principalmente preffo il Sovrano, non fi prevalse mai ad altro uso, che o per far soccorrere certi allievi poveri, ne quali conosceva particolari disposizio-

hi a divenir gran Maestri, o per promuovere quanto credesse poter riescire di avanzamento, e di lustro alla Chirurgia, e alle altre scienze utili. Erasi allora formata una particolare Società di Letterati, che radunavansi assai sovente nella Cafa del signor Conte di Sa-LUZZO, foggetto abbaftanza cognito nella Repubblica Letteraria. Questa Società trattava in comune delle diverse parti della Fifica . e delle Matematiche; andava ripetendo gli sperimenti dagli altri già fatti, e molti nuovi ne immaginava, e sostenevasi sotto l'immediata protezione dell' A. R. del Duca Di Savoja ora felicemente regnante. Il BERTRANDI ne encomiava sovente le utili, e lodevoli imprese, e l'onoré, che ne dovea ridondare al Paese, al Re CARLO EMA-NUELE, che molto si compiaceva nell' udirle. Diede poi essa fra non molto un faggio de' fuoi lavori colla pubblicazione nel 1759. del primo Tomo delle Miscellanea Philosophico-Mathematica Societatis privata Faurinensis (a), che fece tanto strepito nel Mondo Letterario. Il BERTRANDI v'inserì a pag. 104. un suo Opu-

Suo zelo per la Sosietà privata di Torino.

<sup>(4)</sup> Ora quetta Società è stata eretta in Accademia Reale delle Scienze, i cui due primi volumi sono sotto il torchio.

62

Sua Differtazione fulla placenta , full' utero gravido,e fui corpi gialli inferita nel primo Volume di detta Società.

Analifi di questa Dif-Jertazione.

Opuscolo intitolato: Observationes de glanduloso ovarii corpore, de placenta, & de utero gravido.

Volchero COITER (a) è stato per avventura il primo a offervare nelle ovaie della vacca un certo corpo bernoccoluto, ora rosso, ora giallo, più, o meno grosso, ora unico, ora doppio, ora manifestantesi in tutte e due le ovaje, ora in una fola, che fu poi chiamato dagli uni il corpo glanduloso dell' ovaja, da altri il corpo giallo. Lo stesso corpo è stato poscia offervato anche negli altri quadrupedi, e nelle donne medesime dal GRAAF (b), dal MALPIGHI (c), dal VALLISNIERI (d), e da moltiffimi altri Anatomici . Disputossi acremente qual ne fia l'origine, e'l'uso. Il GRAAF (e), e l'Allero (f), coi quali pare, che fia d'accordo il MORGAGNI (g), vogliono.

(e) Loc. cit.

<sup>(</sup>a) Nella fua Opera intitolata: Externarum, & internarum principalium humani corporis partium tabula, atque anatomica exercitationes. Norimberga 1573. in fol. (b) De partibus mulierum generationi infervient. Cap.

ultimo . (c) În una fua dotta, ed erudita lettera allo Spon-Della generazione cap. 3. 4. e 5.

<sup>(</sup>f) Prim. lin. physiolog. S. 835., e 837. della seconda edizione . (g) Come appare da una lettera scritta al BER-

TRANDI, e da questo citata a pag. 104. di questa fua Difsertazione.

no, che questo corpo mai non si trovi nelle vergini, ma folamente nelle femmine, che hanno partorito, e l'ALLE-RO (a) il crede formato nel tempo della concezione dallo staccamento, e dalla crepatura dell'uovo, che resta fecondato; epperciò vuole, che nella fuperfizie delle ovaje sempre vi rimangano nelle femmine, che hanno più volte partorito, tante cicatrici, quante sono le uova staccatefi, e cadute, cicatrici, ch' ei fuppone corrispondere agli antichi corpi gialli. Il BERTRANDI all'opposto adduce varie offervazioni fatte e fulle vergini, e fu diverse spezie di animali, che non avevano ancora conosciuto il maschio, e ancor meno partorito, ne quali tutti of-fervò il corpo glanduloso. Per la qual cosa egli è di sentimento, da che non l'ha mai potuto vedere nelle fanciulle, nè nelle altre femmine di tenera età. ma folamente in quelle da marito, e già atte alla generazione, che questo corpo si sviluppi soltanto, giunti che sono gli animali alla pubertà, e nelle figlie, quando incominciano a comparire i mestrui, e a sentire gli stimoli di Venere; ed è in-

<sup>(</sup>a) Elementa physicolog, corpor, humani tom. VIII.

inclinato a credere, che il suo uso sia di preparare il seme semminile, come nel maschio i testicoli preparano il virile; concioffiache ha offervato, che la fostanza del corpo giallo si approssima molto col suo colore, e colla sua tessitura filamentofa, e vascolare a quella de' testicoli; vi ha non di rado veduto un piccolo foro in punta, continuato con un canale lunghetto stendentesi sino al di là del centro dello stesso corpo. eloquentissimo signor Buffon nel principio del Tom. VIII. de' Supplementi alla fua Storia naturale (a) adduce queste of-fervazioni del BERTRANDI, ch' egli stesso gli avea communicate in una lunga, lettera, in prova del fuo ingegnoso sistema fulla generazione. A noi non ispetta il decidere una così astrusa questione circa l'uso, e l'origine del corpo giallo; trovandosi però questo corpo anche nelle ovaje della mula, ella è una prova convincentissima contro l' Alle-Ro, che non è un prodotto della concezione (b).

Non meno interessante è la seconda parte della Differtazione del nostro Au-

tore

<sup>(</sup>e) Dell' edizione in 12.

<sup>(</sup>b) Vedafi il Trattato delle Razze de' Cavalli di Gio. BRUGNONE, dove tratta de' muli pag. 313., e 314.

tore, che tratta dell'utero gravido, e della placenta. IPPOCRATE avea già parlato dei cotiledoni, che si osservano alla faccia interna dell' utero gravido ne' quadrupedi, e l'immortale ARVEO (a) avea detto, che questi cotiledoni si trovano non solamente nelle pregnanti, ma anche in tutte le femmine atte alla generazione, ma nè dagli Anatomici, nè dai Fisiologi non si fece alcun caso delle offervazioni di questi due grandi uomini. Il BERTRANDI, per accertarfi, se erano vere, aprì l'utero di moltissime vacche, pecore, e conigli non gravide, e in tutte trovò i cotiledoni più, o meno groffi, e roffi, attaccati alla superfizie dell' utero per una fottilissima membrareticolare, e vellutata, e per la compressione di que tubercoli vide uscirne un umore tenue, e dilavato, in qualche modo lattiginofo. Confessa di non aver mai potuto vedere nelle donne alcun'apparenza di veri cotiledoni, ma nelle di fresco ingravidate vide la superficie interna dell'utero turgida, e rossa, coi margini de' seni arteriosi descritti dal MORGAGNI (b), i quali sogliono dar uscita ai mestrui, più duri,

<sup>(</sup>a) Nel suo Trattato de generatione.
(b) Adversar. anasom. IV. animadyers. XXIV.
BERTRANDI TUM. TOM. I.

e più elevati, che non fono nell' utero vergine. I quali cangiamenti comparivano non già in tutta l'estensione di quella faccia interna dell'utero, ma folamente in alcuna fua parte, che egli crede esser quella, dove poi doveasi attaccare la placenta, dal che conchiude, che quelle mutazioni nell' utero fi fanno già prima, ch' essa placenta siavi attaccata; e veramente in una donna. avea il feto nella tromba finistra, trovò le pareti interne dell' utero corrispondenti a quella tromba, più spesse, e più rosse coi detti seni molto più dilatati, che nel rimanente. Che più? In una porca trovò stesa su tutta la superficie interna dell' utero una tela roffigna, e mucilagginofa, la quale messa nell'acqua non vi fi fcioglieva, ma vi galleggiava a guifa di membrana: dentro questa tela non ha potuto vedere la menoma apparenza di embrione. Senza volere pertanto con queste osservazioni pronunziare decifivamente della verità, e costanza di quelle dell' ARVEO, e massime di quella, nella quale dice, che nell' utero sempre si forma una simile tela, egli intende d'incitare con esse gli Anatomici a fare ulteriori ricerche; ma trattanto, ut ipfe fatear, quod recogito (dice egli) postremæ, quas in ovibus, & vaccis institui, observationes a communi sententia me non leviter deturbarunt, ut generationem multiplici partium apparatu promoveri, foveri, & perfici erediderim: dubium observationes excitarunt, eædem aliquando fortasse absolvent, si porro operis modos sequamur.

Stabifice una fcuoli per l'inftru zione della Mammane

Tra gli altri importantissimi stabilimenti fatti dal Re CARLO EMANUE-LE di sempre gloriosa memoria certamente annoverare quello della instruzione delle Ostetrici, stabilimento. che è stato principalmente promosso dal BERTRANDI, il quale rappresentò all' augusto Monarca, quanto poco conosciuta ne suoi Dominj l'arte ostetricia, quante madri, e quanti bambini o appena nati, o anche prima di nascere morissero per mancanza del necesfario foccorfo; e che, quantunque ne' parti difficili, e contro natura tocchi all'esperto, e destro Chirurgo il farla da ostetricante, siccome però le donne per la naturale loro verecondia fogliono avere maggior confidenza nelle altre donne, e di esse più volentieri servirsi nel parto, era giusto, che le Levatrici avessero, oltre il cieco empirismo, studiato almeno i principi dell'arte. Si diede confeguentemente ordine dalle Province si mandassero nell' Opera delle Partorienti stabilita nello Spedale di S. Gioanni delle donne oneste, pie, e capaci di qualqualche instruzione, le quali colla pratica imparassero anche un po' di teorica, e poi coll' esame dessero saggio de' loro progressi: il Bertrandi stesso su incaticato di andarle ad instruire.

Pubblica un Trattato delle Operazioni di Chirurgia,

Nell'anno scolastico del 1760. al 61. dettò dalla Cattedra il Trattato delle Operazioni di Chirurgia, il quale poi alle preghiere del suo Amico il celebre Dottor GABER permise, che nel 1763. uscisse dai Torchi di Nizza in due piccioli volumi in 8. con figure alla fine del fecondo. Il dedico, come già fi è accennato, al fommo suo Benefattore il Re CARLO EMANUELE, e nella Lettera dedicatoria premessa al primo, egli espone in una maniera semplice, nobile, e tenera tutt' i benefizj, ond' era stato da quel Gran Re colmato. Viene poi subito l' Orazione sopra gli Studj della Chirurgia da lui recitata al principio dell' anno scolastico 1758., nella quale dimostra ai Chirurghi la necessità, che hanno, per riuscire nella loro arte, delle cognizioni Anatomiche le più minute: Una linea (dic'egli) di maggiore, o minore spazio ad uno de' lati, oserei dire un punto, possono rendere un' operazione felice, e supenda, o mortale. Fa poscia vedere, quanto giovi lo studio della Teorica, ma di una Teorica sondata full' Anatomia, fulla Fisiologia, e sulle

Sua Orazione fugli studi per la Chirurgia.

altre parti della Fisica sperimentale, e quì si scaglia addosso agli Empirici, i quali, fenz' altra cognizione del corpo umano, e delle leggi animali, pretendono bastare una lunga pratica, ed esperienza: Se senza Teorica ( così la discorre ) poresse l'arte giungere alla sua perfezione, perchè mai dopo tanti secoli di sperimenti non vi pervenne? Înfiniti sono i Pratici, pochissimi i Teorici, e se qualche bene si è fatto, dicanlo i Pratici, se fu per loro soli, dicanlo, e ne diano pruova. Ed avea pure i suoi particolari motivi d' infiftere principalmente su questo punto, poiche non pochi Cerusici dei più ricercati si ssiatavano nel voler dare ad intendere nelle private conversazioni, che i Trattati dettati dal BERTRANDI erano pure chiacchere incapaci di fare un buon Cerusico, che per riescir tale bastava il vedere molti malati fotto un buon Pratico, e, malgrado le strepitose cure, ed operazioni da lui fatte, altro non sentivasi dire per la Città, che il BER-TRANDI era un fommo Teorico, ma un infelice Pratico, solite cantilene dell' invidioso, ed ignorante empirismo, e che biafima in altrui quel, ch'effo dispera di poter mai possedere. Ella era così radicata, anche prima che partisse per Parigi, l'opinione della sua infelicità nella Pratica, che l' Illudriffimo signor Marchese Morozzo suo sommo Protettore, allora Riformatore degli Studi . in tutte le Lettere , che gli scriveva, sempre gl'inculcava di attendere alla Pratica. Ecco ciò, che gli risponde il BERTRANDI in una fua datata rigi li 2. Dicembre 1752. (a): , derà forse V. S. Illustrissima, che io ad arte non le abbia finora parlato , de' miei studj teoretici, perche Ella , non si pensi, che mi rubino del tem-, po, ma nè essi sono così inutili, che " io me ne avessi da vergognare, nè io , penso, ch' Ella pretenda, che gli ab-.. bandoni affatto: diceva bene , NE di Verulamio: Qui natura vias non noverit, quomodo illis occurrere , potest, eamque vertere? La vera Teo-, rica è la cognizione degli effetti per " le cause. L'Anatomia, la Fisiologia, , e le ben ragionate offervazioni pato-" logiche ne fanno la base, e non le , immaginarie ipotesi, le quali rendono " odiosi la maggior parte di quelli, che " si vogliono chiamare Teorici . Ma tutte quelle parti non s'imparano, e

<sup>(</sup>a) Comunicataci graziofamente con molte altre memorie originali relative alla vita del BERTRANDI dal dotto, e gentiliffimo Cavaliere il signor Contg di Orbassano degli Orsini.

, non si volgono in buon uso, se non " con una lunga serie di studi .... Io lo vidi in Torino, e lo veggo continuamente in Parigi, che la maggior parte delle grandi guarigioni fatte da ", certi Pratici accadono per una certa buona ragione, della quale per lo " più non debbono avere il merito, ,, perchè non l'hanno pensata, e ", ramente perchè mai alcuni, invec-" chiando negli Spedali, non divengo-" no mai migliori? " Noi non ci tratterremo davvantagggio nel far offervare le bellezze di quest Orazione, perchè farà meglio; che il Lettore le gusti tutte da se, leggendola intera, facendola noi ristampare in capo di tutte le Opere del chiarissimo Autore, dove sarà certamente meglio collocata, che al principio del Trattato delle Operazioni . Giova piuttosto, che noi ora passiamo all' esame di questo Libro veramente classico, e ricercatissimo, oramai divenuto raro, comecchè ristampato a Napoli in Italiano (a), a Parigi in Francese (b), e a Vienna in Tedesco (c): Pre-

<sup>(4) 1769.</sup> in 8. in due volumi.

<sup>(</sup>b) Anche nel 1769, in 8, in due vol. tradotto par Mr. Solier de la Romillais.

<sup>(</sup>c) Nello stelso anno 1769. in 8, 1 due Temi di Operazioni Chirurgiche del molto esperto BERTRANDI ( dice il BRAMBILLA a pag. 5. del suo Ragionamento

Pregiasi in esso ( diremo col più volte lodato Conte di S. PAOLO (a) ») la chiarezza in descrivere, e quasi atteggiare all'occhio il processo manuale delle operazioni, e le delicate avvertenze da aversi in sul fatto, la padronanza as-Soluta dell' Anatomia d'ogni genere, L' erudizione estesissima ec. Questo Trattato però suppone delle cognizioni preliminari intorno tutte le malattie Cerufiche. ed è relativo ai presenti Trattati dettati nella scuola. Noi ci riserbiamo di farne l'analifi da premetterfi alla nuova edizione, che se ne farà; quì però non possiamo non entrare in una Letteraria discussione col signor Louis, immediata relazione a questo stesso Trattato, perchè per quel luogo farebbe troppo lunga ...

Breve digreffione fugli feritti di CELSO. Aulo Cornelio Celso già tante volte da noi citato, Scrittore dell'aureo secolo di Augusto, contemporaneo, ed amico di Virgilio, di Orazio, e di Ovidio, ficcome con argomenti affai verofimili ha, non ha guari, provato il dottifimo signor Configliere Bian-

CONI

premeiso al Trattato del flemmone)... Sono i migliorà Trattati, che abbiamo oggidi, e fono flati tradotti in lire gua Francef, e in lingua Tedefea. (a) Pag. 69. dell' Élogio florico.

coni (a), se per la purezza, l'eleganza, e la bella gravità latina, che in tutta la sua Opera de Medicina risplende, merito di effere chiamato il CICE-RONE Medico, e per la somma dottrina, e pratica dell'arte in quella contenute l'IPPOCRATE Latino, bisogna però con fommo nostro rincrescimento confessare, riuscire in molti luoghi così ofcuro, che a mala pena se ne può indovinare il senso, ciò dipenda o dal fuo dire troppo concilo, e laconico, maffime in una materia così difficile a descriversi, oppure, ciò, che è piu probabile, perchè que libri ci siano pervenuti tronchi, malconci, e alterati dal tempo. Non poca obbligazione dobbiamo per confeguenza avere a quella numerofa schiera di valentuomini, i quali dotati di fingolare ingegno, e peritissimi dell'arte Medica, e della Romana favella, con esaminarne, e confrontarne i varj testi a penna, e le numerofissime edizioni, hanno cercato di spianarne le difficoltà, di correggerne i luoghi alterati, e di riempirne le lacune, nella qual' ardua, e molesta fatica ognun sa, per tacere degli altri, quan-

<sup>(</sup>a) Veggansi le sue eruditissime Lessee sopra A. Cornelio CELSO al celebre Abast Girolamo TIRABOSCHI. Roma 1779. in 8.

to fiafi fegnalato, e distinto il gran MORGAGNI (a). Non possiamo con tutto ciò vantarci finora di possedere CELSO intero, e ridotto alla fua vera lezione, nè d'intenderlo dappertutto neppure là, dove non abbiamo motivo di fospettarne il testo guasto, o tronco. Niun però, che noi sappiamo, avea fin quì dubitato, che si sosse preso abbaglio nell' interpretazione di quel paffo del cap. IX. del lib. VII., nel quale CELSO, trattando della cura delle foluzioni di continuità con perdita di sostanza, o no, congenite, o accidentali, che non di rado si offervano nelle orecchie, nelle narici, o nelle labbra, malattie chiamate dai Greci col nome generale di colombata (b), e dai Latini di curta (c), configlia di fare in certi casi delle

(a) Epistola in A. Cornelium CELSUM ad Johan, Bapt.

<sup>(8)</sup> Il vocabolo Greco coloboma potrebbeti tradurrein Italiano morçamento, troncamento, giacchè la parola mutilazione, che è afsai fignificativa, non è italiana, e forfe neppure latina. GALENO (Methodi medendi lib. 11. cap. 2.) Così lo fipega: Eoloboma, idell' mutilum, five curtum. E l'Autore delle Definirioni Mediche, libro attributio anche a GALENO: Coloboma, idell' mutilatio, defettus particulae efi in aliquaparte corporit.

<sup>(</sup>c) Come dal nostro Celso, e da molti altri Scrittori antichi, e moderni, e tra gli altri dal celebré Gaspare Tagliacozzo, il quale l'anno 1797, pubblicò a Venezia in fol. la famola sua Opera De curtorum infistione per Chiruspiam.

delle incisioni semilunari, onde potere con maggiore facilità avvicinare, e far riunire le parti divise, e mancanti. Tutti hanno creduto volersi da CELSO, che tali incisioni si facciano effernamente alla pelle, perchè raccomanda espressamente, che con esse summa tantum cutis diducatur; così l'interpretarono il Guille-MEAU (a), il THEVENIN (b), CLERC (c), il MANGETI (d), il ROON-HUYSEN (e), il PLATNERO (f), e infine, per non annoverare tanti altri. l' amantissimo nostro Maestro (g). Ma il signor Louis in una sua Dissertazione sull'operazione pel labbro di lepre. che si legge nel v. Tomo dell' Accademia Reale di Chirurgia (h) pretende di dimostrare con lungo apparato di dottrina, e di erudizione, che niuno ha

Incifioni femilunari preferitte da CEISO nelle divifioni delle orecchie; del nafo, e delle labbra.

<sup>(</sup>a) Chirurgie Francoise Traité v. des Opérations chap.

<sup>(</sup>b) Opérations de Chirurgie chap, XIII. (c) Nella sua Storia della Medicina.

<sup>(</sup>d) Nelle sue annotazioni alla Chirurgia del Bar-Berre edizione di Geneva pag. 169.

<sup>(</sup>e) In una sua Opera Cerusica molto stimata scritta in Olandese.

(f) Institutiones Chirurgia rationalis \$. 604.

<sup>(</sup>g) Tratatato delle Operazioni di Chirurgia tom. 11.

peg. 147.
(h) Pag. 292. Pare però da ciò, chedice nella sua prima Disfertatione sulla stessa Operazione inserita nel 19. vol. della stessa Accademia pag. 387., che allora interpretates questo paso di CELSO, come s' interpretate da tutti, e come vuol essero interpretate.

Il Louis crede, che tali incifinni fiano pre-CLISC dentro la boc-

capito CELSO a proposito di quelle incisioni semilunari, ne sa intendere, onde abbia potuto nascere un errore così masficcio, ed universale, il quale, se bui prestiamo fede, è un assurdo in Grammatica non meno, che in Chirurgia, aggiungendo, che il BERTRANDI, quantunque versatissimo nella lingua Latina, e nella lettura di CELSO, non ha badata a questo punto di Chirurgia, e si è la sciato sedurre dall' autorità de Moderni. Crede egli adunque apparire fuor d'ogni dubbio dal testo di CELSO, che dice chiaro, e preciso, che il tersissimo Romano Scrittore configlia di fare quelle incisioni non esternamente alla pelle, ma internamente dentro la bocca. Noi speriamo, che il signor Louis non avrà a male, se noi, non per voglia di contraddirlo, nè di gareggiare con lui, ma pel folo amore della verità ci accingiamo a provare, che CELSO ha veramente, e fenza il menomo equivoco prescritto le incisioni semilunari da farsi esternamente alla sola pelle; ch' egli non ha meglio a questo proposito inteso CELSO di quel, che intendesse l'erudito Commentatore del VAN-HORNE Gioanni Guglielmo PAULI, quando ha creduto, che questi, appoggiato all'autorità del ROONHUYSEN, avesse configliato di fare arditamente tali incisioni dentro

dentro la bocca (a); dal che si vedrà chiaramente, che il BERTRANDI non per inavvertenza, nè fedotto dall' autorità de' Moderni ( che non era uomo da stare ciecamente alle altrui opinioni ). ma bensì, per la fomma intelligenza, che avea della lingua latina, e in particolare dello stile CELSIANO, ha su ciò

pensato come gli altri.

Egli è necessario prima di ogni altra cosa di tener bene a mente, che CELSO in questo capitolo dà precetti comuni alla cura delle divisioni, non meno delle labbra, che delle orecchie, e delle narici, come appare dal titolo, che dice: Curta in auribus, labrifque, ac naribus, quomodo sarciri, ac curari possint: tertium est ( avea detto alla fine del cap. precedente ) si quid ibi ( in auribus ) curti est, sarcire. Quae res quum in labris quoque, & naribus fieri possit, eandem etiam curationem habeat, simul explicanda est. CELSO adunque incomincia a dire, che, fe poca è la fo- di CELSO. stanza mancante in alcun sito di queste tre parti, vi si può rimediare, ma se

<sup>(</sup>a) Pag. 387. del quarto Tomo dell' Accademia Reale di Chirurgia. Il sig. VALENTIN ( Recherches crisiques fur la Chirurgie moderne dalla pag. 209. alla 212. e dalla 249. alla 269. ) ha ad evidenza dimostrato, che questi Autori non hanno mai pensato di prescrivere internamente le incifioni femilianeri.

ne manca molta, il vizio o è irrimediabile, o, curandolo, vi si produce una deformità maggiore della prima: Curta igitur in histribus, si qua parte parva sunt, curari possunt, si qua majora sunt, aut non recipiunt curationem, aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora ante fuerint (a). Segue poi a dire, che la maggiore deformità è il solo male da temersi nel voler curare una grande perdita nelle orecchie, e nelle narici, ma che nelle labbra, se, per rimediare a un tal difetto, fonosi di foverchio raccorciate, se ne perde anche l'uso, e un uso necessario, potendosi poi men bene e mangiare, e parlare: Atque in aure quidem, & naribus deformitas sola timeri potest, in labris vero, si nimium contrada sunt, usus quoque necessarii jadura fit, quia minus facile & cibus assumitur, & sermo explicatur (b). Conciossiache (soggiunge

<sup>(</sup>a) La traduzione del signor Louis ci fembra poco efatta, poiché fa dire a CELSO, che, ogni qual volta havvi mancamento di molta fostanza, il vizio è fempre irrimediabile.

<sup>(</sup>B) Turti gli Autori da noi letti, neppur eccertuato il Louis, interpretano questo passo, quasti che qui Cettso parli della desormità, e dei mali prodotti dalla stessa divisione, e mancanza di porzione delle orecchie, del naso, o delle labbra; ma egli à chiaro da quel, che precede, e, legue, e dall'espresioni medesime dell'Autore, che qui parla della deformità, e dei mali, che nascerebbero dalla cura di

egli ) per rimediare a fimili difetti, non è già possibile d' ivi far crescere una nuova fostanza, ma bisogna tirarvela dalle proffime parti; la qual trasposizione di sostanza, se è piccola, può ottenersi, e senza che niente si perda dell' azione delle parti attratte, e senza che faccia deformità apparente, non così se ella è grande: Neque enim creatur ibi corpus, sed ex vicino adducitur. Quod in levi mutatione & nihil eripere, & fallere oculum potest, in magna non potest (a). Ecco quì data la ragione del perchè fia possibile guarire senza inconvenienti le leggieri perdite di fostanza, e non le grandi. Quando il Cerufico fiafi disposto a farne la cura, CELSO vuole, che incominci a tagliare i margini della divisione in modo, che lascino un'aja quadrata tra di fe, e poi che con inci-

quelle parti imprudentemente intrapresa. Il Louis traduce quelle parole: Si ( labra ) nimium contrasta funt s s la retration det levers est consideable, mentre all'opposto fignificano, se per avvicinare le due porzioni del labbro diviso, troppo si è raccorciato, sertuo, contrasto.

<sup>(</sup>a) Noi leggiamo in levi mutatione, e non mutitatione, tra perchè nel primo modo così fi legge nelle
migliori edizioni, e in rutti i tetit a penna, la parola mutitatione efsendovi finat intrusa a capriccio dal
COSTANTINO, e dal RONSEO, e perchè così porta
il fenso anzi decfi per avventura rogliere dai Vocabolari Latini la parola mutitato inferitavi fulla cola autorità di quetto luogo di CLISO. Vedafi il MORGAGNI EPIR III. in ELEXUM.

sioni trasversali tratte dai loro angoli interni finisca di separare la porzione di un lato da quella dell'altro lato, indi che faccia avvicinare a mutuo combaciamento quelle due porzioni in tal guisa separate: Ratio curationis ejusmodi est: id, quod curtatum est, in quadratum redigere: ab interioribus ejus angulis lineas transversas incidere; qua citeriorem partem ab ulteriore ex toto diducant: deinde ea, qua sic resolvimus, in unum adducere. Ecco come il Louis spiega questo passo.

Interpretazione del Louis. Il faut d'abord équarrir les bords de la division; puis faire intérieurement une incision transversale à chaque angle de la plaie, au moyens desquelles on puisse allonger la levre, & l'amener entièrement vers le bas .... E per render ragione di questa sua interpretazione, egli suppone, che CELSO col suo modo di operare avesse in mira di correggere due difetti, che qualche volta s'incontrano uniti nel vizio di consormazione delle labbra, che su poi chiamato labbro di lepre (a): CELSE savoit, que dans le bec

<sup>(</sup>a) I Greci da principio non aveano alcun termine proprio per denominare questo vizio di conformazione, il comprendevano fotto il nome generico di coloboma. Il lodato Autore delle Definizioni Mediche è forfe fato il primo a fervirii del termine lagocheilos, che fignifica labbro di lepre. Vedati il cap. 111. di detta Opera.

bec-de-lievre la levre est raccourcie par un défaut apparent de Jubstance suivant deux dimensions: elle est trop courte à raison de l'écartement des bords de la division, & du vuide plus ou moins grand, qu'ils laissent entreux; elle est courte par l'action des muscles, qui la tirent vers le haut, & lui font laisser la dent à découvert. Ora egli immagina, che colle incisioni trasversali, che crede prescriversi alla faccia interna del labbro, così interpretando le parole ab interioribus angulis, CELSO cercasse di rimediare al difetto, che tira in su il labbro, e lascia scoperti i denti: D'abord pour allonger la levre du haut en bas. on pratiquoit intérieurement à la partie supérieure de la division, de chaque côté, une incision transversale. L'intention est marquée d'une maniere bien précise, , ut citerior pars ab ulteriore ex toto , diducatur .

Ma noi rispondiamo primieramente; che qui Celso, come abbiam fatto osfervare fin da principio, dà precetti non particolari per le sole divisioni delle labbra, ancor meno pel solo labbro di lepre congenito, che accade al labbro superiore, ma generali per le divisioni e congenite, e accidentali sì del labbro superiore, che dell'inferiore, come pure per quelle delle orecchie, e delle na-

BERTRANDI TUM. TOM. I.

Confutazione di tale interpretazione . rici. Veda egli pertanto, come sia posfibile di applicare alle divisioni delle orecchie, e delle narici il precetto di fare le incisioni trasversali nel luogo, ch' egli suppone (a).

In fecondo luigo, quantunque da noi non fi neghi, poter effer vero, che Celso fapeffe, che qualche volta nel labbro di lepre congenito le due porzioni, o una fola del labbro fuperiore divifo, oltre che fono fcoftate l' una dall' altra zi lati, fono anche tratte in fu, qui però, nè in neffun altro luogo lo ac-

cenna,

<sup>(</sup>a) Che CELSO qui dia precetti generali, e comuni per la cura delle divisioni di tutte e tre quelle parti, non occorre addurne maggiori prove; che qui poi inoltre intenda parlare tanto del labbro fuperiore, che dell'inferiore, fi vede da tutto il contesto di questo cap., nel quale sempre si serve del plurale labra; infine che intenda parlare sì del labbro di lepre congenito, che dell'accidentale, fi ricava da un paffo del cap. xv. del lib. vi., nel quale dopo aver proposti vari medicamenti per arrestare il cancro della bocca, foggiunge: Si nihil medicamenta proficient, ulcera erunt adurenda. Quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius est. Et id quidem æque adustum, atque excissim sine ea cu-ratione, quæ corpori manu adhibetur, impleri non potest. Dalle quali ultime parole fi vede, che CELSO fi riferba di parlare della cura dell' ampia divisione delle labbra rimafta, dopo l'ampurazione di una loro porzione cancerosa nel libro seguente, ove tratta della cura delle malattie Cerusiche, in quibus vulnus facit Medicus, non accipit ( de Medicina lib. v11. in præfat.) Ma in qual altro luogo di questo libro tratta egli di quella divisione accidentale delle labbra, se non ne parla in questo nono cap.?

cenna, nè dice cosa, onde, non diciamo, apparisca precisamente, ma neppur si possa conghietturare, ch' egli abbia avuto l' intenzione di trarre in basso esso labbro con incisioni trasversali fatte alla sua faccia interna. Imperciocchè, per denotare detta faccia interna, CELSO non avrebbe mai usato l'espressione ab interioribus angulis, ed è cosa ridicola il credere indicato di una maniera precifa quell' allungamento del labbro in giù con quelle parole: Quæ ( lineæ ) citeriorem partem ab ulteriore ex toto diducant.

Ouanto è stiracchiata, immaginaria, e in nessun modo corrispondente al testo l'interpretazione del signor Louis, altrettanto è naturale la nostra, e adeguata alle parole latine. La prima cosa raccomandata da CELSO è id, quod curtatum est, in quadratum redigere, cioè di render cruenti, e ben uguali i margini della divisione con un taglio perpendicolare a ciascheduno, sicchè, fatti esattamente paralleli, rimanga tra essi un'aja quadrata, in vece che prima, fia per le loro ineguaglianze, fia per la loro obbliquità, rappresentavano un triangolo, o una figura irregolare. Fatte le incisioni perpendicolari, i pezzi di sostanza recisi restano per anco superiormente attaccati in modo, che vi fono quattro

6 2

quattro angoli, due interni, che sono il termine dell'antica foluzione di continuità, e due esterni, uno destro, e l'altro finistro, fatti dalle estremità superiori delle incisioni perpendicolari. CELSO adunque vuole, che si traggano due incisioni trasversali dagli angoli interni agli esterni ab interioribus ejus angulis lineas transversas incidere, onde finire di separare la parte destra dalla sia nistra, o, come egli si esprime, la parte di quà da quella di là, quae citeriorem partem ab ulteriore ex toto diducant. AVICENNA (a) descrive in poche parole . ma chiare , e precise il modo di preparare alla riunione il labbro, e il naso divisi, dalle quali vien maggiormente confermato il fenso da noi dato

fioni sì perpendicolari, che trasversali. Fatte queste incisioni, se i due margini della divisione non si possono sufficientemente avvicinare, CELSO raccomanda allora di fare al di là delle già

al metodo di CELSO: Quum labium, & nasus sunt diminuta (dice egli), oportet tunc, ut aperiatur membrana, & difcooperiatur cutis ab utroque latere, & incidatur caro, quae est in medio; nel qual testo si vedono indicate le inci-

<sup>(</sup>a) Lib. IV. fen. VII, traft. IV. cap. 4.

fatte altre due incisioni semilunari rivolte verso la piaga, le quali non oltrepassino la cute; conciossiachè in questa maniera ( dice egli ) le parti da avvicinarfi più facilmente cedono, perchè questo avvicinamento non debb' effere proccurato con troppa forza, ma in modo, che le parti tratte si avvicinino con facilità, e lasciate in libertà di molto non si scostino: Si non satis junguntur, ultra lineas, quas ante fecimus, alias duas lunatas, & ad plagam conversas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur. Sic enim fit, ut facilius, quod adducitur, sequi possit: quod non vi cogendum est, sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, & dimissum non multum recedat . Il signor Louis è d'avviso, come già abbiamo detto, prescriversi in questo luogo da CELSO le incissioni semilunari alla faccia interna delle gote vicino agli angoli della bocca, e crede, che voglia, che con esse si tagli la membrana propria di essa bocca, e i mufcoli, lasciando intera la fola cute, e lo prova con quest'argomento: le incisioni trasversali si facevano internamente ( ab interioribus angulis ) ; le semilunari doveano farsi al di là delle trasversali (ultra lineas, quas ante fecimus): dunque anch' esse doveano farsi internamente. Falsa essendo la maggiore,

giore, come parci avere di quì fopra incontrastabilmente provato, falsa è anche la conseguenza, e le parole latine essendo affatto conformi alla nostra interpretazione, cioè da esse apparendo ad evidenza, che le incisioni semilunari sono da CELSO proposte esternamente alla pelle, che fola si dee tagliare, lasciati intatti i muscoli, noi non ci arresteremmo davvantaggio intorno questa questione, se il signor Louis dopo aver voluto provare, che era un affurdo in grammatica il credere, che CELSO pre-Icriva le incissoni semilunari esternamente alla pelle, non si affaticasse di dimostrare, ciò essere un assurdo maggiore in Chirurgia.

Il precetto dato da CELso di fare quelle incifioni alla pelle non è contrario ai principi di Chirurgia , come pretende il Lo-UIS.

Dice egli adunque (a): Le génie de l'art n'a pas dicté le conseil de faire ces incissons extérieures: ce n'est pas la peau qui forme l'obstacle à la reunion, & c'est elle que l'on propose de couper, pour favoriser le rapprochement des parties. Voilà l'absurdité, & l'on ne peut trop la faire sentir. Noi sappiamo, e prima di ogni altro ce ne ha avvertito il BERTRANDI (b), che la maggior resistenza, che incontrasi nel labbro di lepre ad av-

<sup>(</sup>a) Academ. Royale de Chirurg. tom. V. pag. 329. (b) Trattato delle Operazioni tom. 11. pag. 156.

vicinare le parti scostate, nasce principalmente dalla contrazione dei mufcoli delle labbra, dai quali pure viene la difficoltà di mantenerle a contatto, avvicinate che fono; fappiamo, che con quelle incisioni semilunari tagliandosi solamente la cute, pure i muscoli delle labbra non cedendo, quell' accostamento difficilmente si otterrebbe, o sarebbe men sicuro (a); neppure ignoriamo, quanto fia cedente; ed allungabile la fostanza delle labbra, di maniera che, quantunque ampia sia la divisione, pur tuttavia quasi sempre si possono ridurre a contatto le parti divile, e scostate, massime mettendo in pratica ne casi difficili l' ottimo configlio di FABRIZIO d'ACQUA-PENDENTE, di accostumarle a poco a poco all' approffimazione per mezzo delle collette (b). Per queste ragioni noi siamo lontanissimi dal credere, che mai le incisioni semilunari proposte da CELso possano nella cura del labbro di lepre effere indicate, e recare un' utilità reale. Ma non vediamo, perchè CELso, il quale non poteva avere tutte le accennate cognizioni anatomiche,

<sup>(</sup>a) BERTRANDI ibid. pag. 147. (b) De chirurg. operationibus cap. XXIX.

logiche, e patologiche, debba effere tacciato d'imperizia nell'arte, se non conoscendosi allora altro mezzo migliore. per rendere feguaci le parti ritratte, uno che in certi casi poteva ne propone, essere di qualche vantaggio. Imperciocchè non v' ha dubbio, che per mezzo di quelle incisioni semilunari fatte alla pelle più facile riesca l'approssimazione delle parti divise. Chi nol crede, ne faccia l'esperienza sopra i cadaveri, e ne resterà appieno convinto. Tanto meno da sprezzarsi ci sembrera questo mezzo, se si riflette, essere da CELSO proposto non pel solo labbro di lepre, ma anche per le divisioni delle orecchie, e delle narici, nelle quali parti, tolta che fi è porzione della cartilagine intermediaria, che potrebbe recare qualche impaccio, certamente le incisioni semilunari della cute potrebbero effere più vantaggiose, che alle labbra....

Bensi quello, ch' effo gli affibbia. Ma allo ncontrario non farebbe egli. veramente un affurdo il mezzo attribuito dal signor Louis a Celso di fare nel labbro di lepre quelle incifioni dentro la bocca; tagliandone con effe la membrana propria, e i mufcoli, lafciata intatta la fola pelle? E'egli vero, che tette sedion detrussoit l'adion retradive, E la peau seule dans ce cas prévoit sans

difficulté à l'extension nécessaire (a)? Ognun fa, quanto fiano intimamente uniti alla pelle i muscoli delle labbra. massime in vicinanza degli angoli della bocca, dove tutti insieme si confondono, e dove dovrebbonfi fare le incifioni semilunari; conseguentemente sarebbe cosa difficilissima, per non dire imposfibile, il tagliare efattamente in tutta la loro spessezza que muscoli senza ossendere la pelle; e non tagliandosi in tutta la loro spessezza, chi non vede, che maggiormente, e inugualmente fi contrarrebbero, onde maggiore farebbe la loro forza nello scostare nuovamente le parti avvicinate, senza parlare degli atroci dolori, e delle convultioni, che non potrebbono non succedere. Egli à chiaro adunque, che poco, o nessun vantaggio, anzi forse un danno reale si otterrebbe da quelle incisioni interne, in vece che qualche bene si potrebbe ricavare dalle medesime fatte esternamente. Ecco adunque, che il signor Louis affibbia a CELSO un precetto di Chirurgia, che è veramente un affurdo, mentre cerca di discolparlo da un preteso abbaglio, che in que tempi era un precetto

<sup>(</sup>a) Academ, de Chirurg, loc. cit. pag. 334.

cetto affai buono, ed ecco che il BERTRANDI, e tutti gli altri valenti Cerusici di sopra nominati hanno benissimo interpretato il Romano Scrit-

ferviva del tare i marginidella divisione .

tore. Potrebbesi domandare, di quale strumento CELSO si servisse per fare le incisioni perpendicolari, e trasversali, se del gammautte, oppur delle forbici. Noi siamo di sentimento, che si servisse del gammautte, prima perchè l'espressione lineas transversas incidere sembra indicare uno strumento semplice da taglio, poi perchè nel cap. precedente, dove raccomanda di cruentare i margini della divisione dell' orecchio, nomina espressamente per tal uso il gammautte deinde oras scalpello exulcerare. Noi pertanto non diremo, che il signor Louis, dove vuol provare, che il gammautte vuol effere preferto alle forbici, per cruentare i margini del labbro di lepre, avrebbe dovuto corredare la fua opinione dell'autorità di CELSO, perchè ci potrebbe rispondere, come ha già risposto a quelli, che gli hanno fatta la stessa obbiezione, che ce fut la crainte de donner trop d'étendue à ce Mémoire, que m'empêcha de traiter historiquement ce point de l'art .... Les Anciens ne se servoient que du bistouri pour cette opération

ration (a); diremo bensì, che là, dove afferisce, che les Praticiens ont suivi assez aveuglement les préceptes donnés par les Auteurs sur la maniere de rafraichir les bords de la division; tous se servent de cizeaux, & aucun n'a pense, que cet instrument formé par deux tranchans assez grossiers ne coupe qu'en machant (b) avrebbe dovuto eccettuare il BERTRAN-DI, il quale raccomanda espressamente il gammautte (c). Che se per difenderfi dall'accufa di plagiato, che con molto fondamento gli potremmo dare, volesse rispondere, che il BERTRANDI ha da lui imparato questo metodo, mentr' era suo ospite, noi gli risponderemo, che in quel tempo egli non avea ancora deposto il volgar pregiudizio dell'uso delle forbici; conciossiachè così si esprime nell' Enciclopedia all' articolo Becde-lievre : Pour rafraichir les levres de la division .... on se sert des cizeaux, ou du bistouri, senza spiegarsi, a quale di questi due strumenti debbasi dare la preferenza. E poi concedendogli anche tutto quanto vuole, qual'occasione più opportuna gli si poteva mai presentare, onde

Il BER-TRANDI condanna l' ufo delle forbici prima del Lo-

<sup>(</sup>a) Academ. Royale de Chirurg. tom. V. pag. 317. (b) Academ. de Chirurg. tom. IV. pag. 392. (c) Trattato delle Operazioni tom. 11. pag. 149.

onde lodare l'indole docile, e' seguace del fuo fcolaro, che là, dove con sì poco garbo declama, e fa tanto fchiamazzo contro que' Maestri, i quantunque aveffero veduto la facilità di cruentare i margini della divisione col gammautte, e sentite le ragioni di preferenza, che dee avere sulle cesoje, continuavano tuttavia a fervirsi di queste? Il Bertrandi almeno dovea essere escluso dal numero di que' Professori, dei quali il signor Louis dice, qu'il est fâcheux, que l'enseignement soit confié à de pareils Maîtres, " mox daturos pro-" geniem vitiofiorem (a)? "

Noi finiremo per ora le nostre osservazioni sul Trattato delle operazioni del BERTRANDI, e ritorneremo alla sua vita, che si approssima al suo termine. Il meritamente rinomatissimo sig. BOURGELAT avea nel 1761. ottenuto dal Resuo Padrone la permissione di aprire nella Città di Lione una pubblica Scuola veterinaria, a cui nel 1764. diedesi il titolo di Reale. Appena il BERTRANDI ebbe notizia di un così utile stabilimento in Francia, che rappresento al ReCAR-

<sup>(</sup>a) Acad. de Chirurg. loc. ultim. citat. pag. 398. Si polsono anche leggere le riflessioni, che sa a questo proposito il signor VALENTIN pag. 315., e 316. delle sine Recherches sur la Chirurgie moderne.

Induce il Re allo stabilimento di una scuola veterina-

CARLO EMANUELE, di quanto vantaggio farebbe anche stato nel nostro Paese. Era memore quell'avvedutissimo Principe della orrenda ftrage, che l'epizoozia bovina avea fatto negli anni 1744., 45., 46., e 47. non solamente in Piemonte, ma anche per tutta l'Italia, anzi per quasi tutta l'Europa, sicchè poco mancò, che non fosse distrutta la spezie di quegli utilissimi animali. Il BERTRANDI conseguentemente, quale in quell'occasione era stato mandato più volte dall' Eccellentissimo Magistrato de Conservatori Generali di Sanità infieme col Dottor BRUNI a spararne i cadaveri, onde investigare la natura di quella mortifera pestilenza, non dovette molto faticare per persuadere quell'ottimo Re, il quale subito diede ordine al BERTRANDI medefimo di cercare fra i fuoi Allievi un foggetto capace di secondarne le mire. Non sapremmo però dire, se per l'amore, che ci ha fempre portato, non siasi troppo ingannato nella scelta, coll'avere al Re proposto uno di noi, che scriviamo le presenti Memorie, il quale, malgrado tutta l'applicazione, e la buona intenzione, che ha sempre avuto, non ha certamente potuto corrispondere appieno all' aspettazione di quel beneficentissimo Sovrano, e di chi l' ha proposto. MenIncomincia ad ammalare nel 1764.

Mentre stava egli lavorando attorno un Trattato di Anatomia geometrica destinato principalmente all'uso della Pittura, e della Scoltura, e a pulire la Storia della Chirurgia antica paragonata alla Chirurgia moderna, opere tutte e due, che doveano essere ben avanzate, quantunque finora non fia stato possibile di scoprirne i manoscritti, la morte venne innanzi tempo a involarcelo. Fin dall' anno 1764. del mese di Ottobre avea avuto qualche difficoltà nel refoirare, che andò insensibilmente crescendo. În Febbrajo dell'anno seguente si sospettò dalla gonfiezza edematosa delle gambe, che vi fosse un' incominciante idropisia di petto. Cogli appropriati rimedj, e sopra tutto coi diuretici parve nella proffima primavera, che si ottenesse qualche miglioramento. Andò nella state a cangiar aria in Moncalieri; ma appena eravi dimorato un mese. che la respirazione si fece ancor più difficile, maggiormente le gambe gonfia-rono, e vi si aggiunse l'ascite. Ritornato a Torino, gli si fece la paracentesi dell'addomine, che proccurò una tregua al male; un mese dopo su d'uopo ripeterla, ma non fu più ugualmente vantaggiosa, poco dopo la gonfiezza delle estremità inferiori crebbe a un segno tale, che fu necessario farvi delle fcascarificazioni, alle quali non tardò guari a fuccedere la cancrena, che il tolle di vita tutto raffegnato agli eterni voleri, in piena conoscenza, e coi più edificanti sentimenti, ed espressioni di cristiana pietà addl 6. di Dicembre dell' anno 1765, in età di 42. anni, e quasi due mesi. Noi crediamo non potersi meglio da noi terminare questo Ragionamento, che colla Lettera scritta il giorno dopo all'occasione della morte di questo grand' Uomo dal sovralodato sig. Conte di Orbanssano al Brugnone, che in quel tempo dimorava in Lione.

Mr. BERTRANDI est mort la nuit du 6. à 2. heures après minuit. Cest, Monfieur, avec tout le regret possible, que je vous annonce la perte d'un Homme, dont vous vous faites gloire de tenir toutes vos connaissances, & à qui notre Patrie doit la sondation d'une nouvelle école de Chirurgie inconnue avant lui. Cest lui qui faisant connaître par son propre exemple toutes les parties philosophiques, qui étaient de l'essence de son art, & qu'on avait regardées jusqu'alors comme etrangeres, en a montre toute l'étendue; & purement mécanique, où il avait été plongé jusqu'à nos jours, en a si son tester l'éclat, & la dignité. Grand dans ses projets

96

jets, & courageux dans la maniere de les proposer il n'avait d'autre bût que la gloire du Monarque, auquel il faisait l'aveu sincere de lui devoir presque tout son être, & le bien de ses concitoyens, qu'il aimait tendrement sans le paraître. Cet homme né pour sentir le vrai en toute chose n'avait paru s'en éloigner quelque peu dans plusieurs sujets les plus intéressans pour l'homme, & pour le Chrétien, que parceque il avait eté trop ap-plaudi dans sa jeunesse, tems, où un désir mal entendu de frapper, & de plaire l'emportaît malgré lui à avancer des paradoxes, qu'il désavouait ensuite dans le silence de ses passions. Dieu ne voulut point, qu'un tel homme, qui avait tant fait pour le bien de ses semblables, sut perdu, & l'éprouvant par une maladie longue, & pénible il lui donna le tems de reconnaître ces mêmes vérités, pour lesquelles il était plus propre, qu'aucun autre à cause de ses grandes lumières. Cest à ses éleves, & à vous, Monsieur, en particulier, qui en étiez si fort estimé & si tendrement aimé, de le faire revivre en l'imitant, & de dédommager notre Patrie par la renaissance de plusieurs grands Hommes, qui l'égalent. Ces font, Monsieur, les vœux de celui, qui vous honnore, & qui vous est entièrement devoué.



## ORAZIONE

SOPRA GLI STUDJ

## PER LA CHIRURGIA

LETTA NELLA REGIA UNIVERSITA' DI TORINO
LI V. NOVEMBRE MDCCLVIII.

SE i Prencipi coll' armi difendono, e dilatano gl' imperi, colla coltura delle scienze, ed arti li rendono illustri, doviziosi, potenti, e sicuri, e quel Conquistatore, che da principio forse meno piacque, è poi amato come protettore, e padre. Non rammenterò Atene, e Roma, che allora ebbero più vasto, e possente l' impero, quando co' più valorosi Capitani fiorirono nelle Repubbliche i più dotti Magistrati, ed i più industri Artessici; che anco il nostro secolo ha ve-

BERTRANDI TEM. TOM. I.

duto nazioni barbare, neglette, ed incolte effere pervenute a meritar estimazione, gloria, ed autorità fra le più colte d'Europa, dappoichè un ottimo Principe le traffe da quella loro ferina negligenza all' amore delle belle arti, e delle scienze, ed altre si videro cadere nell' ofcurità, e nel disprezzo, quando per la barbarie de Principi le une, e le altre lor furono impedite, e tolte; e se veggiamo vasti, e doviziosi imperi. ove elleno fono in disprezzo, e in odio, ivi la tirannide ha il suo seggio, e non meno il comando è senza diritto, che l' obbedienza fenza ragione; miseri sono i popoli nella stessa loro ricchezza, che appena possono con una sterminata moltitudine supplire al difetto di quelle scienze, ed arti, di cui fon privi. Le scuole dunque, e le Accademie non meno de' numerosi eserciti, e delle forti rocche fervono alla ficurezza, ed alla felicità de' Regni . Esse proveggono i Ministri del Tempio, e dello Stato, que' della pubblica falute, e tutti gli altri Dottori, ed Artefici, che servono ad istruire, a dilettare i popoli, o a rendere più comoda, e più ficura la vita. Ma se in ciò la provvidenza de Principi è d'ogni maggior laude degna, quale non debbe essere la sapienza, ed il zelo di quelli, che da essi sono scel-

ti, e condotti ad ammaestrare la gioventù? Questa considerazione, SIRE, \* mi riempì l'animo di timore, di diffidenza, e d'irresoluzione, allorchè in un giorno folo mi elevaste al sommo onore di Vostro Cerusico, e di Profesfore in questa Regia Vostra Accademia; che fe io poteva certamente promettere un ardentissimo zelo per servire, ben conosceva, quanta perizia, e dottrina mi mancasse, perchè mia servitù fosse utile alla Patria, che nell' innalzarmi ad un sì onorevole magistero questa fu la fola vostra intenzione, come dovrà essere certamente il mio folo dovere. Egli è vero, che l'arte, la quale io debbo insegnare, è così lunga, e difficile, che la mia età potrebbe scusarmi, se a quella dottrina, e perizia non fossi ancor pervenuto, e come questa mia presente infufficienza ingenuamente confesso, egualmente fento quel mio dovere, che non potrò giammai dimenticare. Per la qual cosa ho creduto di non poter far meglio stammane, che esporre, come sia per irvi dietro meco conducendo questi ottimi

<sup>\*</sup> La Cattedra dell'Oratore nella gran Sala della Regia Università è dirimpetto al Trono del Re-, fotto cui evvi il suo Ritratro, e le Guardie a lato, colle Persone dell' Eccellentissimo Magistrato della Risorma, che fedono appit del Trono.

ottimi Giovanetti, che con tanta bontà, e follecitudine, CLEMENTISSIMO MONARCA, avete alla mia cura raccomandati; nè potrò mai con quefto difcorfo, quantumque fosse di ragioni, e di configli fervido, pienamente dimostrare quella aspettazione, che Voi avete di loro, e che tante volte mi avete figni-

ficata.

Se i bifogni, i comodi, ed i piaceri della vita furono i Maestri, che infegnarono le arti agli uomini, trovatifr effi, dopo la lagrimevole caduta de' primi Padri, sprovveduti, deboli, e senz' armi in questa terra incolta, e dirupata, tra corpi rozzi, mal sostenuti, e spesso cadenti, tra il fuoco, ed il gelo, al furor dei venti, e delle pioggie, di bestie feroci, e velenose, inesperti a custodirsi, a difendersi, ed a scegliere gli alimenti, se stessi insidiando, ed ossendendosi, cominciarono ad aver bisogno di Medicina, tosto che da quel felice stato cadettero : Ipsa necessitas coegit homines, scriffe CELSO, medicinam inquirere, & invenire, e questa fu il non favoloso Apolline; le bestie stesse, non che le genti barbare, per un certo naturale istinto la cercano, e ne fanno prova: ma se il corpo animato di tutti i creati dalla natura è il più capace di rimedio, questo egli è altrettanto difficile,

e sovente pericoloso; imperciocchè come la stessa sottigliezza, e varietà del foggetto appresenta una gran facoltà di medicare, altrettanto porge una grande facilità all'errore: per la qual cofa la Medicina fu sempre mai un'arte di conghierture, ardua, e difficilissima, la quale quantunque dal tempo del divino IP-POCRATE mercè le scoperte dei Filosofi, e degli Anatomici sia finalmente pervenuta ad avere alcuni principi evidenti, nulladimeno nell' efercizio così difficilmente vi si appone, tanti ostacoli incontra, e tanti pericoli, che sono eterne le querele degli increduli, e indiscretamente le si niega, che al possibile sempre più si avvicini; ma quelle que-rele, e que clamori anco da più ostinati disprezzanti increduli della Medicina fempre fono terminati coll' antichissimo elogio della Chirurgia. Ea non quidem medicamenta, atque victus rationem omittit, sed manu tamen plurimum præstat, estque ejus effectus inter omnes Medicinæ partes evidentissimus; siquidem in morbis cum multum fortuna conferat, eadem sape salutaria, sape vana sint, potest dubitari, secunda valetudo medicina, an corporis beneficio contigerit. In his quoque, in quibus medicamentis maxime utimur, quamvis profectus evidentior est, tamen sanitatem & per hæc frustra quæri, & sine his reddi sæpe manifestum est ,... at in ea parte, que manu curat, evidens est, omnem profectum, ut aliquid ab aliis adjuvetur, hinc tamen plurimum trahere. E come quelli di questo elogio fi servono per mitigare l' onta della loro incredulità per l'altra, egualmente fe ne servono per far sentire a noi Cerufici, che non ci sarà perdonato ogni qualunque minimo errore. Peníate dunque, Giovani amatissimi, quale sia la vostra impresa una tal' arte stimatissima intraprendendo. Ma se quest' arte ha il prezioso vantaggio d'essere la parte di Medicina la più ficura, ella però non può avere quella tanto lodata ficurezza senza tutte quelle scienze, ed arti, per le quali è più stimato un Medico. E ciò essendo verissimo, quale speranza potranno avere quelli, che senza educazione, fenza coltura, fenza ingegno osano intraprenderla? Non l' infortunio, non la difficoltà dell'arte può scusare i nostri errori, che come appajono tosto fatti, perciò si pretende, che meglio se ne possano prevedere i peri-coli per scansarli; ed intraprendere una tal' arte senza la necessaria provvisione, ella è tanta temerità, che se non con nostra onta, miseria, e disprezzo, se pure senz' altro castigo, si può rimanere a mezza strada. Come disse della Medicina

dicina (a) IPPOCRATE, così fuol dirsi da alcuni a' nostri dì della Chirurgia : , Ella è un' arte nobilissima, ma per . l'insufficienza di alcuni, che la professano, e di que, che per essi di " tutti gli altri giudicano, ella è divenuta infima ad ogni altra. Del qual errore questa loro pare la cagione principale, che a quest' arte sola non .. vi fia stata stabilita alcuna pena, fuor-" chè l'ignominia, della quale que' miferi non possono avere sentimento. , Essi, dice IPPOCRATE, sono simili agli Attori delle Tragedie, i quali ,, rappresentano e per gli atti, e per " l'abito quelli, che in fatti non sono. , Chiunque vorrà effere in quest' arte " faccente, converrà, che il divenga ", co' feguenti mezzi: natura, dottrina, , luogo atto agli studi, educazione, in-" dustria, e tempo. La natura debb' effere la prima, la quale se ripugna, ", ogni fatica è perduta, ma con quella " ogni profitto è facile, e maggior-, mente se colla dovuta educazione sia-" mo portati in luogo comodo per " imparare, e la prudenza ci conduca, " ma ci vuol tempo, ficchè colmi di , dottrina continuamente crescendo pro-

<sup>(</sup>a) Hippocr. lex pag. 1., & 2. ex edit. Foefii.

" duciamo ottimi frutti. " Se quella natura avete, Giovani amatissimi, il tempo, il luogo, ed il comodo ve li porge la munificenza del RE, ficchè il voto d'IPPOCRATE sia appieno per voi foddisfatto; e se non v'è legge, per cui sieno esclusi dalle scuole gl'ignari, e privi d'ingegno, come dalla milizia i deboli, e mal composti della persona, la miseria, ed il disprezzo, in cui essi fi vedono rimanere, dovrebbe diffuaderli, se alcuna volta potesse avere egual forza l'esempio, che la legge. Avendo dunque avuta la necessaria educazione negli studi delle lingue, e della Filosofia, dovrete poi con somma sollecitudine, e fervore intraprendere lo studio dell' Anatomia, principio, e base di nostr' arte, sicchè ne acquistiate una piena fodiffima cognizione; una piena, diffi, e fodiffima cognizione, imperciocchè una linea di maggiore, o minore spazio ad uno de'lati, oserei dire un punto possono rendere un' operazione felice, e stupenda, o mortale. Solamente pei morbi organici, e pei consensi giova l' Anatomia ai Medici, ma i Cerufici dovendo perpetuamente ricomporre parti scomposte, o toglierne le superflue, e dannose, e per lo più con mezzi forti , e violenti a traverso queste, e quelle altre parti, che si debbono ſmuo-

Anatomia.

fmuovere, o sfuggire, con quanta efattezza, e quanto minutamente non dovranno conoscerne l' ordine, e la composizione? Ogni parte conta nel corpo umano, fe non per altro, almeno per evitare un maggior grado di dolore. Ignorantia eorum, disse pur bene GALENO (a), quæ per exquisitam Anatomen inveniuntur, in rebus quidem securis timidos, in periculosissimis autem maxime audaces quotidie reddit. E nell' operazioni il timore non meno, che l'audacia fono degni di riprenfione, e pericolofi, quando dipendano da ciò, che s'ignora d' Anatomia. Se esaminiamo la ragione di alcune cose, nelle quali la Chirurgia degl' Antichi può fembrare ad alcuni meno instruiti della storia dell' arte, rozza, ed infufficiente principalmente pe' raziocinj Teorici, vedremo ciò essere accaduto, perchè in que' tempi l' Anatomia nè da' Greci, nè da' Latini, nè dagli Arabi era coltivata se non fui bruti. GALENO stesso, il Principe degli Anatomici antichi, confessa di non avere mai inciso alcun cadavero umano, fe-non uno, che fracido, e lacero trovò appiè d'una montagna. Mondino, BERENGARIO, MASSA, VESALIO, FAL-

<sup>(</sup>a) De Anatom. administrat. lib. 2. cap. 3.

LOPPIA, EUSTACHIO, COLOMBO, FA-BRIZIO d' ACQUAPENDENTE, e CAS-SERIO avendo illustrata l'Anatomia co' loro rigorofi efami, e colle loro fcoperte, accrebbero tanto lustro alla Chirurgia, che, vivendo essi tutti in Italia, da ogni parte d' Europa concorrevano gli stranieri per quivi apprendere, non si sapeva, se più l'Anatomia, che la Chirurgia, tanto queste due arti sono inseparabili; e sino verso il fine del Secolo paffato Pavia, Padova, Bologna, Roma, e Napoli furono di amendue quelle arti le scuole prescelte, e le più illustri, come per la stessa ragione sono pervenute alla stessa gloria in questo secolo Parigi, e Londra. Le azioni Cerusiche sono terminate e ne' modi, e tra gli spazi sopra una macchina composta di varie altre macchine con determinato ordine apposte, e distribuite; col lume dell' Anatomia vi si guata dentro, colla mano armata francamente vi fi penetra, oppure si sfugge il pericolo, se egli non è talmente inevitabile, che abbiano a deporfi l'armi, ed allora nemmeno fi puote accufare l'infufficienza dell' arte, ma la gravezza del morbo visibilmente irreparabile, mancando piuttosto lo spazio, che il modo della onerazione. Siano esempio del migliora-mento, che acquistò nostr' arte coll' Anatomia.

tomia, i varj modi trovati per estrarre il calcolo dalla vescica, l'estrazione della cateratta, la cura delle fistole lacrimali, e dell'ernie, e la perfezione, a cui si è ridotta l'arte d'ostetricare, prima tanto infufficiente, e crudele. Il ricomponimento delle offa slogate, ed infrante per le tante sì composte, e voluminose macchine degli antichi era difficile, e faticoso; i celebri Petit, e Du-Verney ne'loro trattati avendo efposto esattamente secondo i dati scomponimenti le mutate direzioni de' muscoli, le apposizioni delle parti resistenti , e delle rilassate hanno insegnati modi più facili, e meno dolorofi per ricomporli, ed ora più giova la destrezza insegnataci dall'Anatomia, che allora la forza delle pefanti compostissime macchine. Dirollo arditamente, non folamente le principali direzioni de' maggiori vasi, e de' nervi, le apposizioni de' più grossi muscoli, la tanto comune descrizione delle ossa basta a' Cerusici; ma per non confondere i fintomi, e per non paventare d'essi, ove non debbono contare, e per non disprezzarli in altri, quando essi fanno la maggior gravezza del morbo, e porgono la principale indicazione, anco la più minuta Anatomia si debbe possedere. I morbi, che dobbiamo curare, fono perpetuamente

mente organici, nè lo stesso organo per le stesse parti, e cogli stessi modi si può sempre racconciare, o incidere, che non si debbano variare i modi, e gli spazi, locchè non potrà mai intraprendere con un ragionevole coraggio il Cerufico, fe egli è incerto, e mal ficuro di quell' altra strada, per cui deve penetrare. Bifogna dunque, ch' egli veda cogli occhi della mente in tutto il folido, e per ogni lato, nè ciò si può, se non con quel vasto lume dell' Anatomia, col quale le parti tutte insieme nel lor ordine, e simmetria avvincolate, ed apposte pe'vari angoli, e per le varie superficie chiaramente al nostro spirito s'appresentano schiette, e non confuse; altrimenti ne' casi difficili il nostro timore, e la nostra incertezza faranno alcuna volta reprensibili, o la nostra audacia pericolosa. Nè molto giova conoscere delle parti il sito, le connessioni, e la figura, se gli usi, le corrispondenze di meccanismo, e d'azioni s'ignorano, ma debbe essere, come dice l'ALLERO, l'Anatomia animata, perchè, non meno che il cadavero freddo, e senza azione, si conosca l' uomo vivente, che è di nostra arte il foggetto. Quanto le delicate persone inorridiscono veggendo i Giovani Anatomici refistere all' orrore, ed al lezzo de' cadaveri , altrettanto gli uomini

Fisiologia.

capaci ne compiangono la spaventosa fatica, veggendogli anelanti, affaticati partire i cadaveri a brani, ed applaudirsi d'aver ripulite offa, schiantate viscere, e sparti muscoli, nervi, e vasi, e lordi di fetente succidume, e d'atro sangue intrisi vantarsi Anatomici, quando pur pajono macellaj di carne umana. Evvi tanta differenza, oserei dire, tra l'incifore, che non combina, non conghiettura, e non sa animare le parti, che ripulisce, e divide, e l'Anatomico, che col lume delle meccaniche, della Fisica, e della Chimica i modi della vita ne scorge, come fra quegli, che può contar l'ore d'un oriuolo, perchè su caratteri vede volgerfi la sfera, e quegli, che potrebbe ridonargli, ritardargli, o accrescergli il movimento, perchè conosce delle ruote gli ordini, e le azioni, e tanto giova per l'arte di medicare una descrizione Anatomica, che non conduca ad intendere qualche azione dell' animal vivente, come le tante piante de' Botanici, delle quali, quantunque minutamente descritte, se ne ignorano gli usi. Per le une, e per l'altre vi abbifogna il Filosofo, che tragga profitto del creato da Iddio, ed esso merita la maggior lode, come lo scultore, che fè la statua, più che il villano, che trasse dalla montagna il marmo. Le azioni

azioni dunque bifogna conoscere non meno, che la struttura delle parti, e quelle sono tanto complicate, ed oscure, ma fostenute, e dirette per una tale indiffolubile, compostissima continuazione di macchine, e di forze, che, se lo spirito non le vede in tutta la loro vastità, e non ne comprende intero l' amplissimo sistema, poco capisce, dubita, si confonde, e stupido rimane nell' oscurità, principalmente allor quando dal morbo fono quelle macchine, e quelle forze esse stesse pervertite, e confuse. Contemplationes naturae, & corporum in simplicitate sua, ci ammonì saviamente BACONE, intelledum frangunt, & comminuum, contemplationes vero natura, & corporum in compositione, & configuratione sua intellectum stupefaciunt, & solvunt .... Illa enim ita versatur in particulis rerum, ut fabricas fere negligat; reliqua autem ita fabricas intuentur attonitæ, ut ad simplicitatem naturæ non penetrent; itaque alternandæ sunt contemplationes ista, & vicissim sumenda, ut intellectus reddatur simul penetrans, & capax. Questa è la grand'arte di esaminare, e di comprendere la natura, in altro modo farà mifero, e scarso il profitto, quanto saranno state minute, ed umili le nostre fatiche; e la grand' opera di Dio guardata

a quel modo cogli occhi d' una mente limitata, e ristretta parrà tanto piccola, quanto poco si capisce; quindi mille errori non meno nel comprenderla, che nel regolarla vacillante, ed inferma. Ma quegli, che non potrebbe facilmente comprendere il volgersi delle ruote della più groffa, o meno composta macchina di legno, o di metallo, potrà prefumere d'intendere l'economia del corpo animale, opera fovrana del fommo Iddio, macchina la più composta, la più meravigliosa, di squisitissimo senso, e di stupende azioni fornita? Ah che lo studio di tutta la natura, non che quello delle meccaniche, e della Chimica, come già diffi, appena può bastare per conoscere appieno una sì alta divina fattura, la quale pure pretendiamo colla nostr' arte difendere, e sostenere; Oui naturæ vias non noverit. diffe ottimamente lo stesso BACONE, quomodo is illi occurrere potest, eamque vertere? Quanto dunque sono degni di riso quegli stessi, che pur ridono di coloro, che dall' Anatomia delle bestie, e delle piante proccurano di trar lume per meglio intendere l'economia del corpo umano! L'uomo è alla cima della catena delle cose create, su per questa si dee salire a grado a grado per meglio comprenderlo. Il diffi, ed il ridico .

Teorica.

dico, una piena, fodiffima cognizione vi vuole del corpo animale, e di fua economia per intraprendere la nostr' arte, imperciocchè con quelle cognizioni, se de contrari, come si dice, la ragione è sempre la stessa, facilmente s' intenderanno i morbi, e meglio si potranno curare, cioè, vo' dire, si avrà una più luminosa, più soda Teorica; imperciocchè io per essa altro non intendo, se non quella scienza, per cui si dà ragione dei morbi, delle indicazioni. e de rimedi, e non que vani, osten-tati, fastidiosi, e per lo più fassi ciancioni, che hanno fatto piuttosto l'obbrobrio, che la gloria, ed il vantaggio di questa per altro elegante, e nobilissima parte di nostr' arte, a modo tale, che da molti un Teorico villanamente fia ripreso come un ciarlone, ed impostore. Ma la Teorica non è, se non ragione, e la ragione non è, se non verità, e questa non può essere, se non nuda, semplice, schietta, immutabile, perpetua, e perciò la vera Teorica non può effere, se non colla maggior parsimonia di parole; ed è pure un martoro per i veri Teorici, che ne debban far molte per istruire alcuna volta quelli, che non hanno i mezzi di capire una conseguenza, perchè mancano di principj, i quali sempre dipendono da una ferie

ferie di nozioni, che non si possono spiegare in poche parole. Non si può però negare, che l'una, e l'altra medicina abbiano ne' primi secoli tratto il maggiore vantaggio dail' efatta offervazione di ciò, che in certi dati casi giovava, o nuoceva; ma il bene, ed il male nella nostr' arte sono spesso equivoci, se sempre alle stesse cagioni si rapportano, e convien confessare, che come evvi un sistema di parti, e d'azioni, egualmente vi debba effere un sistema di morbi. Ho definita la Teorica ragione de' morbi per le loro cagioni, ed effetti; ragione delle indicazioni pei varj modi degli effetti presenti, e possibili ad accadere; ragione de rimedi per le varie azioni efficaci, infufficienti, od anco perniciose, ch'essi possono produrre secondo le varie cagioni, modi, od effetti de' morbi; e questi accadendo per ragione di una determinata struttura di parti, e di un determinato meccanico modo di azioni, e di morbo, si pretenderà sciogliere un tal nodo senza ragione di sistema, e di metodo? I gran Maestri sempre si lagnarono, che la vita fosse breve, l'arte lunga, l'occasione veloce, e precipitofa, gli sperimenti pericolosi, difficili i giudizj, e ciò perchè i morbi fono tanto oscuri, e complicati, la natura umana BERTRANDI TUM. TOM. I.

sì delicata, debole, inferma, e ruinofa; come dunque in sì breve vita, con fuggiasche occasioni, con pochi, incerti, mal giudicati sperimenti potremo sperare di riescire gran Maestri, quando i nostri sperimenti non sieno tratti dalla profonda contemplazione della Natura fana, e morbofa, ficchè se ne conoscano i modi, ed i termini? Ma queste due nature gli hanno certamente i lor modi, e, come dissi, meccanici, costanti però, fatti morbosi, vari, ed equivocamente appariscenti; bisogna esfervi all'aguato, le regole variano come i casi, e bisogna variar con essi di pensiero, e di opra: infomma l'arte di medicare è tutta prudenza, e la prudenza è un' arte di accomodarfi al giufto, al congruo, al possibile, interpretando le circostanze di tempo, di luogo, e di persone; e l'empirismo, che procede o con regole ristrette, perchè dubita della varietà del caso, che forse non v'è, o che temerario intraprende fopra una falsa apparenza, qual ragione avrà di ergere sì orgogliosa la fronte, e disprezzare quelli, che si fanno un religioso dovere d'impallidire sui libri, e fui cadaveri, d'affaticarfi, e spendere in esperimenti, di logorare la mente, ed il corpo in meditazioni, perchè l' una, e l'altra natura più chiaramente

conoscano? Dio immortale, qual cecità, qual orgoglio è questo! I giuochi stessi hanno le lor regole, e di quelle regole le ragioni, le quali secondo le varie combinazioni, e probabilità de casi variano, e l'astuto intelligente giuocatore, che prevede i casi possibili, come bina, muta, ripartisce, e sollecita la forte, se pure ve n'è alcuna, che si possa sperare. Io non vò dissimulare, che vi sieno casi terminati, limitatissimi, che in nessun modo possono variare, e sorprendere, ed a' quali può provvedere chiunque gli abbia alcuna volta veduti, quanto egli zotico fia, purchè capace di senso; ma dirò loro ciò, che diffe (\*) IPPOCRATE: Medicorum plerique malorum navium Gubernatorum mihi fimillimi videntur , qui, fi tranquillo mari navem regunt, nemo eos peccare deprehendat, quod si eos vehemens ventus, aut tempestas oppresserit, jam omnibus manifeste constat eorum imperitia, & culpa fuisse perditam; e se giungono a falvarla una volta fra la tempesta, neppure fanno, come fiafi falvata, e fe non per replicate difgrazie, e giungono a capirlo, se pure hanno acume d'ingegno per correggersi, e condurfi

<sup>(\*)</sup> Lib. de prisca Medicina pag. 11. edit. Foesii.

durfi in fomiglievoli casi; imperciocchè nemmeno io non vò negare effervi anco per la nostr'arte una certa forza, e perspicuità d'ingegno, colla quale alcuni per mezzo degli esempi prima osfervati, e delle prove prima fatte sentono le minacce, ed i favori della natura, quantunque bene non ne conoscano il meccanismo, e come l'uomo capace, ed instruito vede cose, che non può spiegare con parole; così essi fentono cose, le quali pure pienamente non capiscono, ed infine se un gran Pratico, invecchiando nell' arte, fi fostenne, e guadagnò applauso senza impostura, e senza audacia, egli fu certamente dotato di un grande ingegno, e può alcuna volta errare, non perchè non vi pensi, ma perchè gli manca quella per così dire intuizione, che sola s' ottiene collo studio dell' una, e dell'. altra natura. Ecco dunque provata la perpetua necessità del raziocinio, che pur viene in que Pratici, quantunque men sostenuto, e meno sicuro, ed esse per lo più ogni altro modo di ragionare non curando, oppure anco disprezzando, di quello vivono fastosi, ma esso non è, se non una muta ristretta Teorica. Quanto dunque dovrebbero essi lodare quell' altra tratta dalla cognizione della natura, e chi la possiede, quanto

maggiori ottimi frutti non dovrà prometterfi ? E se la storia delle varie Teoriche è quella de' più ridicoli, e de' più temerari errori dello spirito umano, vi farà forse ragione di condannarle tutte come inutili, e perniciose? Ella è la Teorica uno studio sublime, ed amplisfimo, una scienza di molte altre scienze composta, dai progressi delle quali essa dipende. Ne primi tempi, quando Maestri si applicavano a coltivare la Teorica sperimentale, che è l'una buona, le altre fcienze, dalle quali fi dovevano trarre i maggiori lumi, ed ajuti, erano scarse, oscure, insufficienti; per le nuove scoperte degli Anatomici, de' Chimici, de Filosofi quella oscurità diradò, si recò un nuovo lume, per cui molti errori sono stati tolti, e se altui sono stati introdotti, ciò avvenne per l'immensità, e somma difficoltà del foggetto; ma il vedere, che in tutti i fecoli, in tutte le nazioni uomini favi, e d'alto ingegno si sforzarono di recarvi lume, e vel recarono, non è forse una prova della somma necessità di averne alcuna? E dirolla infine la massima prova della necessità della Teorica, quantunque sia una prova, che ci avvilisce, e disonora: se alcun malato non men tormentato, che curioso del mal, che fente, interroga certi Maestri sulla ra-8 3 gione,

gione, e sui modi del suo male, quelli gli danno per contentarlo spiegazioni d' ogni forta, e per lo più vane, stravaganti, e ridicole, delle quali effo contentandosi mostra d'essere sciocco, e credulo; ma quelli non le darebbero pel loro onore, e per l'amore della verità, se potessero persuadere un uomo, quantunque sciocco, essere ogni Teorica, ogni raziocinio inutile; nè mai declamano contro la Teorica, ed i raziocinj, fe non quando un Competitore capace loro ne presenta, quantunque modestamente, una migliore, che non capiscono, o non vogliono capire. Infine fe fenza Teorica potesse l'arte giungere alla fua perfezione, perchè mai dopo tanti fecoli di sperimenti non vi pervenne? Infiniti fono i Pratici, pochiffimi i Teorici, e se qualche bene si è fatto, dicanlo i Pratici, se fu per loro soli, dicanlo, e ne dieno prova. Operare coll' esempio, e colla ragione non sarà più lodevole, e più ficuro, che col folo cieco inconsiderato esempio? Se siamo ciechi, farà prudenza gettare il bastone, e correre una strada, che non si potrà conoscere, se non dopo aver provati con nostro danno mille pericoli, e se pure una volta fe ne conoscano i viotoli, il primo palo, che 'vi si pianti, ci dia impaccio, e pericolo? Vedete dun-

dunque, Giovani amatissimi, quale debba effere il vostro studio per intraprendere a curare la vita degli uomini un' arte, che trae la sua disficoltà dall' eccellenza del foggetto, dalla moltiplicità, incostanza, e varietà de casi, non puote mai essere un' arte di semplice inconfiderata sperienza, e se alcuna volta tuonerà alle vostre orecchie la voce di alcuno, che condanni i vostri studi, ch' esso crede inutili per la pratica, non lasciate la magnanima impresa, e rispondetegli con CELSO: Quamquam multa fint ad ipfas artes proprie non pertinentia, tamen eas adjuvant excitando Artificis ingenium. Itaque ista quoque naturæ contemplatio, quamvis non faciat Medicum, aptiorem tamen Medicinæ reddit; profedo verisimile est, & HIPPO-CRATEM, & ERASISTRATUM, & quicumque alir non contenti febres, & ulcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideo quidem Medicos fuisse, verum ideo quoque majores Medicos extitisse. Il ripeto pero (perchè non vo diffimulare le difficoltà, e per così dire, la povertà del foggetto, che dovrebbe una volta effere ricchiffimo ), quantunque meglio fi conoscano in questo nostro secolo i principj, i modi, e le forze della natura, nulladimeno tutto ancora non fi cono-8 4 fce:

sce; nè v'è speranza, che si conoscerà, fendo dato a noi l'usufrutto piuttosto, che la scienza delle cose create, onde mai non si possa avere una teorica ad ogni caso, ad ogni questione pienamente satisfaciente, e come ciò egli è verissimo, tanto vi prego più, gentili spiriti, di studiarla con retto giudizio, niente abusando nè della natura, nè del vostro ingegno. Guardatevi dalla seduzione per il mirabile, dalla neghittenza, dalla prefunzione; dopo certi studi, fatiche, ed applausi una certa persuasione, un certo orgoglio ne nasce, che di tutto prefume, infinge, fimula, e confonde; quindi errori, ed errori, pei quali l'arte si lacera, mal si torce, e si disonora. Sentite del gran Cancelliere l'alta voce sui pregiudizi, e sugli abusi dell'ingegno umano in fomiglievoli casi: Quod mavult homo, id potius credit, rejicit itaque difficilia ob inquirendi impatientiam, sobria, quia coardant spem, altiora naturæ propter superstitionem ; lumen experientiæ propter arrogantiam, & fastum, ne videatur mens versari in vilibus , & fluxis ; paradoxa propter opinionem vulgi, denique innumeris modis, iisque interdum imperceptibilibus affectus intelledum imbuit, & inficit. Meglio sarebbe non averne alcuna teorica, che averla tale, che conduca alla prefunzione;

zione, all' impostura, alla temerità, agli errori . Inveniendum , non fingendum eft.

quod Natura ferat.

Felici voi, se a quel modo istruiti pienamente dell' Anatomia, e della Fisiologia, con una luminosa, e schietta Teorica lo studio della pratica intra- Pratica. prenderete; ella vi riuscirà meno difficile e meno lunga, voi maggior onore ne trarrete, e la Patria maggior vantaggio. Allora vedrete i morbi in un certo fistema, non ne confonderete le cagioni, e gli effetti, ed infine come meglio li conoscerete, con maggior fiducia, efficacia, e prestezza potrete curarli. Ma infelici voi, se da que lumi di scienza tanto orgoglio traeste, come alcuna volta accade, onde disprezzaste lo studio della pratica, e delle operazioni, studio, che pur troppo sovente agli spiriti pasciuti, e gonfi delle vaghe maestose idee dell'altra scienza pare fastidioso, arido, e di poco vantaggio, perchè tutto già si crede compreso, costrutto, e terminato, onde audacemente si presume. Eh no la moltiplicità, e la varietà de casi è pressocche infinita, bisogna dunque leggere quelli, che gli hanno offervati, e descritti, e come un Capitano sarebbe giustamente accusato, e ripreso d'ignoranza, e di negligenza, sendosi lasciato vincere dal nemico con

uno stratagemma, che poteva anch'esso aver letto nelle Storie, parimenti un Cerufico, il quale alcun caso abbia mal condotto, che potea pur leggere, istruito com' egli era, per diftinguerlo, e conofcerlo, feppure non variava, confuso rimarrà, ed avvilito, e questo studio egli è tanto più utile, quanto egli è vero effervi casi, pei quali la Teorica fola pienamente non fornisce. Ma questo studio degli Autori quanto mai è negletto, e disprezzato! Per lo più pochi libri de' moderni formano lo studio d'un Cerufico, molti anco si stimano ricchi, se hanno le poche, lacere, maculate carte, che hanno tratte dalle scuole. Eppure se penetriamo con iscrupolosa, disappassionata diligenza nella Storia della Chirurgia, sciocca, ed odiosa ci parrà la presunzione di coloro, che, non avendo mai letto gli Antichi, lo studio ne abborriscono, e ne condannano. Certamente farebbe affurdo, ed ingiurioso pretendere, che i Moderni abbiano niente contribuito alla perfezione della Chirurgia; ma però niente più ci umilierebbe, e ci dimostrerebbe il merito degli Antichi, come una fincera storia della Chirurgia antica, e moderna. Holla io fatta questa storia, ed attonito rimafi, umile, e confuso, veggendo in non molte pagine tutto

raccolto il nuovo, il bello de' Moderni, per cui alcune Nazioni vanno fastose, ed oso dire col celebre BER-NARD, che i Moderni, perchè ebbero maggiori lumi dell'economia animale. hanno solamente ornate, poste in miglior luce, e rese più facili le invenzioni degli Antichi, ma poco, o nulla hanno aggiunto di nuovo, e di forprendente. Sia che gli oggetti di nostr' arte, cadendo fotto i fenfi, quelli gli abbiano tosto pienamente veduti, o che poi, fattafi la divifione de Medici, e de' Cerufici, la maggior parte di questi sprovveduta di scienze sia caduta nell' ignoranza, e nell' Empirismo, certamente il piccol numero di buoni Scrittori di Chirurgia paragonato al grandissimo numero, che v'è in ogni altra arte, o scienza, è una prova evidentissima del poco profitto, che vi si è fatto: Nulladimeno, fecondo alcuni, troppo ancora abbondano i libri; imperciocchè dicono essi, in Chirurgia vi sono molti metodi, che non si possono comunicare, ne quali ciascuno debb' essere condotto dal proprio giudizio, e fagacità; que' metodi non si trovano appresso alcun Autore, ch'essi hanno forfe veduto, quindi condannano ogni lettura, come inutile, e principalmente quella degli Antichi, i quali certamente non hanno scritto per gl'ignoranti, e scemi d'ingegno, che orgogliosi, pertinaci, e disprezzanti non vogliono sentirconfiglio, o autorità. Eppure chiunque avrà fatto studio degli Antichi, ed avrà occasione, e sagacità d'osservare nell' esercizio la lor dottrina, dovrà confessare, ch' essi piuttosto si debbano leggere, sendo più esatti nella descrizione de' fegni patognomonici, più attenti, e più precifi nella distinzione principalmente delle varie specie di tumori, ed ulceri; e se la nostra età ha abbandonati alcuni metodi superflui, o disadatti, questi neppure si possono provare essere di quella maestosa antichità, ma de barbari secoli inferiori, quando le arti. e le scienze erano esse stesse, come le genti, barbare, ed incolte; nè anco possiamo trar gloria di alcune operazioni novellamente introdotte, se l'ontaci rimane d'averne molte altre abbandonate utili, e di gran perizia, non che di ragionevole coraggio. Infine s'egli è certo, che la luce, che rischiarisce la nostr'arte, è il frutto d'infinite osservazioni, ed esperimenti, come mai unfol uomo colla fola propria esperienza potrà sperare di chiaramente vedervi? Bisogna necessariamente raccogliere le offervazioni sparse nelle opere de' nostri Predecessori, e de nostri contemporanei.

nei, senza il quale studio l'uomo del più grande ingegno rimarrà un Pratico prefuntuofo, che i fuoi limiti non conoscendo, o disprezzando, correrà temerariamente qualunque forte. E veraentrando nell'efercizio dell'arte fenza conofcimento degli esempi, e de' precetti degli Autori antichi, e moderni, con qual prefunzione potrà sperare in breve vita di elevare egli folo un edificio, che costò tanti secoli di osservazione, e di studio, se anco ei non potrebbe vivere tant' anni, ed in un così ampio esercizio da poterne vedere la millesima parte? Le riflessioni, le combinazioni, che hanno affaticato tanti fublimi ingegni, si presenteranno forse tutte schiette, e non confuse ad un uomo di corta vita, ed occupato da infiniti differenti oggetti? Quale farà dunque l'arte nostra, se l'intraprendiamo sprovveduti delle ricchezze di tanti Maeftri, e Scrittori? Sarà un abbozzo diforezzevole, insufficiente, che la vanità, l'opinione, la seduzione, e la politica sole potranno coprire col nome di abilità, e di sperienza, di riputazione, e di talento. Gli oggetti, che bisogna intimamente comprendere, per esserne sicuri in pratica, paffano fotto gli occhi con una velocissima successione; l' uomo non avvertito o non li vede, o li travede ofcuoscuramente, e rimane incerto; le varietà non distingue, dubita, e si confonde, infine dirollo

> Artem experientia fecit, Exemplo monstrante viam.

Ma questo studio debb' essere continuato; e sono pur degni di riprensione quelli, che tosto esciti dalle scuole, ed avanzati con qualche fortuna nella pratica, lo studio tralasciano de nuovi libri; che, se l'arte ogni giorno si perfeziona con nuove scoperte, nello spazio di pochi anni essi ignoreranno cose notissime agli scolari, le altrui scoperte, e fatiche faranno fatiche, che dovrebbero ancora intraprendere, e fenza un nuovo studio la sor dottrina una volta pienissima parrà poi scarsa, ed insussiciente, e dovranno averne rossore. Vi spaventa forse, Giovani amatissimi, e vi stordisce l'ampiezza degli studi, che vi proposi assolutamente necessari per un' arte, che da molti limitatissima si crede, femplicemente meccanica, vile, ed abbietta? Eppure il più difficile, ed il più importante ancor vi rimane, cioè l'offervazione de morbi fui viventi; a questa tutti quegli studj si debbono volgere, e se una certa perspicuità d' ingegno, e fottigliezza di fentimento non

vi affifte, quelli faranno per voi ricchezze sovente inutili, e forse anco perniciose, perchè alcuna volta, sedotti da una certa illusione di sentimento, e di ragione, caparbj rimarrete pertinacemente in vostra opinione, che forse sarà poi fmentita dalla Natura, o vi troverete foventi tra una vana speranza, ed un vano timore, ed in alcuni casi rideranno di voi quelli, che non avranno altro merito, che di aver avuto prima di voi occhi per vederli. Un Pittore, quantunque abbia studiata l' Anatomia per sapere, quali sieno le proporzioni, e la fimmetria de' membri, pure . fe vuole fulle tavole pingere figure efatte per certi caratteri, ed azioni, convien, ch' egli abbia davanti gli occhi la pura, femplice, schietta Natura, nè giova, ch' egli conosca uomini, animali, piante, architettura, ed arredi, se facilmente puote errare, quando fua mente non sia fissata, ed il suo pennello diretto dalla presenza degli oggetti. Così un Cerufico dee offervare i morbi fui viventi, dopo che ne avrà lette le storie sui libri, imperciocchè su questi tutto è in ordine, ed in limite. evvi un certo sistema di descrizione, che fa la gloria dello storico perspicace, sincero, ed efatto; ma nel furore, e nella perturbazione di alcuni morbi, che dovrete

vrete trattare, certi fintomi faranno confusi, o meno appariscenti tra la moltitudine di molti altri, o non vi faranno fenfibili, o neppure ne dubiterete, quantunque fieno i più degni di offervazione, o di rimedio; vi vuole dunque un certo costume di vederli, e di sentirli. altrimenti se non dopo molti infortunj si comprenderanno ne' loro modi, ed accidenti; ed oh quanto sono questi varj, confusi, incostanti, suggevoli, e precipitofi, se non si agguatano con occhio cerviero, e con una perspicacissima attenzione di mente, che mai così bene non si saranno capiti sui libri, come ce li mostrerà, e farà sentire la natura vivente, fendo principalmente per la confusa, oscurissima storia di alcuni morbi più che verissimo ciò, che disse ORAZIO delle azioni di Teatro:

Segnius irritant animos demissa per

Quam quae sunt oculis subjecta sidelibus, & quae Ipse sibi tradit spectator.

Anzi il fanno tutti i Pratici, che vi è un certo fenfo, per cui le malattie si diftinguono, e meglio fi conoscono nella varietà, ed incostanza de'lor sintomi, ch' essi pure non possono spiegare, non che comunicare; questo si sente, e per le ripetute fuccessive sensazioni quel modo

modo di sentire ne nasce, da cui procede un retto giudizio, al quale per lo più succede ne casi ardui una giusta sorprendente, ma necessaria determinazione, che alcune volte tanto onora i gran Maestri : imperciocchè per inesplicabile sensibilità gli effetti oscuri, equivoci, varj, incostanti al lor ordine, e valore si riducono, utilmente si colgono , si rischiarano , e con ragione , e fiducia vi si provvede, perchè avvertiti una volta vi stiamo attenti, apparecchiati a provvedervi : da' passati pericoli le vere indicazioni si traggono, che all' importante varietà s'accomodino, e de' rimedi già tante volte provati avremo nè troppa fiducia, nè troppo timore: ferme, coraggiose, magnanime saranno le nostre determinazioni, o irreprensibile il nostro abbandonamento: lungi saranno i fantasmi, e le illusioni, ed opereremo per ragione, e per sentimento, da molti ben giudicati esempli animati, o ritenuti . E quest' autorità dell' esempio è tanto necessaria, che i Giovani nell'esercizio dell' arte, se sono onesti, quando qualche caso arduo abbiano a diriggere, con fomma follecitudine, ed anlietà d'animo volgono tutti i libri, ne' quali storie di morbi sieno scritte per trovare quello, che ora debbono trattare, il quale o meno capifcono. o

ne dubitano, perchè per la prima volta il veggono. Quanto dunque è condannevole, e perniciosa la negligenza di que', che, usciti dalle scuole gonfi di scienza, e di dottrina, questo esercizio negligentemente, e quasi con disprezzo intraprendono? Della necessità dell' esercizio pratico per le operazioni della mano crederei di abufare di vostra pazienza, fe volessi fare parola. Ognuno per se può capirlo, ed è pur tempo, ch' io finisca .... Avete dunque fentito, Giovani amatissimi, quanto studio, quanta fatica, quanto ingegno, e fentimento vi voglia per riuscire in quest' arte? Se ne paventate l'alta impresa, io ancor più ne pavento, che pur debbo condurvi, e solo mi consola, che viviamo in una Città, ove i Maestri fono molti, ed eccellenti, che fi può dire essere tante le scuole, quante le lor case, e gli Spedali, sicchè da loro possiate imparare quel, che io forse non potrei infegnarvi. Ma pria di terminare debbo ancora avvertirvi colle parole del celebre nostro BOTALLO di quella generofità, onestà, ed ingenuità d'animo, per cui l'arte tanto si onora. Siate pure di tutte le parti dell'arte istruiti, impedimento iis sunt, dice egli, soporosa desidia, vel præceps audacia, vel sordida avaritia, vel quæ ab hac prodeunt :

deunt, nempe vel nefaria, virulentaque invidia, vel inanis, tumidaque gloria: ignaviam, artisque imperitiam fovet defidia, artis limites temnit præceps audacia, in pecuniam, non in patientium commoda irruit avaritia, per fas, & nefas invisum perdere invidentia vigilat, fucata, ac inutilia veris, atque utilibus præfert ventofa gloria. Qui fieri igitur potest, ut rede procedat ars, ubi artifex horum alicui se dederit? Ed io oso dire effere non meno necessaria l'onestà, che la perizia. Egli è vero, che intraprendete un' arte, il cui esercizio è fastidiosissimo, perpetuamente tra gli orrori de morbi, e le querele de malati, sovente infastiditi da importune, indiscrete questioni, tormentati nell'aspettazione, afflitti dalle difgrazie inaspettate, e mal giudicate dal volgo, con interminabile fatica correndo dietro ad una qualunque forte, che forse non verrà mai felice. Ma qual farebbe la vostra pretensione, fe IPPOCRATE, il grande IPPOCRATE, a cui Serse Re della Persia aveva una volta proposti vasti tesori, e sommi onori, ebbe anch' egli ad esclamare negli ultimi suoi anni (\*): Ego sane quantumvis senex plus reprehensionis, quam honoris ex arte mihi consecutus videor; ma come

<sup>(\*)</sup> In Epift. HIPPOCR. DEMOCR. pag. 127. ed., Foefii.

scriffe GALENO: ne illud quidem præclarum est ex arte parare divitias, sed talem potius artem scire, quæ fracta navi simul cum Domino enatet. Consolatevi colla perfuafione di voftra cofcienza, che vi afficuri d'aver fatto vostro dovere. Non fiate orgogliofi nella prospera fortuna, nemmeno paventate dell' avversa, ed ove nessuno interno sentimento vi riprenda, ricordatevi di ciò. che scrisse BACONE: Medicus, & forsasse Politicus vix habent actiones aliquas proprias, quibus specimen artis, & virtutis sua liquido exhibeant, sed ab eventu pracipue honorem, aut dedecus reportant iniquissimo prorsus judicio; quotus enim quisque novit agroto mortuo, aut restituto, item Republica stante, aut labante, utrum sie res casus, an consilii? Fit itaque sapissime, ut Impostor palmam, Virtus censuram referat; quin ea est hominum infirmitas, & credulitas, ut sæpe Agyrtam, aut Sagam docto Medico præponant. Siate studiosi, ingenui, e forti; non mancate alla volontà del CLEMEN-TISSIMO MONARCA, nè all'aspettazione della Patria con una negligenza degna di ogni riprensione, e castigo; e se alcuna speranza dovete avere, ponetela in questo Eccellentissimo Magistrato, il quale, come dee proteggere i vostri studi, egualmente difendera il vostro merito. HE-



## HEPATIS

## DESCRIPTIO.

т

V Iscus, qued mole maximum, mox sab diaphagmatis fornice pendulum, dextrum abdominis hypocondrium occupat, ultra cartilaginem eniformem, per epigaftrium, in lævum fere hypocondrium quoque productum, hepar, aut jecur vocant; in homine colorem rubrum, plus, aut minus obfourum habet (a); exterius magna ex parte convexum, interius aliquomodo concavum, variisque crenis, & foveis, tum etiam extantiis exasperatum, & inaequale obfervatur (b). Cl. Glissonius (c) totam hijus vifornius variagma crenis, exterior descriptions of the same control of the

(a) Verum, præterquam reliqua viícera, variat hujuíce color in brutis; nonnullis enim eft nigricans, alis virideícens, flavum, cinnabarioum &cc. Vid. Blaf. Anat. Animal. Perrauh Difcours Anatomiq. de plufeurs animaux, ex Tom. primis Acad. Parif. Valent. Amphit. Zootom.

(4) Extantiarum, atque crenarum numerus, præfertim in brutis animantibus, multiplex magis, quam in homine, occurrit. Continuum porro, & fine extantiis oblervabatur in Ales, in Rangifero ex Vol. 1. Ad. Med., & Phil. Hafnierf, in Bubalo Perault. op. cit. Elegantifium autem eft Hepatis in flyras convoluti figura in cochlea operculari, seu vinearum, hortenti, atque agrefti, seu viac. Vywamrdamnii Bibl. nat., Ton. II. Tab. IV. fig. VI., v.

fceris figuram haud inepte comparari posse, exiflimat, fegmento obliquo albuminis ovi indurati ; quod nempe sit per ellipsim excisum. Non semper tamen ad eumdem modum adamussim fa-Etum effe videtur; exterius enim eam partem, qua dextrum hypocondrium adimplet, seu majorem, ut vocant, lobum, in cujusdam quasi hemisphærii modum plurimum elatum habet, ac protuberantem, ejusque superficies, quando ad Suspendens ligamentum ( S. 36. ), seu ad anticam partein pervenerit, in longe humiliorem, atque planiorem alterius partis, seu lobi minoris superficiem subsidet, atque deprimitur, ita ut major lobus natiformem protuberantiam costarum camerae accommodatam referat alter vero vix extuberans planitiem fere habeat. Quod ad ejus ambitum, seu peripheriam, fi a finistro hypocondrio, seu ab epigastrio, quando non omnino illuc protracta fit læva hujus vifceris pars, incipiamus, lingula, seu tamquam elatiori isthmo œsophago ut plurimum adsito, vel etiam cum superiore, anteriorique lienis ora aliquando connexo, diaphragmati propius protendi, non raro observatur, illiusque isthmi interius latus eo modo incurvum evadit, ut quae fequitur fere media hujus superio-

<sup>6</sup> VII., Tab. VIII. fig. V., Tab. IX. fig. II. Longas appendices habet in Salamandra apud Vurfbaini Salamandralogiam, item Bianchi Præceptoris mei ættimatiffime fig. IV. Tab. VII. Hiß. Hepat. At de reliquis jecoris differentiis inter hominem, & bruta vid. eruditiffimi Famoni elegantiffimam Differt. VI. altim. edit. In hoc enim pottremo opere Anatomico Zoozomiam dingentiffime pertreadwit: -quapropter ia hifee rebus nos multum in pofterum non immorrabimur, niti Zoozomica observatio nostris argumentis confirmationem addat.

ris limbi pars, fensim minus elata, fere inde protenía, fed tamen glabra, & convexa videatur; hine factus in hypocondrio dextro natiformis major lobus verticem pene elatiorem habet , propioremque diaphragmati: ab eo vero loco ad spurias costas, plus, minus inferius, puta ut plurimum ad eam partem , quæ umbilico respondeat, dextra jecoris pars producta limbum arcuatum habet, quem ex parabola factum diceres, ad memoratum isthmum ex noftra circumscriptione inde terminatum, ita ut si ab extrema ora natiformis lobi linea ducatur recta ad umbilicalem regionem, angulum magis, vel minus acutum cum hoc anteriori arcu. qui ut plurimum cartilagines spuriarum costarum excedit, præstet. Postremus hic limbus. præterquamquod, ut plurimum ex omni, parte non æque in fua convexitate ordinatus fit, duplici persepe in loco plus ; aut-minus incisus, atque deficiens notatur, altero nempe, seu magis anteriori ob umbilicalem venam, cavam jecoris partem penetrantem, alteroque ob felleam vesiculam, suo, ut ajunt, fundo, visceris oram excedentem; quae ab umbilicali vena incifura fit, minor est, & magis louga, utra+ que porro aliquando abestana ha consiguando

Interiorem, seu stram jecoris saciem multiformem dicam; lobus eniun dexter, interius quoque plenus, atque pene extans est, in inferiose autem parte magis, magisque graciles ens,
duas soveas habet; quarum que magis postetion, renis dextri superiorem, exterioremque
arcum adcumbentem habet, alteraque magis anterior à cysti feltea occupatur, ibb-'quoque aliqua intestini costi ab ileo exturgențis parte innixa. Sinister porto lobus, qua parte proximius veatriculi partem cooperit, aliquomodo
mius veatriculi partem cooperit, aliquomodo

quoque excavatur, ut commodam ei aptet fedem : hos autem inter lobos interius alter protuberat, maxime minor, Spigelianus a Spigetio perperam dictus; nam præterquamquod in Euftachii Tab. X. Fig. 4. fiftat, Vefalium quoque, Vidum Vidium, Sylvium, & Riolanum ita non latuit; ut scriptis, aut iconismis non indicaverint. Hic figuram, ut plurimum, habet prope quadrangularem, trigonam, aut aliam quamcumque multilateram, alteroque extremo, seu anteriori, quum trigonus est, bisidus non raro observatur; & in diversam longitudinem protractus: huic ex altero latere alia persæpe adjacet extuberans hepatica apophysis, quæ triangularem fere semper figuram habet. Ruffus Ephesius (a) ab Haruspicibus, quatuor interioribus hepatis extantiis Gladii, aut Cultri, Auriga, Foci, Menfa, vel Unguis nomina data fuiffe fcribit; verum, quum Haruspices brutorum jecinoribus, quæ ut plurimum multos in lobos discreta sunt, uterentur, si quis ex Gente Medica, ut Theophilus (b) fcribit . haec nomina humani hepatis extantiis adtribuiffet ... nugas , figmentique dediffe cum Vefalio (c) diceremus, idque eo magis, quo ob peculiares, sed commentitios, quos præstare usus credebant, haec nomina imposuisse constat. consists and - I-I I

In dimidia, finiftraque parte lobus hepatis dexter fossa transversali dividirur, quæ in alterius sobi-dextram partem continuatur, camque loborum convexi parietes ita circumeminent

<sup>(</sup>a) De corpor. human. part. appel. l. 1. c. 28.

<sup>(</sup>c) De corpor. human. fabr. c. 7. lib. 5. alteram hempe hujus vifceris extantiam liquores exfeindere. alteram devehere, coquere, adparare feribebant.

nt convallem ultra quatuor transversos digitos perse amplam claudere videantur: in eam porro foveam ex finistro latere ad angulum pene rectum fistura pervenit, quam ab transcunte umbilicati. vena imprimi dicebamus, eaque modo ab hepatis particula, tamquam ponte, magis, aut minus cooperitur, alias vero sulci adinstar aperta est, tum recsa continuata videtur ad exterius minimi lobi, vulgo spigeliani, latus, usque ad summam oram hepatis, in eaque dustus venosus in foctu jacet.

IV.

Hosce sinus cum maxima transversa sovea: quæ ut plurimum vario modo per latera, & fines dehiscit, hepaus portas dictos fuisse a Veteribus, non uno de nomine suspicamur. Græci enim pulas, Urbis, aut Domus aditum, Atrium , vel Convallium Fauces, Regionem, Coronam , Insulam , & Sinum identidem nominabant . Henricus autem Stephanus (a) pulas hepatos ( ex Gorr, fententia, imo ex Tullio lib. de Nat. Deor. ) universam simam hepatis partem fignificare interpretatur. Nos vero exemplo Geographorum, qui portas vocant vias angustas, quas alti circumstant colles, ut funt Porte Cafpie, Syrie, Cilicie, Caucafie, alieque plures, a nostra superius allata sententia de hepatis portis non recedimus. In dextro vero . fuperiorique hepatis recessu, in sima facie, magnum inter lobum, & Spigelianum fovea quoque apparet, quæ fere recta linea paullulum tamen dextrorfum descendit, eique cava vena pars diaphragma mox subeuntis adcumbit, modo per majorem, modo per minorem longitudinem, ut modo vix duos transversos digitos æquet;

<sup>(</sup>a) Thefaur, ling. Grace tom. 3. pag. m. 612.

æquet, modo usque quatnor, & interdum etiam adeo levis est, ut potius quam fovea, jam deficientis foveæ vestligium videatur; neque prætereunda quoque est transversa fovea, in superiori parte inter utrosque lobos incisa, qua hepar vertebris, & œsophago subjectis accommodatur.

v.

Restat nunc demum, ut de jecoris figura illud ex parte fateamur, quod generatim Riolanus scripsit (a), hepatis nempe figuram plurimum variare, quemadmodum os, vultus, nafus variant, ut allatam etiam descriptionem pro Polycleti regula non tradamus. De cætero non etiam tacere possumus, quod præter memoratas foveas, & finus aliæ persæpe occurrant, quæ aliquando fatis profundæ, & ubi oræ diducantur, extremi pollicis fere capaces funt, inter quas totus condi minimus digitus possit, easque foveas, & finus, etfi quoad fitum vagas, Malpighius tamen natura filias fortaffe perpetuas vocat (b), eifque in dilatationibus, compressionibusque hepar aliquomodo juvari nonnulli existimant; revera quot non habet lien, viscus dilatationibus adeo obnoxium (c)? Genuinum hepatis fitum, aliifque cum partibus habitudinem modo non memoramus, namque de his aptius alibi, ubi de ejus tunica, & ligamentis. Methodo ergo finthetica hujusce visceris descriptio-

<sup>(</sup>a) Animadverf. in Laurentium cap. 19. lib. 6.

<sup>(</sup>c) Riolan. Encherid. Anal. lib. a. cap. v6. Lieutaud. Elf. Anatomiq. pag. 312. Du Verney Acad. Petrop. tom. 4. v. v. quorum observationibus opinionem fuhm de lienis ufu firmabar cl. Francicus Caramelli amicus, heu l quiondam neus carifirmus; vid. cjus diffrast. an. 1746. sulg.

ptionem profecuturi transimus ad ea quibus hepar componitur, vafa, & merito primum de vena portarum dicimus .

Summo studio, & improbo pene labore in accuratissimam hujus vasis descriptionem desudarunt egregii viri, & in arte' periti Franciscus Gliffonius (a), Marcellus Malpighius (b) & Kerkringius (c), nec omnia potuerunt omnes. Fregit hanc itaque glaciem doctiffimus Bianchi. cujus de hac re, plus quam lyncais oculis inflituta, observationes ( ait admiratione percitus Cl. Albertus Nicolai Anatomicus Francofurti ad Moenum (d)) sedulam merentur attentionem. Statim nempe in oculos sadit, vel superficie tenus tantum intuenti, egregia hujus Viri icon ( II. Tab. VIII. Hift. Hepat. 2. edit. ), que prototypo adamuffim respondet (e), quaque inter omnes, quas hactenus videre lieute, accurat fima mihi videtur; nec quidem adhuc tantam elegantiam in Chefeldenniana, quæ laudatur hujus valis icon , adnotare potumus , ut Bienchiana, quod præfiscine dictum accipiatis, ulto

<sup>(</sup>a) Oper. cit.

c) Spicileg, Anat. observ. 96. tab. 29.

<sup>(</sup>d) Diatrib. mechan. Anatom, de direct. vafor. pag.

e), Exceptis iis, qua Auttor in explicatione ipfe mo-net, & melioris folummodo distinctionis gratia ita sessione tur. Id. ibid. vid. Hist. hep. tom. 2. pag. 1061. Verum si laudandæ quoque sunt Eustachii siguræ de vena portarum ventrali, quas habemus in tab. 27. fig. 2. 6 4., ubi præcipue elegantissima funt utriusque mesenterii vasa, non ita quidem esse judicamus de vena portarum hepatica iconem, quæ est sig. 1. ejusd. tab. De parte ventrali non est etiam contemnenda Vefal. icon ad cap. 5. lib. 3. oper. cit., & elegans præcipue est quod ad vasa superiora.

comparandam effe judicemus, tum præcipue cum hepaticas folum ramificationes defignet. Nos vero hanc venam deferipturi cum præflantifilmo Winslowio (a) in ventralem, & revera hepaticam dividimus.

## VII.

Ventralis majores ramos nancifcitur a splene, ventriculo, omento, pancreate, intestinis omnibus &c. A splenis nempe sulco rami venos prodeunt, qui, possquam a proxima parte ventriculi ramusculos, vasa bravia dictos, exceperint, in unicum truncum evadunt (b), splenicam venam dictum, atque mox in serpentis modum aliquomodo insexus per inferiorem, posterioremque pancrearis limbum transcurrit usque ad posteriorem duodeni partem (c), ubi in maximum vena portarum ramum evan

dit,

(a) Expos. Anatomiq. trait. des veines §. 229., & alibi.

(4) Rarifime ipi trunco ſplenico majori vafa bravia aţimguntur, quemadmodum non fatis hen defignant plures Anatomicorum icones, numero autem funci minus confanti, modo enim 2, aut 3, interacion plures obfervantur, & cum jam a ventriculo irreplerint, ramufculis intermediis anaftomofes inviccem perfape ineunt, ubi varices non raro vidimus in lienofis, tumi pifs aliquando etiam nonnulli rami adjunguntur a fuccenturiatis, exiguis globulis, colore, atque fructura parvos emulantibus lienes, qui in interiori lienis facie circum ejuddem futcum perfape occurrunt.

(c) Non raro in pancreatis fubfantiam per aliquod fipatium hanc wenam traductam obfervavimus, eaquie non prodibat, prius quam ad ejus fummum caput pervenifiet; femper vero fulcis in eo pancreatis limbo obfervatur, per quem hac vena tranfcurrit: Hinc in cadavere, cui fichines avan in skirrofo pancreate erat intercepta, fiplem in mire ingentem molem excreverat, net amen skirrofam: vid. a Mgc.

kren, & Tulpii observationes &c. ....

dit, atque cum vena mesenteica superiore conjungitur: per hoc iter venosos pancreatis surculos excipit, atque a sinistro, majorique ventriculi arcu gastricam, vel gastro-epiploicam sinifram; nam hæc ab omento, quod a ventriculo pendet, ramulos quoque excipit, & descendens, inita cum gastrica dextra luculenta anastomosi, in splenicam non valde longe a duodeno aperitur, & quoque ex eadem ferme parte, sed sinisterius venam ab omento ascendentem recipit, epiploicam sinistram dictam.

epipioicam finistram dictam.

- A fuperiore autem ventriculi orificio ( cardia ) vena fat infignis per minorem, superioremque ventriculi arcum transcurrit usque ad pylorum, minoris omenti venulas per iter excipiens, acceptaque illic majori vena, desuper extremam ventriculi partem convolvitur, aperiturque etiam in fplenicam venam, alias in mefentericam, aut truncum ipfum venæ portarum. atque præterea ab intestino colo transverse per eius mesenterii aream colica vena dicta confluunt, quarum aliquæ cum alterutra, aut etiam utraque gastrica vena inita anastomosi, gastrocolica vocantur; quo tandem loco fuminum pancreatis caput duodeno adnectitur, cum fplenica angulum magis, aut minus acutum facit adjecta major meseraica vena, in quam mox confluit a media intestini duodeni parte vena duodenalis dicta, & mox alia ab adcumbente illic intestini coli segmento, ideo colica, cui ex latere finistro alia subsequitur, in duos ramos divifa, quorum superior a ventriculo, & proximiore omenti parte ramos excipit, & gafirica, vel gastro-epiploica dextra vocatur, qua memorata anastomosi gastricæ sinistræ adnectitur, & cum epiploica ejusdem lateris pluribus quoque anastomosibus adjuncta, desuper omentuin .

tum elegantiffimos meandros, & plexus, aut polygonas areas comparat, & hæc aliquando etiam in maximum vena portarum truncum implantatur; ex dextro adhuc latere venam aliam colicam habet, tum a ventriculo, atque omento ramufculos excipientem, quos ideo gastroepiplo-colicos nominant, quibus etiam ab inteflino caco cacalis ramufculus adjungitur, atque tandem a mesereo alii, atque alii prodeunt rami, qui ex ordine in mesentericam ex dextro latere jam incurvatam terminantur. Eorumque implexus femicirculares desuper mesenterium videri possunt apud Euftachium (a), & Bianchum (b), & desuper intestina divisiones summæ, & minimæ apud Ruyschium (b), & Albinum (d) .

IX.

A finistra tandem, & ima intestini recki parte meseriaca alia parva, quam hamorthoidalem internam vocant, exsurgit, quae primum circum internam podicis partem ramusculos advolvir, cum hamorthoidale iseuterna per anassemossom junctos (e), atque illic non solum vario mode

(c) Thesaur. Anat. 10. Tab. 3. (d) Opuscul. de vas. intestinor., & icon.

<sup>(</sup>a) Fig. Tab. cit. (b) Fig. Tab. cit.

<sup>(1)</sup> Vid. Salveman. Differi de vena portarum S. ist., ejuique Cognarus Albertus Nicolai op. ci. l. c. Nos vero de adjuncham vidimus peculiaribus ramusculis, per latus, infernamque partem vefea urinamie repentibus, cum vena a pene ad proflatim glandulam per fuperiorem arctum muculorum obturantum femoris producta. Imo, quum alfquando in fenus Santorini, qui circum proflatam glandulam descributuru, inquireremus, inextricabliem quoque vena hamorhoidalis utriufque cum iifdem funubus plexum obfervabamus. A vefatuli quoque feminalibus in hamorhoidalem imenam venam ramufculi vesofi prevese, at far ampli accedunt.

implexi funt hi rami, verum etiam in folliculos inæquales hic, illic perfæpe elevati, inde vero hæc vena finistro intestini recti lateri adcumbens, a quo in rhombos vafa implexa recipit, ad hypocondrium finistrum pervenit, ubi per finistram mesocoti alam ramum ab intestino colo obtinet, atque tandem per dextram ejufdem intestini partem unico trunco in mesentericam, aliquando in splenicam, alias in angulum, quem eæ venæ fe fe adjungendo præftant, aperitur, accepta etiam illic vena duodenali inferiore; quod vero præcipuum, cum vena, quam colicam nominabamus, cum gastroepipleica finistra, & proximiore epiploica anastomoses quoque init, atque magis inferne cum spermatica quoque ejusdem lateris vena ramulos adjunxisse, aliquando vidimus, qui præcipue in homine nephritide denato elegantissime apparebant (a). Sthatius (b) quoque ab utero in mulieribus in hamorrhoidalem internam venam, proptereaque in portarum venam non paucos furculos deferri fcripfit, quos tamen nondum videre potuimus, atque ita fæpe est, quando Theoretici Scriptores ad fuæ Theoriæ ideam humani corporis fabricam fine anatome accommodant .

Sub pancreatis capite ab adjunctis utrifque

venis

(b) Differr. de vena portarum malorum porta, ubi quidem nullam observationem anatomicam adtulit,

<sup>(</sup>a) Non femel in hominibus cacalem quamdam venam infriorêm, quae fuber laterali ejuldem lateris inteflinorum ligamento, quod a peritonæo eff, in hypocondrium reprat, ramufculis retro flexis, aut etiam verfus lumbarem recionem defcendentibus, cum adfeendente vena fpermatica anaflomofin initife, elegantifimam obfervavi.

venis mesentericis, & splenica vena (a) unicum vas conficitur, quod non nihil oblique adfcendendo, in memoratam hepatis foveam ( III. ) adpellit, hoc itinere quatuor transversos digitos ut plurimum æquans; quamproxime autem ad finum hepatis a latere externo, & inferiore venas, quæ a cystide fellea exfurgunt, excipit, cum iam in unicum truncum coaluerint, etfi aliquando & ad portas gemellæ perveniant : ab intestino etiam duodeno vena alia, duodenalis ideo dicta, ascendit ad maximum vena porțarum truncum, cui & alia adjungitur a pancreatis fumma parte, eaque, quam parvum pancreas dicunt, per exteriorem ejusdem superficiem exorta. Quas autem interdum excipiat. ex tribus posterioribus paragraphis videre est (a). Quando vero ad majorem hepatis foveam

per-

(a) Aliquando reperiuntur rami venarum a porta truncop per hapa diffemnati, qui de xxremo apic finifica fibra (1061) (x hoc viſcere egredinutur, 6 per ligamentum, quo in illo latere hapa aliquando figoro transferefi jungitur, repentes, atque ipfi fepto communicati defendunt per posteriora ad dorfum tiglen, ibique junguntur fido parcreo cum quibrissam alits venits ab codem portarum trunco extra hepar obortis ..., Adde quod aliquando a pecastem

<sup>(</sup>a) De amplitudine vona moferaisa majoris 6 fplenise disputant inter se Anatomici. Cl. Bianchi sig. cit. Tab. cit. pselmicam minorem scit. Luddaus autem Nicolai 1. c. splenicam nordinario ampliorem deprehendise, ac mafentericam, imo viplo, est se nimium! sadem capaciorem existere scriptir. & consentientem pene habet Eustleshium sig. cit. Nos vero ad unam y, alteranwe observationem rite habitis mensuris ex methodo Nichola, & Keill, messentieriam anjorem reperiebamus; aliquando::337::316., alias solummodo:1427:320. Iteratum messentieriam insigniter minorem observabamus, sed quid mirum, quod modo una, modo altera major str, si modo in unam, modo in alteram plures adsuunt rami? Vid. superior. §8.

pervenerit, ad angulum maxime obtutium, aut pene rectum in transversum truncum aptatur, seu sindium in duos magnos ramos (a), trunco tamen minores, quorum sinister, minori ideo lobo propior, longior fere semper est, in alterius lobi substantiam altero mox penetrante. Sinum quamplures Anatomici ad hane divisionem estinatur, qui tamen nullus est; namque nullo pacto illic hæc vena alveum majorem habet.

#### Υī

Quilibet horumce ramotum, cum fibi proprium vifceris lobum penetraverit, in alios minores, quatuor, quinque primum dividitur, atque hinc in alios, atque alios adhuc minores, & minimos, per omnem vifceris diferentiam productos, adeoque multiplices, ut exopti-

fibra extrema finishi lateris egressi per ligamentum quoddam intermedium in sinem declinant, atque per ejus
fassantiam dissassimativa velusi faciant illi, qui a voad
caudicti per mesenterium dusti in tundem sinem inferuntuto de la septima sinema sinema sinema inferuntuto de la septima sinema sine

(a) ld perpetuum obfervavimus. Quam ideo male Euflachius cit. Tab. figg. 1. 2. , 6 4. hanc veram in tres ramos per jecoris fubitantiam dispersos, aut disperdendos delineat divitam? Non semel longiorem ramum altero minorem observavimus.

BERTRANDI TUM. TOM. I.

optima hujusce visceris susi glutinis injectione particula nulla fit grano fabuli major, quæ microscopio lustrata innumerabilibus vasculis obsita non appareat, quemadmodum ex Ruyschianis præparationibus vidifie affeverat Boerhaavius Testis ingenuus, & fide dignissimus, sed de his plura ad finem differtationis.

In Foetu ab umbilico vena umbilicalis dicta. quæ a Placenta in utero exoritur, retrorfum ascendit, & propriam hepatis fissuram ( S. 1., & III.) subiens, in parte finistra finus venæ portarum inde aperitur, cum eo finu aliquo modo inflexa, & angulum antrorfum fere obverfum præftans. Cl. Heifterus, umbilicalem venam, quæ quidem simplex, & uniformis ab ambilico ad Hepar fertur, in propria quoque Hepatis fissura ramos jecori dare nullos, contendit . & Verheyennum secus opinantem acriter redarguit, aliique eos, qui ramos venæ umbilicali ex ea etiam parte adscribunt, errasse quam maxime affeverant (a); verum, præter quam quod non contemnenda fint de hisce vena umbilicalis ramusculis Spigelii (b), Cafferii (c), Riolani (d), Arantii (e), Kobokeni (f), ex Veteribus testimonia, tum ex recentibus, quæ habemus ab Hardero (g), Cheseldenno (h), Lemery

<sup>(</sup>a) Ephem. Nat. curiof. cent. v., & vi. (b) Corp. human. Fabr. pag. 11. (c) Fig. 1. Tab. ad lib. viii. Spigelii.

<sup>(</sup>d) De Faiu p. 377. (e) De Fatu pag. 40.

<sup>(</sup>f) Secundum vitulos Fig. 27. adde Euflachium Fig. 11. Tab. 10. & Fig. 1. Tab. 27. In Apiar. num. 8.

<sup>(</sup>h) Anat. Corpor. Humani Tab. 24.

mery Filio (a), Monroo (b), & Hallero (\*), eos quisque apud nos videre potest. Quis del Cl. Trevv., qui eos ante venam portarum negaverat, citra ipfam negare non audet; at quis etiam non videt, illos potius, quam istos, in ejusclem iconibus repræsentari? (c) Revicenda quo-

(a) Acad. Parifienf. an. 1739.

(b) Societ. Edimburg. Tom. 4. pag. 82. ad explication. de Intestin. duoden.

(\*) Descript. Fat. bicipit. p. 8. Adde Eustach. Tab. 10.

(c) De Differentisi inter Hominem natum, & non natum, Fig. 22-13, 29, 5, 56, 74, & &c. Blaffusin Anatom. Animal. pag. 112. ex Drelineurio venam umbilicalem deferibit in fimia foemian, furculos in peritonæum redo mufculo fubftratum immittentem. Ego porro in Rana venam vidi a pelviz cavitate duplici ramufculo prodeuntem, quæ inde fimplex fub peritonæo per abdominis altitudinem progrederetur, donce per ligamentum Hopatis fulcijome ad Hepatis portas per loborum fiffuras pertingeret, illieque non folum in fimam jecoris faciem ramufculos exportigebat, verum etiam ad proximum ventriculum, omentum, intefitium, &c.

Mense Augusti an. 1748. quum in Theatro Ana-

tomico Taurinensi Monstri Bicipitis, cui simplex, & communis erat infimus venter, publica Anatome institueretur, Hepar, quemadmodum, & reliquæ partes, per spectatorum turbam circumferebatur; Illud autem erat fat ingens, fexque habebat lobos. atque vena umbilicalis ab umbilico fimplex, priufquam in intimam vifceris fubstantiam penetraret, in duos primum ramos dividebatur, hinc in plures alios minores, neque ex directo in portarum venam aperiebatur, sed in visceris substantiam, nullo tunc spectabili fine omnino ramofa terminabat. Duas venas umbilicales, forte quemadmodum eæ Ruyfchiani vituli, invenit Riolanus de monstr. nat. Lutet. Ex Fœru deformi Cl. Petit , Acad. Scient. an. 1726. , venam umbilicalem observavit, desuper convexam Hepatis faciem, in venam cavam, dum diaphragama jam effet 10 2

quoque non est Cl. Ruyschii observatio de vena umbilicali in vitulo duplici, quarum aliera multo tenuior portae propago non erat, su in vena portarum, ut ajunt, sinum ex directo non committebatur, ast in dextra Hepatis parte ramulos plurimos ubique distribuerat, qui cum cateris portae extremitatibus unichanturper anastomoses (a). Caterum umbilicalis vena in Foetu sat insignis est, ut cava vena quast comparari possit, dum ab utrisque multum decedit

penetratura, apertam, & pene idem describit ex avibus Gualter. Niedham Dist. Anat. de Fat. format. eap. de vas. umblicalis. Simplex erat von umblicalis format. eap. de vas. umblicalis simplex erat von umblicalis in Foru Bicorporeo Marquehelli ad Vallisar. Epist. an. 1719, eaque ex media, interiorique Hepatis regione, unico, & recto trunco in venam cavam continuabatur, per hanc femitam respondensis venam portarum ramos duplicans. In quodam montroso Focus vena umblicalis ex inguine sinistro in abdominis cavum ingrediebatur, hine per latus ejus-dem cavitatis dextrum desper muculum Psoa progrediens, ad ultimam dorsi vertebam, per diaphagma in pectoris cavitatem progressa, in cavam descendentem venam aperiebatur (Littre Acad. Royal. 1790.). Per hunc alcensum umblicalis vena Iliasar, Lumbars, Emulgates, Renunculi, Diaphragmatis venas excipiebat.

Ex feptem vitulis, quos uno, codemque die aperiebamus, in tribus vafa nonnulla amphalomefinetzia tenuifima in venam umbilicalem retro umbilicum implantari, obfervabamus. Caseram adnorandum proponimus, proprios vena umbilicalis ramufculos per Hepatis fubdantaim int ereminari, ur in acinofam penitus intromitti non videantur, repunt veluti interejudem fubdantai loculamenta, ejudque fuberficiem exornant, non admodum implexi, plane directi, non multum ramofi &c. perpetuo autem vitum maximum truscum hujufce vena in portarum venam continuari, in quo errant plures Anacomici.

(a) Observat. 7. cap. 4.

cedit venæ portarum Hepar ingredientis amplitudo. Non nulli venæ portarum, & umbilicalis amplitudinum rationes faciunt :: 400: 719, modo etiam :: 400: 900 (a), & quidem laudatus Trevu utrique eas adfignavit diametros, quæ memoratis rationibus refpondeant (b): præter hanc amplitudinem, qua infignis est umbilicalis vena, tunicarum quoque crassitie, præ reliquis Humani corportis venis, insignitam in Foetu reperimus.

### XIII.

Citra sinum venæ portarum, fere ex eadem venæ umbilicalis linea, aliquando extra eaundem. in sulco jecoris proprio (S. 111.) propius internum minimi lobi latus per extimam Hepatis carnem ductus in Foetu conspicuus est, quem canalem venosum vocant; ut plutimum non nihil oblique jacet, non nihil incurvus aliquando est, aperiturque in venam cavam, posteriori jecoris parti adnexam, quamproxime diaphragmati, ubi hujus rami ex jecore accedunt (c). Hic tubus in maxima ratione minor est vena umbilicali; ad eam enim fe habet : : 106 . vel 121: 900. vel 729. Ad finum vero vena portarum ratio persape est :: 121 : 400, atque Ridleyus (d) quartæ parti illius finus æqualem facit .

XIV.

(d) Observ. Anat. Pract. pag. 200.

<sup>(</sup>a) Consul. Præstantissimi Anatomici Alberti Haller. not. ad fin. Tract. de concep. Tom. 4. Inst. Boerh. Edit. Taur.

<sup>(</sup>b) Passim in sig. 1. 2. 4., & 5. Tabb. op. cis. (c) Canalem venosum proximioribus Hepaticis Apophylibus surculos impertiri non semel observavimus? Duplicem invenerunt Kulmus, & Saltymannus.

# XIV.

Nonnulli ad oftium venæ umbilicalis, ubi committitur cum finu, ut ajunt, venæ portarum. & ad initium, finemque ductus venofi, valvulam adjectam effe scribunt (defunt enim per reliquas horumce ductuum partes, dum de vena umbilicali eam folum partem confideramus, quæ ab umbilico defumitur). Vidimus quidem ex utroque ductu commissorum vasorum oras aliguomodo protrahi, valvulam vero non dicereinus, vix rugam, & iis parum tribuit Trevv (a). Nato inde Foetu modo citius, modo magis sero utraque nunc descripta vasa occluduntur, & ferme exarescunt ; Cl. autem Haller in adulto ductum venosum semel apertum vidit (b), quod omnino rarissimum, non ita porro de vena. XV.

Cum ramufculis, quantumvis minimis, vena portarum ramufculi alii, quantumvis etiam minimi, & pene dicam numero infiniti, copulantur, & adcumbunt, quos Biliarios vocant, propterea quod bilem devehant, qua propter interius lutei coloris fint; hi ab Hepate egredientes, magis, magifque craffi, & ampliores evadunt, & numero minores, ita ut quando Hepatis portis proximi fuerint, pene totidem evadant, ac vena portarum Hepatica adjuncti rami, quibus perpetuo adjacent, & illie magni-

(a) L. c., & in Commer. Norimberg.

(b) Omnium primus clauditur canalis venojus , imodicam disparet omnino , ut neque vestigium in adultis videatur. Garengootus vero tom. 1. Splanchn. Tab. o, vena umbilicali omnino æqualem facit, vix

minorem. Heister. 1. cit., aliique Anatomici tum in adultis, quod omnino falsum.

gnitudine calamo columbino, plus minus, æquantur, indeque extra Hepatis portas, primum in duos majores ramos, quorum dexter alius, alius finisterior, latus semper legunt venæ portarum, tandeinque in unicum truncum majorem evadunt, qui Hepaticus porus, seu ductus dicitur (a). In eo postremorum horumce ductuum confluxu plures Anatomici transversam quamdam amplitudinem, quam finum nominarunt, descripserunt, quæ tamen tam raro reperitur. ut ab ortu factam non esse cum Cl. Morgagnio existimaverim. Horumce ductuum interior facies villosa est, & fere reticularis, magis vero in majoribus ductibus, ut inferius describemus; primum enim , ut vesicula fellea describatur , operæ pretium esse videtur. XVI.

In propria itaque fovea lobi dextri ( S. 1.) Sacculus membranaceus, figura pyriformis, refidet , quem Veficulam , Folliculum , aut, Cyflim Felleam nominant; fundo fuo non nihil angustiore Hepatis oram, quæ & illic lunatam aliquando incifionem habet, persæpe excedit, hinc in ampliorem ventrem evadit, qui fenfint fine fensu imminuitur, ut pyri conum, seu veficula cervicem comparet, illicque in gracilem meatum contrahitur, quem cyflicum ductum nominant; quum vero Hepatis crassities ab extrema ora verfus portas major fit, hinc eft, quod vesiculæ fundus in erecto homine anterior sit, & leviter inferior, cervix vero posterior, & paullulum superior, seu ascendenti plano inclinato adjecta. Illic , ubi cervix in duaum evadit, in posteriore parte, seu ea, quæ

<sup>(</sup>c) Conful. Hift. Hep. Tab. 2. 4. 5., & 8.

ab Hepate libera est, finulum habet, quem Jafolinus (a), & Bauhinus (b), ante Ruyschium (c), & Heisterum (d), verbis, & iconibus exhibuerunt, qui vero, etsi fæpe adfit , perpetuus tamen non est.

Membranam exteriorem habet vesicula Fellea ab Hepatis tunica, quæ porro deficit, ubi Hepati ipfa adjacet, ejufque interior cellulofa ftructura pinguedine persæpe farcta est, ad fundum præcipue, & collum; Intermediam autem tunicam habet texturæ fat firmæ, quam nerveam dicunt, cui exterius a cervice radiofi carnei pennicilli per longitudinem adponuntur, quorum vix ulli in obliquum producuntur, transversi vero nulli sunt, nulli circulares. Interior inde vesicula facies villosa est, atque reticulata, eamque nonnulli crustam villosam cum Piccolhomineo (e), appellant . Ruyschius ita inaqualem. & reticulatam vesicula faciem non inepte comparari posse, ait, cum superficie mellonis reticulati (f); dicerem potius cum quibufdam holosericis pannis ex altera parte villosis. & adinstar telæ Damascenæ ad angulares quascumque areas impressis; secundis porro curis, superstratum tenuium silorum reticulum esse sentie-

(a) De Poris Cholidocis cap. s.

(c) Epift. Problem. Anatomica 5. Tab. 5. (d) E. N. C. Cent. 6. observat. 28., atque etiam im Compendio Anatomico .

(e) Prælett. Anat. p. 130.

<sup>(</sup>b) Theat. Anat. lib. 1. cap. 45., & Tab. 38.

<sup>(</sup>f) L. c. fig. 3., hunc reticulum etiam exhibent Bianchianæ figg. Tab. 5. fig. 1., & 2., & quidem perbelle reticuli areas, quemadmodum villos laudata Ruyschii figura.

fini

tiebam, utpote calami apice facile separaretur, tenuium inde filorum humillimo musco areolas occupante.

XVIII.

Ductus a cystide productus exigui calami anserini amplitudinem , magis , vel minus, æquat, & cum superius memorato ductu Hepatico coit, qui mox a vesicula exfurgens, imo jam ipse folliculi collus, tamquam in plicam, aliquando re vera, duplicem adigitur, aut inflectitur eo modo, ut collo anserino inflexo a nonnullis comparetur (a); Quum primum ita inflexus fuerit cyflicus ductus, hinc ad latus ductus Hepatici continuatur, eique ad parallelam ita ex latere adcumbit, ut cum ipso angulum ullum, tum in eo loco, in quo adjunguntur, præstare non videantur (b). Quando hic ductus, desuper maximum venæ portarum truncum descendendo, trium transversorum digitorum spatium compleverit, cum Hepactico ductu tandem coit. feu potius in alterum ductum majorem Choledocum dictum continuatur, usque ad intestinum duodenum, per semitam ductum Hepaticum recipiens, tamquam fistulæ ex uno latere in obliquum excise adjectam alteram fistulæ oram. Cyflicus ductus Hepatico paullo minor est, & rite observatus angustior quoque videtur quo

<sup>(</sup>a) Cyflis felleæ cervix prope portas quasi duplicara restlectitur. Falop. I. c. vid. Maur. van Reverhost Tab. ad Differ. de circulo Bilis, itemque Garengeos Tab. 10. Splanchnologiæ.

<sup>(</sup>b) Winslove Trait, du Bas-ventre § 103. Acutifimu hujufmodi concurfus angulum jam obfervaverant Bauhnus op. cit. Vidus Vidus. Falloppium undique referibens Tab. 64. Vid. Bianth Progymnafma de jecoris, ejufque ligamenterum fabrica, ufibufque § 6., & 7.

fini propior. Ab his continuatus choltdous dudus pone primum duodeni arcum descendit, subitque pancreatis posteriorem partem illi intestino adnexam, inferiturque posteriori faciei medize secundæ partis duodeni, &, obliquo ductu ejus tunicas penetrando, in ejussem cavum aperitur (a).

(a) Ofculo oblongo, fuperius arcuato, inferius acuto, adinstar dentiscalpri Winslow p. 533. Edit. Parif. in IV., quam ut plurimum adinftar fiffura oblongæ ani corrugaram observavimus, circumductis Peyeri villis, qui porro ad aliquam distantiam rugosi producuntur, & fensim inde evanescunt, eosque frenula, aut ligamenta appellavit Santorinus observat. Anat. cap. 9. Sat bene expressam carunculam non vidimus, quam papillarem eminentiam vocat Blanchardus cap. 27. part. 2. Anat. Reformat., aut laxam quamdam membranofam eminentiam Munikf. Anat. Nov. p. 44. vel duas membranulas, utrinque ad orificii latus laxe propendentes , quas describit Vefalius I. 5. c. 8. Nonnulli vero scribunt, illic intimas intestini tunicas corrugari, implicarique in modum valvula deorfum pendentis, & clitoridis praputium quodam modo referentis. Memoratas autem rugas adeo fatis laxas, ut hance com-parationem admitterent, vix in uno homine diffenteria denato vidimus. Joannes Muraltus Epift. 5. ad Peyerum, circum hoc orificium in Bove, plexus duos glandulofos notavit longitudine pollicem æquantes, qui guidem minores in Homine occurrunt. Cum Choledoco dullu aliquando etiam panereatieus aperitur, unius vero osculum ab alterius osculo per dimidiam unciam distitum vidit Brunnerus Exper. Nov. Pancreat., ad minorem distantiam alii, semper vero aliquam idem Brunerus, quod omnino falfum in Homine .. Ductum cholidocum duplicem in intestinum duodenum describit Falloppius l. c., eorum alterum in ventriculum Vefalius ex Pontificis triremium Remige lib. 5. cap. 8. pag. 436. Edit. Boerh., & Albin.

Abraham, Vatenus Differt. de Diverticulo bills amplitudinem quandam eç in loco, pub hac vafa in intefinum duadenum aperiuntur, describit. Vid. Kulm. Tab. Anst., nec quidem aliud este videntu fants. novus, in hac parte a Bartholmo descriptus pag. 79. Anste Reformat, perpettuus Brunnero I. c., non peopettus iph Vatero I. c., & follou in Ascite visitus a Peyero Paterg.

### XIX

Villosæ, aut reticulatæ cyssidis felleæ tunicæ, itemque duduum Hepaticorum majorum, cyssici duduus, & cholidoti, glandulæ subrotundæ, miliares substernuntur, quas in vesscula sulla se ovilla post diutinos labores detexis Masipiphius (a), in Homine inde Ruyssikus (b), at admodum exiguas (c). Sparsæ hie, illie sunt, & solitariæ (d), itemque persæpe duriussulæ (e), atque

5., aque numquam a nobis bene perspectus; vidimus quidem aliquando Choledocum dustum versus inferiorem diodeni part.m slexuostim, & per innestini tunicas ad aliquam longitudinem ferpentem; Interdum vero hujufimodi datium, quo propius ad intefritum accederet amplificari, & aliquomodo pelviformem evadere observabamus, in eamque pelviormem eholidoci dustus amplitudinem pancreaticum aperiri conflabar, in iglo autem intestino . ihit hujufimodi.

(a) De lien. cap. 6. Barthol. de Diaphragm. cap. 11. (b) Epifl. cit. Tab. cit.

(c) In nimium turgente, & obstructa vefica lenticulares vidit Santorinus 1. c.

(d) Majores ut plurimum obfervavimus ad cyfidis cervicem; tum recordamur aliquando earum racemulos illic vidiffe poff longam macerationem. Fatemur tamen aliquando omnino defiderari, etfi fumma diligentia in bene praparata vefea tum microfcopii ope perquirantur, aut etiam diu in aqua contineatur vefea.

Aliquando etiam molles, & prefinoi cedentes occurrints. & forte highlingdi vide. Véndenve, qui lacunas poitus, quam glandulas vocat. Trait. de bascura y de la value y de

atque non femel harumce glandularum ofcula nudo vidimus oculo , detinendo in limpida aqua veficulas ,\* prius bene expurgatas a bilis fuco .

## XX.

In extrema parte cervicis vesiculæ specialem annulum membraneum, interius instar pylori circumquaque eminentein, tamquain Sphinderem describit Gliffonius, at quidem immerito musculosum, nam in plicam planam, & tenuisfimam evadit in exficcatis vesiculis, fine ullis bene conspicuis musculosis fibris, imo ille annulus ita humilis persæpe est, ut pene nullus videatur, aut vix ruga sursum versa. Præter reticulum, vesiculæ reticulo pene similem, aut crassiorem, insignes quoque rugæ, seu valvulæ, vario modo productæ, & implexæ occurrunt in Hepatico ductu majori, itemque per aliquod spatium in choledoco, sed præcipue in cyftico ductu . Hæ factæ funt ab contracta, corrugataque mirabilem in modum interiore tunica, ex iifque plicis aliæ, plus minus, obliquæ funt , transversæ nonnullæ , tum etiam alternis angulis ita invicem secantur in cystico præcipue ductu, ut in cochleæ modum implexæ aliquo modo appareant, numero, & perspicuitatis gradu . ut plurimum , variæ (a) . Cl. Segerus eas rugas in cyflico ductu a ligamento proprio fieri describit (b), quod ex fibris, an carneis? vesi- ·

(b) Differt, de motu bilis cystica pag. 10.

<sup>(</sup>a) Vid. Rwysch. 1. c. Heist. 1. c. Bianch. 11. cc. Malpighius vero eatdem quoque receniturar cap. de Hepete, itemque Caldejus ad cochleæ modum (accarocciate) delineaverat fig. 10. Tab. 2. osfirvar. Anatomiche intorno alle Tartarughe pag. 40., quæ quidem ad naturæ normam mihi elegantifima videbatur.

vesicula collectum producatur per meatum cyflicum, & eum ea ratione contrahat, uti colon intestinum stringunt tria ejustem longitudinalia ligamenta, & idem pene etiam descripserat Riolanus (a). Noverant enim has valvulas . ex aliis Veteribus, præcipue Spigelius (b), & Bauhinus (c). Per ductum tandem cyflicum, itemque per Hepaticum, tum non nihil etiam in choledoco foraminula plurima observantur, quibus nullæ certe respondent glandulæ, atque omnino in fundo cœcæ videntur. Id quidem præmonstrante Caldesio loco citato.

XXI.

Ab interioribus, aut majori proximis ductibus Hepaticis , vel etiam ab ipso dudu Hepatico , mox ab Hepate egrediente, canaliculi admodum tenues prodeunt, qui per Hepatis substantiain ad vesiculam properant, in eamque aperiuntur eum ad modum, quo inferius dicemus. Hos ex Anatomiæ Proceribus Cl. Viri Vefalius (d), Jasolinus (e), Bauhinus (f), lius

<sup>(</sup>a) Antropograph. pag. mihi 132. Collum habet ifle folliculus, in quo dominantur fila longitudinalia propter attractionem fortem . Anat. vivor. liber , qui Galeno tribuitur.

De cætero flexiones dullus cyflici, quas superius memorabamus (§. 17.), tamquam nervofis, fibrofis, aut membranaceis quibuscumque aliis retinaculis præstari constat, utpote iisdem dissectis, eas stexiones omnino aboleri videamus. Tum etiam iis dissectis nonnulla adhuc frenula observantur, quæ dustui cyflico adnexa eumdem corrugant, quemadmodum a propriis implexis frenulis ductus sperma deferens.

<sup>(</sup>b) Human. corpor. Fabric, p. 278.

<sup>(</sup>c) Loco citato .

<sup>(1)</sup> Icon. ad lib. cit., & cap. citat. 13. (e) In figur. ad opufcul. cit.

<sup>. (</sup>f) Ibidem .

Lius (a), Bartholinus Thomas (b), aliique affabre descripierunt, aut etiam iconibus illultratunt. Hinc nescio quo fato, neglecti jacuere, donce Am-fleolodamense Medicorum Collegium (c), Bissius (s), & E uditorum Lipsie Anonymas (c) co experiments, & observationibus vindicatunt, & extra dubium posuere; Hinc Gissonius (f), Munniks (k), Dyonisus (l), Caldessus (m), Yerheyennus (m), Geseldennus (p), Patsynus (p), Bidloo (q), Noguet (r), Theychmyerus (s), Senacius (r), aliique plures, quos sigillatim recensere nimis longum effet, costdem suis in scripiis non prætermiserunt; Cl. inde Biantici

(b) Cap. 15. lib. 1. Anat. Reformat. (c) Vid. Manget. Biblioth. Anat. t. 1.

(d) In Anat. Veslingii. (e) Vid. corumd. alla an. 1682. pag. 20.

(f) Op. cit. (g) Op. cit. pag. 52. part. 2.

(h) Circul. Anat. Progym. 13. (i) Lib. 6. cap. 3. Differt. Anat. Patholog.

(k) Op. cit. pag. 52. (l) Demonstr. Anat. 3. pag. mihi 192. (m) Osferv. Anat. intorno le tartarughe.

(n) Tractat. 2. cap. 17.

(p) Anat. tom. 1. cap. de hepate:
(g) Tab. 38. Covvperus vero ad eamdem Tab. hos
ductus negat; in Againo autem jocinore ductus billofos ab hepaticis in cyflicum ductum productos obfervayit."

(r) Abreg. de l'Anat. p. 163.

<sup>(</sup>a) Cap. 13. lib. 8 op. cit. Nihil porro habent hujulmodi Cafferii icones, quæ tamen Spigelianas demonstrationes insequentur.

<sup>(</sup>t) Effais Phyfig. fur l'Anat. d'Heister. Adverte porro ab histe Auctoribus ex bruits animantibus præcipue hosce ductus describi, etsi in hominibus adesse non negent.

shi in Hist. Hipat. 2. edin eosdem peculiari diligentia pertractasse videtur: videamus jam ergo an re vera demonstrari possint.

XXII.

Riolanus hoc habet experimentum: Intrusa fistula, funt ejus ipsiffima verba, in canalem biliarium hepaticum juxta hepar ab infuflato spiritu potius intestinum, quam vesicula distenditur , vicissimque cum per alterum hujus canalis extremum prope intestinum idem præstatur, pars oppofita, & veficula intumefeit, compressaque vesicula, spiritus portio in hepar confluit gargalismum excitans; hinc exiles fibrillas effe dixerat , per quas vefica fuam traheret bilem (a) . Cl. Segerus impulfim in veficulam flatum, & per duodenum, & per ductus hepaticos efflumisse narrat, alii vero addunt aquam quoque, vel urinam, idemque Verheyennus evenire adfirmat, tum ligato fortiter meatu cystico . Hæc autem qua ratione contingerent, nifi illis partibus patula interponerentur vafa? Atque unde cvítica bilis in brutis animantibus, quorum cyffis neque cum hepatico ductu, neque cum choledoco coit ? Ita porro est in corvo, gallo, anate, tarda, nec quidem, quemadmodum vipera, a ductu hepatico perpendiculariter descendentem cystim felleam habent. Quid autem? Eos vidit in tigride Blasius (b), in catopardo Du-Vernoy (c), in simia Parisini (d),

(b) Anat. Animal. tab. 19. passim in zliis animalibus Valent. Amphit. Zootom.

<sup>(</sup>a) Anthropograph. lib. 2. pag. 126., & pag. 12. Plura hujufcemodi experimenta vid. apud Caldefum op. cit. pag. 38. &c., quorum teftem ut plurimum habet celeber. Francifcum Redi.

<sup>(</sup>c) Att. Acad. Petrop. tom. 1.

<sup>(</sup>d) Observ, des Animaux discours.

in urso Trevv (a), in bove porro plures (b); Cl. autem Malpighius (c) viam regiam voca-

verat,

(a) Commerc. Liter. Norimberg. an. 1734.

(b) Vid. Fob. inferiptum La Menghina Gobba. Celeber. Fantonus, cujus audoritatem plurimum valere credimus, eos admitti in homine Diff. 6. ed. ult. pag. 249. Dudum cyfticum nulla communicatione cum hepatico per peculiarem aperturam in duodenum infertum viderunt ex teftudine Parifienfes. Moulinus in Hifl. Anat. elephani an. 1881. "In fine primi inteftiii ... investigavit dudum communem adjecur ad videndam veficulam felleam. Sed. pillarium etiletificitis eigu loco invenit, porum p. billarium extre a jecore veluti dudum hepaticum; p. notavit etiam, quod bilis illic reperta differret coplore, & confiftentia ab ea, quam invenerat in invenerat in invenerat im invenerat in invenerat in

" ductu hepatico. "

Hanc Moulini obfervationem in gratiam dutbum hepati-cyflicorum nonnulli accommodandam offerunt; at Georgius Christophorus Petrus ab Harnofik in Elephantographia curiofa vesiculam felleam non onnino desiderari in hujufmodi animanibus assevaria An Moulinus non faisi diligens, & industrius fuir, ut exiguam pro tanto animante vesiculam, aque etiam in hepate immersam ab eo ductu, forfan cyrfico, ulterius prosequeretur. Id quidem indicat ab eo reperta bilis dictrimen. Galenus felleam vesiculam in clephanto a fe Roma dissecto observavit.

Inter lobos in aliquibus animanibus veficula fel-lea recondituri; omnino autem deeffe in alec feri-bunt Parifienfes, & Londinenfes, quod confirmatur a Joanne Friderico Leopold. Lubecenfi in Defeipt. Anat. aleis Bafil. an. 1700.; in serva Folkstamers, Ephenn. N. C. An. 6. Parifienf. in cervo Canadenfi, & cerva e Sardinia; In Tajacu, feu Apro Mexicano Mochifero Eduard. 17/6n. translat. philippin. num. 153, arque in Struthione Parifienf. At in horum animantium aliquo proximius ad hepatis portas majores hepaticos duchus maxime diffentos, inquam, variejos, invenerum, bile illic refittante, arque turgente, quod quidem, uti veficula fellea necestivarem demonstrare viderur, ita & daduum hepasi-cylirozum; at in ratiocinationibus, arque commentis immorari nolumus.

(c) De hepat. frudura cap. 7.

verat, qua bilis ab hepate in felleam veficulam, per eos certe ductus deveheretur, ejusque verba hic describam: Pennatorum vescula fellea altero capite exortum trahie a cavo hepatis, a quo bilem recipit, altera autem extremitate oblongum collum promit; quod in duodenum inferitur, aque in iissem pennatis biliarius porus ab hepate exortus, nullo habito immediato cum cysti fellea commercio, ad intestina excurrit us plurimum supra colli cystis infertionem. Adsunt itaque in brutis, & eumdem usum in homine præstante vessea aberunt? Profecto credat Judews Apella, non ego:

Quos ipfe vidi hujufmodi ductus, non femel autem vidi, fimplices ab alterutris hepaticis duetibus prodibant, quemadmodum superius dicebamus; hinc in aliquos minores ramufculos, quorum constans non est numerus, sæpius duos, aut tres divifi. & versus vesiculam oblique incedentes, qua parte hæc jecori adjecta est, in eam obliquo quoque tramite aperiebantur (a). quam proxime ad ejus cervicem, fetamque, aut tenue æneum filum vix admittebant, eorumque ofculis neque extantem membraneum circulum, neque valvulam vidiffe dicam, in partibus enim adeo exiguis perluftrandis non fatis lincæus fui. Addam vero peculiarem obfervationem, quæ an ad horumce ductuum negotium facere possit, vobis dijudicandum relinguam. In Nosocomio Divi Joannis Puella ob diutinam dyffenteriam moriebatur, atque in ejus cadavere invenimus hepar pergrande, ultra naturæ ordinem in plures lobos divifum,

<sup>(</sup>a) Amstelodamenses in bove ad modum urether rum hujusmodi ductus aperiri scribunt.

corum autem simæ facies plurimis obsidebantur veficulis acinofis. & lutea materia, inquam, bile farctis, quarum quæque duos habebat du-Aus, ingerentem unum, & ab hepatis peniriore substantia productum, externum alterum, & egerentem; iique postremi, etfi pro vesicularum numero plures effent, 'ad fenarium inde numerum, hincque ad unicum ductum calami amplitudinem excedentem redacti fuerant. hicque cum hepatico ductu, qui ex naturæ ordine erat, non uniebatur, priusquam ab intestino duodeno vix per decem lineas distaret (a). Desiderebatur porro vesicula fellea. Vestrum modo ferte judicium: Zambeccarii observatio de perfufa bile desuper intestinum canis, cui coaluerat hepar, a quo folliculus felleus fuerat dilaceratus, profecto nullius est momenti. si experimentis constat per hepatis ligamenta sub proxima diaphragmatis parte circum venam cavam jecori proximam, & vesicam felleam biliofos ductus produci, atque ferpere, quemadmodum contendit Cl. Ferrein (b).

XXIV.

Cl. Gufmanus Galeatius (2) cyfti-hepaticos dudius observavisse narrat, qui a glandulis cyfticis (XVIII.) enati in hepar bilem devenunt; verum, ets a glandulis meatus auditorii liquor habeatur ad bilis naturam accedens, a glandulis tamen cystis sellez mucum ex albo subsuscum nullo pacto biliosum secerni; certo certius scimus. Cazerum nostros superius deferiptos ductus ab hepate in vesseulam ingeren-

<sup>(</sup>a) Pene eamdem observationem habet Senus loc. cit. Sed quælibet vesicula proprio canaliculo in intestinum aperiebatur.

 <sup>(</sup>b) Acad. Royal, des Scienc. anno 1733.
 (c) Acad. Bonon. tom. 2. part, altera pag. 336.

tes esse judicamus, ideoque hepati eysticos vo-

XXV.

Postremis hisce annis Cl. Lieutaud. (a) hos ductus refellere nitebatur, propterea quod obfervaverat inanem vesicam felleam in quodam cadavere, cui in veficulæ cervice calculus inerat, verum præterquamquod calculus in eo loco confitus effet, in quo ductus hepati-cyflici ex nostris observationibus aperiuntur, unde eorum oscula obstruerentur, præter id, inquam, quot veficulæ fine hoc impedimento prorfus inanes in cadaveribus quandoque occurrunt? Atque, quo majore jure pro nostra sententia observationem Blasii de folliculo felleo, copiofissima bile ita distento, ut per tunicas exsudaret, cujus tamen cyfticus ductus coaluerat (b), infumere liceret? Atque, fi admitti potest obfervatio Cl. Tacconi (c), ab unico parva oliva nucleo tota facile occupari poterat, & erat calculis obstructa vesicula fellea, hepati-cysticis ductibus fat conspicuis nihilominus pertusa.

XXVI.

Tandem, ne plures de hac re adeo certa paginas impleamus, Cl. Verheyennus (d), illum fo natura, 6 veritatis derisorem existimat, qui de viis ( seu dustibus), per quas bilis ad veficulam est translata, adhuc disputat, dubitat-

(a) Esfais Anatomiq. cap. de hepat.

(d) Loco citat.

<sup>(</sup>b) Miscel. Anat. pag. 397., at fucus folliculi bilis, quo proxima coli intestini pars tingitur, perpetuus est. Vid. Stuart. in transact. philosoph. num. 414.

<sup>(</sup>c) Vid. ejudem Epittol. ad Cl. Bianchum script. an. 1720. Histor. hepat. 10m. 2. pag. 962. 10d. que ejus Observationes de raris quibusdam hepatis, aliorumque viscerum affectibus pag. 21. 22. Acerrima Jani Planci censiura parum tribuo.

que : quatuor enim hujusmodi ductus, occasione lectionum publicarum , Auditoribus , Spectatoribusque demonstrasse addit, distinctis orificiis in vesiculam hiantes, atque per illos ligato meatu cyflico flatum immifit in eamdem vesiculam . Nos vero tanto convicio non est, cur eos, qui hos ductus negant, fi quippiam tamen adhuc funt, irrideamus; nam postquam, Garengeotio teste (a), Verdierum hos ductus cera repletos Parifiiis demonstraffe fcimus, accedente VVinslovvii auctoritate, quod in homine revera præsto sint, quempiam amplius suturum non esse credimus, qui de hac re tantis testimoniis fidem denegare velit; alioquin, fi quisque experiens Anatomicus ad observationes diligentissimas accedat, æqua ratio erit, ut suismes sensibus credat,

Qui nisi sint veri, ratio quoque salsa sit omnis.

# XXVII.

A dextro latere arteria calliaca arteria prodit, ealami feriptorii amplitudinem non omnino acquans, quae ad hepar inde progrediens hapatica vocatur. Hace non valde longe ab exortus loco, retro ventriculum, arteriolas perfape duas emittit, quarum prima, quae major, dextræ ventriculi parti adtenfa, gaffrica vocatur dextra, altera vero minor, & nonnihil inferior pylorica, proptetea quod pylorum, & ventriculi retrolli triculi

<sup>(</sup>a) Splancho. 10m., p. 396. "Attamen Verdieus iple, in Epitome Anatomica iterum a fe edita minme declaravir ejufmodi tubulos per injectionem, aus alio quolibet artificio a fe detectos, & publice demonstratos fuisse " (adnotat perspicatissimus Fantoms p. 251. op. cit.). At præter Garengeotium alia profilant religes ocujati.

triculi partem pyloro proximam ambiat, ex eaque ramus aliquando producitur ad intestinum duodenum, quem ideo duodenalem nominant; truncus ideo caliaca hapaticus, hisce propaginibus emissis, magis, magisque ad hepatis portas progrediens, venæ portarum maximo ramo adsociatur, eique ante sinistram partem adcumbit, in duos ut plurimum illic ramos partita, qui fæpe fæpius craffitie dispares funt, majorque majori hepatis lobo, retro biliaria vafa, prospicit, minori alter minor. Uterque vero, priulquam hepatis substantiam per maximam ejus foveam penetret, in alios ramos, puta tres, quatuor, & ultra, dividitur, qui invicem interfecantur vario, & inconstanti modo, & ab ipforum alterutro, dum extra hepar adhuc funt, ramus emittitur, qui mox bifidus gemella arteria cyflica vocatur, propterea quod duabus arteriolis utrumque latus veficulæ, qua parte hepati adfigitur, percurrat; hæque tantos veficulæ ramulculos largiuntur, ut aciculæ cuspis extra ipfos applicari non poffit, tum etiam pennicillos aliquos proximæ hepatis parti, quæ quidem pene totidem vesiculæ restituit, contribuunt, ut videre eft apud Ruyschium (a). Has - arteriolas anatomicorum nonnulli duplici quidem principio progigni scripserant, quod tamen -adeo rarum est, quam quod rarissimum. XXVIII.

Memorati arteria hepatica rami, quando hepar penetraverint, mirum eft, in quot ramos, atque ramufculos indefinte multos, & minimos dividantur, qui fingulas, & omnes venæ portarum divifiones ad quælibet vifeeris puncta infequantur. Rusfihius in Thefauro Anatomico

<sup>(</sup>a) Loc. cit. fig. 4. 6 5.

maximo eum habet hujus arteriæ archetypum; ceracea injectione paratum, ut ex hac folum arteria hepar effictum videatur (a); arteriolarum harumce quamplures furculi ab infa jecinoris substantia emergunt, qui inde subter ejus tunicam, perque ejus etiam ligamenta pulpofas fuas extremitates protrahunt, imo etiam fuper tunicam eofdem ramufculos continuatos observavit Cl. Loquet (b); itemque ab exterioribus ramis hujusce arteriæ ramusculi prodeunt, qui, nullo pacto penetrata hepatis substantia, ad ejus tunicam protenduntur, in sima jecoris facie, ad glandulas illic adfitas, tum etiam ad lateralia ligamenta, & usque per totam umbilicalis venæ longitudinem, latumque ligamentum (c).

XXIX. Ab arteriis quoque diaphragmaticis ramusculos describit Ruyschius ad hepar productos. quos aliqui per latum etiam ligamentum ufque ad umbilicum repentes vidiffe affeverant, imo & fubclaviarum foboles nonnulli viderunt, quæ, per latus pectoris dextrum ad diaphragma protractæ, per ejus inde foramen in convexam hepatis regionem expanderentur. Viderunt alii etiam a vafis renis succenturiati dextri ramufculos ad hepar pervenisse, imo etiam a mefenterica superiore ramum fat infignem , qui retro duodenum intestinum ad portarum hepaticam venam primum, hinc in hepatis fubstantiam progrederetur. Nos vero ex pluribus ca-

<sup>(</sup>a) Ultimos ramos in pulpofas maculas in flella modum ramulos spargentes habet idem Ruyschi. Th. 9. 59. T. 4. fig. 1. &c.

<sup>(</sup>b) Disput. de arteria hepatica, Ruysch. fig. 5. tak.
3., Thelaur. 10. tab. 6. Epist. problem. 5.
(c) Vid. Bianch. tab. 2., & 8.

daveribus aliquando vidimus arteriam calia. cam in gastricas, & Splenicam omnino infumptam, exiguo folum, vel etiam nullo ramo ad hepar emisso, proveniente inde alio sat infigni ramo ad hepar ab ipfamet aorta inter caliacam, & mesentericam arteriam superiorem. An hujusmodi erat duplex hepatica arteria a Cl. Fancono sæpius reperta (a)? XXX.

Vena cava, quæ primum per lumborum vertebras recta adicendit, ab eo fere loco, ubi venas a renibus excipit, emulgentes dictas, in dextrum latus deflectere incipit, in idque magis, magisque, donec hepar per propriam foveam, quæ in ejus superiore, & posteriore parte est insculpta ( IV. ), attingat, eique adfigatur inclinare sic, ut non minus priorem suam directionem, quam magnæ arteriæ primum quamproximæ, deferat, mox inde per dexteram partem tendinei centri diaphragmatis in pectoris cavitatem penetratura (b) pene ad libellam fummæ, mediæque partis jecoris. Ex ea autem parte, qua vena cava memoratæ foveæ adjacet, alios, atque alios ramos fat infignes ab hepate recipit, quos venas hepaticas egredientes vocant. Ab omni nempe jecoris puncto, ad quod venæ portarum, & arteriæ hepatica (c) quilibet rami pertingunt, ramusculi

<sup>(</sup>a) In Differt. 2. editionis.

<sup>(</sup>b) Vid. Eustach. tab. 25., Caffer. tab. 3. ad lib. 5. Spigel.

<sup>(</sup>c) Segerus arteriæ hepaticæ aliquos ramusculos in portarum venam absumi scribit op. cit. Ravius inferiores egredientium hepaticarum venarum ramos arteriæ hepaticæ adtribuit, fuperiores vero venæ portarum, hujusmodi autem discrimina nondum videre potuimus. Vid. Ravii Splanchnologiam, quæ proftat tamquam appendix ad tom. 2. Amphitheatri Zootomici Valentini .

exoriuntur venofi, qui fenfim per adfluentes alios ramufculos majores facti, numero majori, vel minori, puta tres, quatuor, quinque &c., in illam cavæ venæ partem alii post alios tandem aperiuntur, ideoque magis, minusve adfeendentes, superioribus pene ad eam illius venæ partem, quæ in pectoris cavitatem jam jam penetrat adstis, inno interdum etiam observatum fuit, horum aliquos in cavam non aperiri, priusquam &c ipsi quoque nerveum diaphragmatis centrum persoraverint.

### XXXI.

Ab utraque vero hepatis facie aliæ præterea hepatis venæ perfæpe occurrunt, quarum aliæ venæ azygos, diaphragmaticarum aliæ foboles funt, at quemadmodum primum memoratæ venæ ab interiore hepatis substantia prodeunt. has solummodo hepatis tunicæ subrepentes vidimus. Caldefius ( op. cit. pag. 35. ) omnes hepaticas egredientes venas per extimam jecoris superficiem in testudine serpere scribit, atque alibi ( pag. 64. ) venæ cavæ ramum describit in eodem animali, qui ex jecore surgens ad dextrum pulmonis lobum, itemque ad renes properat duobus ut plurimum ramufculis. Ad ofcula venarum hepaticarum egredientium, qua parte in cavam aperiuntur, Fabricius ab Aqua pendente (a), aliique valvulas descripserunt, quæ tamen nullæ funt, nifi valvulam nominare velimus alterutrum magis productum venæ oblique persæpe terminantis parietem, extantem arcum pene effingentem (b).

XXXI.

<sup>(</sup>a) De valvul. venar. tab. 3. Sylvius Isagog. Anat.

<sup>(</sup>b) Dottifs. Boerhav. Instit. vol. 2. Edit. Taur. pag. 241. Pelliculam peculiaris ingenii vere vatvulam sive libellum membraneum versatile describit, quod sub dia-

### XXXI. \*

Ab ea parte finistri nervi vagi, quæ mox fub diaphragmate æsophago anterior est, per minus omentum in superiore parte, qua id jecoris

phragmate ita contra hepaticas egredientes venas adfitum fit, ut ab adscendente per cavam venam sanguine ad earum ofcula applicetur, ne in hepar hic irruat. Quis autem hanc valvulam vidit? Non quidem VVinslovvius ab ipfo perperam citatus, quemadmodum bene animadvertit eruditissimus Haller ibid. not. cit., at error profecto est ab Eustachii valvula usque illuc aliquando pendente, nec quidem valvulæ Euflachiana adeo productæ libelli membranei nomen facile concederemus; nam hæc valvula ex paucis etiam cadaveribus amplitudine varia, aut etiam nulla ( vid. Cl. Morgagni Epist. 15. ad scripta Valfalva), tune folum fatis producitur in cavam adfcendentem venam, quando libero suo anteriori limbo, vel in universum reticulata occurrit, neque tunc etiam ufque ad hepaticas egredientes venas, nifi hæ fupra diaphragma in cavam aperiantur, quod femel vidimus in homine quidem octuagenario; si porro plena fit, utroque cornu fuo ex lateribus auriculæ cordis dextræ, & venæ cavæ adfirmara, nulla vi ufque illuc adigi potest. Hepatis autem œconomiæ hujusmodi valvulam inservire scribunt Parisienses ex caflore. Sub vena, inquam, coronaria valvulam mirabilem diftam invenerunt, que integrum vene cave truncum occupabat, & fic disposita erat, ut sanguis facile ab hepate in cor per venam cavam transire, ast nequaquam a corde in hepar per eamdem venam, obstante hac valvula, refluere potest. Ex iifdem Valent. amphitheatr. Zootom. part. 1. pag. 172. Nihil porro hujufmodi afferit, qui de castore scribit tom. 3. part. 1. Mém. de l'Acad. Royal. des scienc. ab an. 1666. ad 1699., & Cl. Sarazin an. 1704. ejusdem Acad. pag. 59. Mémoir., Valvulæ Euflachianæ facculum in eo venæ loco cum tribus figmoideis valvulis fubstiruit, quem facculum cum fimplici, carneaque valvula fere omnibus avibus alii attribuunt, vid. ex ea, quæ Ottis dicitur p. 109. tom. 3. part. 2., ex gallo Indico p. 231: tom. 3. part. 1., ex parasita Numidiæ pag. 13. tom. 3. ejusd. Acad. ab an. 1666. ad 1699.

coris fimæ faciei adnectitur, ramuli nervei fat multi ad hepar protenduntur, quorum magna pars per fossam dudus venosi versus portas progrediens, in visceris substantiam penitus continuatur (a), sparsis vero etiam, ex superiore hepatis parte, nonnullis ramulis non multis divifionibus convexam ejus faciem perreptantibus. quibus non femel additos observavimus, præcipue ex dextera parte, aliquos proximorum intercostalium nervorum ramusculos, qui diaphragmatis carnem, & aponeurosim jecori superiorem alicubi perforaverant; ex dextro autem. seu posteriori nervo vago nervei ramusculi ad hepar provenientes cum arteria hepatica sinum portarum, & dextram hepatis sedem adeunt, pluribus in implexum hepaticum insumtis ramis, cæterisque in hepatis carnem penetrantibus.

XXXII.

Ille vero nervus, ab intercostali in dextro latere exortus, quem VVillisus (b) mesentericum nominat, quum alios post alios inde etian ab eodem intercostali ramusculos per descensum acceperit, ob quos cum ventriculo, pancreate, liene, & intestino duodeno commercium aliquod hepar obtinet, in plexum evadit, quem ganglioforma describit Vitussensas (c), ad quem a memoratis visceribus, variisque eorum plexibus, & ganglis alii accedunt, quum superius memorati ad eadem accesserint. Ex eo, inquam, maximo plexu ganglioformi hepatico

(b) Čerebr. Anat., & nervor. descript. cap, 25.

<sup>(</sup>a) Hos nervos aliquando oriri vidimus ex peculiari ganglio illic addito, ubi a cæliaca arteria priores rami ad ventriculum abfeedunt, pene ad latus illius arteriolae, quam deferibit Cl. Huller in deferips, daphragm. 1. edit.

fibræ primum nonnulæ nerveæ ad veficulam felleam producuntur, aliæque per hepatis extantias demittuntur, reliquis inde circum vafa ab hepate egredientia, vel in idem viscus ingredientia inextricabili, arctiffimoque implexu adjectis, quæ inde profundius in hepatis portis, cum antea expositis nervorum conjugationibus conjunctæ, fasciculos adaugent, iterum vasa hepatica biliaria, & sanguinea, per sinum ipsum hepatis robustæ circumdantes, & scandentes, eaque lufibus variis, atque reticulis in modum hederarum amplectentes, ubique inde & in ipsam visceris penitiorem substantiam, ita ut etiam a convexa facie sub tunica nonnulli prodeant, educuntur, reticulo pene dicam alveolari vafa visceris fulciente, & ordine quodam intertexente (a).

XXXIII.

Circum, & per hepatis portas glandulæ ovatæ, colore rubro, fubobícuro, aut eriam livido, tum ob perfuíam bilem aliquando pene luteo, adfident, quas conglobatas deficibunt, magnitudine variæ, ad fabæ crasfitiem aliquando fine morbo accedunt, imo etiam superant, numero funt vario, & inconsanti, textura peculiari, & aliarum conglobatarum glandularum non omnino simili, lanuginosa, aut musteosa diceres, si abscissa, aut parumper aqua solutas consideres; has non taro omnino abeste jamdudum notavinus, hinc non mirum, si pauci Scriptores caddem memorent.

XXXIV.

<sup>(</sup>a) Nervuli quoque interdum a visceris substantia exturgunt, & per ligamenta inde protrahuntur, usque etiam ad umbilicum per ejusdem ligamentum salcisforme.

XXXIV.

Per utramque jecoris faciem sub ejusdem tunica vasa quoque lymphatica reptant, hic pauciora, vix ramofa, pene folitaria, illic plura, varioque modo implexa, & distributa. Quum elapía æstate in Regio Provinciarum Cellegio canes pene quotidie inciderem, lymphatica vafa præcipue in loborum fissuris, & quibuscumque exterioribus caveis perreptantia vidi, quorum pars circum venam portarum jam jam hepaticam implicabatur, alia vero plura per superiores simæ vifceris faciei fulcos venæ cavæ adfcendenti advolvebantur, pene in fasciculos illic collecta (a): ascendunt quoque per hepatis ligamenta contra vesiculæ felleæ latera. Lymphaticorum cum lymphaticis a nonnullis celebratas anastomoses non vidimus, vidimus quidem horum aliqua a proximioribus abdominis partibus accedere, alia ab intima visceris substantia exsurgere, quo vero principio adhuc ignoramus . Cl. Vieussennus (b) ab extremis arteriæ hepaticæ radicibus hujusmodi vasa exsurgere scribit, alii ab acinis jecoribus glandulosis (c). neutrum vero constat; constat quidem horum ali-

(b) Vaforum nov. sistema pag. mihi 180. erat autem hypothelibus nimium facilis, neque opus hoc probaverant Academici Parisienses.

<sup>(</sup>a) Erant variæ magnitudinis, variæque pelluciditatis; Cl. Bianchi in Prodromo tabul. 54. tab. 51. Figuris duabs novum inventum pertihlet vaforum venticuli lafkorum, quæ per omentum utrunque in cavas venas ab hepate egredientes traducuntur. Vid. Pauli Hieronymi Biumi opulculum: Efamina di alcuni canaletti chiliferi, che dal fondo del ventricolo per le tonache dell'omento fembrano penetrare nel fegato. Milano 1728. 8.

<sup>(</sup>c) Videantur Courtial. observ. Anat. oper. Cl. Petit de morb. off. adjectl. ex 1. edit. Arterias hepaticas, aut ductus biliarjos instando, plerumque lymphæ ductus vento distendi observabat Covvper tab. Bidl. 38, sig. a.

aliqua in chyli cisternam terminari, aliorum sinibus non bene perspectis, longioresque vias ipsis adtribuunt Rudbeckius, Svvamerdamius, Nuckius, aliique, hanc vero materiam ultra hepatis sines nobis pertractandam non insuminus.

### XXXV.

Ex corum omnium vaforum, nervorumque implexu jecur compositum in peculiari mem-, branacea capíula continetur, cujus longius protensæ partes ligamenta vulgo vocantur. Albida est hæc capsula, pellucida, satis pro sua tenuitate valida, cellulofamque substantiam ex interiore parte infignem habet, quæ per univerfam hepatis maffam longe, lateque diffunditur. Cl. Douglassius (a) viscera pene omnia abdominis in peculiaribus peritonæi capfulis, quæ eorumdem figuris respondeant, contineri describit (b). Facite itaque in earum una hepar contineri, cujus tamen capfulæ fuperior pars ad hepatis fornicem elliptica, longeque producta ora protensa sit: hinc facite etiam anteriorem capfulæ partem inter utrosque lobos in plicam falciformem elevatam, & tunc cum visceris capsula duo lateralia ligamenta, & suspendens, aut latum dictum habebitis. Sed majori perspicuitate rem pandam peculiari encheirefi.

## XXXVI.

Plica ea anterior, & maxima a fuo principio, quod anterius ad venæ cavæ ab hepate exfurgentis locum infumimus, plus, minus in trian-

<sup>(</sup>a) Descript. Peritonai.

<sup>(</sup>b) Sunt enim extra peritonasi cortinam renuncui, renes, vafa plura lymphatica, vena cava, aorta, vafa fpermatica, inteftinorum pars aliqua, vafa alia, mufculi, quemadmodum perbelle demonstravit Dour glassius o, cit.

trianguli formam eidem venæ adfita videtur (a); hinc invicem accedentibus lamellis, neque tamen deficiente finu, fed in fulcum longe minorem, at etiam triangularem evadente (b), primum minus alto arcu, hinc, fub magis concavo diaphragmate, longe majori, tandemque per interiorem abdominis faciem, extremam ultra hepatis oram, vix arcuata pene acuta appendice umbilico terminatur, ex quo venam recipit umbilicalem ( XII. ) adusque hepatis portas in inferiore hujus plicæ parte conclusam; hanc ipsam plicam, si per longitudinem ufque ad hepatis superficiem dividamus, videbimus & cum ipfa continuari hepatis tunicam, quæ a subjecto viscere quoque facile dividitur, sursumque producta divisione, in duas laterales membranaceas appendices, tamquam elliptici oris anfulas, continuari perfpiciemus, eæque una cum altera posterius adtensa peritonzi, seu hepatici marsupii appendice, ligamenta lateralia comparant, quotum dextrum in hypocondrio fat profundum, magis amplum, in eodem hypocondrio dextro peritoneo costas viciniores obvestienti continuatur (c); sinistrum

(a) Vinculum hoc suspendens indumentum dat vena cava Oribasius Anat. ex Gal. p. 119.

(b) Suspendens ligamentum cavum describitur in mele, seu taxo, ut & criceto, e Missel. S. R. I. Acad. Nat. Cur. dec. 11. an. 5. p. 55., 6 376.

<sup>(</sup>c) Homini robutlo ob capitis vulnus cum cranii diacope, & late fparfa filfura, poft facfancranii rapanationem febris adatgebatur, fitis, calor; idericus devenerat cum dolore, & caltu quammaximo ad hypochondrium destrum, ibique oborto tumore poft irritam refolutionis, & difuglionis curam ab expertifimis Chirurgis Andrea, & Joanne Baptifla Verna, ut rumor aperiretur, confultum fuerat, coque duas defuper hypochondrii coftlaim fuerat, coque duas defuper hypochondrii coftlaim fuerat, coque duas

nistrum longius, & trianguli formam magis referens ex angulo superioris appendicis sinistri lobi ( I. ) trans cesophagum, non raro ante caput lienis elongatum, peritonæo diaphragma convestienti in ala finistra adjungitur; capsulæ autem velum posterius diaphragmati verticaliter adtenfum, guum utpete continuum cum anfularum partibus, quæ quidem summæ jecoris parti tamquam verticales confiderari etiam poffunt, eamdem partem circumclaudant, id, quod coronarium vocant ligamentum, cum iifdem anfulis præstare videtur. Universa porro jecoris pars, quæ hisce marsupii productionibus intercipitur, tamquam ad aperti marsupii oram sub diaphragmatis fornice nuda, & fine tunica eft. cellulosa solum, aut etiam pinguedinea substantia perfusa, quæ quidem per ligamenti lati laminas continuatur (a).

XXXVII.

In sima autem jecoris sacie capsula hæc vario modo plicatur; plicam primum habet a solco dustus venosi verticaliter continuatam in peritonæum, dextrum diaphragmatis crus investiens; pone ligamentum laterale sinistrum cum

men-

in abdominis cavam penetraffer, multa puris copia quotidie per dies 6. ab ipno abdominis cavo prodibat, quum inde ager convulfionibus ob capius vulnus encaretur, cadaver eço incidendum infumpl, atque obfervarum fuit puris materiam, qua vertex devrir heparis lobi exetus fuerat, in anfulas fina contentam fuifle, quin in abdominis amplam cavitatem penetraffer, qua parte vero hae anfula proximis coftis adnecheatur, dehicere ab adhæfionis pundis incipiebat.

(a) Hunc tunicæ hepatis defectum ad ligamentorum præcipue lateralium loca Euflachii diligentiam non effugiffe videtur ex tab. 11. fig. 4. num. 32. 54.

edit. Rom.

omento minori continuatur, inferiusque a transversa hepatis sovea, cum tunica exteriore intestini duodeni producta, integumentum dat
ascendenti vena portarum, dustii hepatico,
cholydoco, cyssico, areria, & nervis hepaticcis, quæ quidem omnia in unum fasciculum
colliguntur, nullo inde pasco in hepatis intimam substantiam continuata, sed per eam partem solum cellulosa tunica in viscus adeunte.

XXXVIII.

Unde ergo Glissonii capsula, de cujus inventore acerrime tum hoc fæculo hisce postremis annis disputarunt Anatomici primi quoque fubsellii (a)? Listerus (b) hanc tamquam validum musculum peritonzo hepar penetranti adnexum describebat, qui certe potis esset tantam venæ portarum pulsationem conciliare, ut aortæ pulsationem æmularetur, minorem alii fecere, & minorem adhuc alii; capfulam vero Glissonianam omnino negare vix ullus ausus est: unde porro ejus longitudinales plicæ prima jecoris vasa undique dirimentes? Non videmus, vidimus quidem fibrillas nerveas descripto exteriori venæ portarum indumento ( §. præc. ) inextricabili implexu circumductas, & implicatas, una cum strictioris compagis rubellis vasculis, præcipue ab arteria hepatica præstitis, nihil vero ultra.

XXXIX.

<sup>(</sup>a) Hæc capfula fie deferibiur, ait Covvper fig. 11. tab. 37. Billoo, ut guinéfam engréduris poutus de vene porte in hepate officio faveatur, quam qued revera fic appareat. Videtur autem mulculofam folummodo el denegare fabricam, nam communeum membraneam vaginam adrirbuit duchbus hepatis fanguineis, éc. bikolis. Ibid.

<sup>(</sup>b) Vid. ejus Tratt. de humoribus cap. 7.

#### XXXIX.

Reliqua capsulæ pars reliquam jecoris partem interiorem cum folliculo felleo obvelat vix altera interdum plica producta fupra ejus lateris renem ad costas. Hisce vinculis contra diaphragmatis fornicem hepar retinetur, ad id etiam open aliquam conferente subjectorum intestinorum cumulo, ut demonstravit Cl. VVinslovv (a); & Cl. Arent Cant (b) maximam ex dextra parte jecoris in diaphragma pressionem constituit, ut hoc in dextrain pectoris caveam. plurimum elatum velit, etfi quidem minorem esse in vivis præcipue erectis certe videatur. quam in cadaveribus dorfo resupinatis (c). Alias nunc non memoro capsulæ plicas, puta a ligamento lato, aut eriam a radice finistri ligamenti lateralis ad xiphoideam cartilaginem, tum ab extrema parte, quæ umbilicali venæ propior, ad proximam coli partem, utpote non perpetuas (d).

<sup>(</sup>a) L. cit.

<sup>(</sup>b) Tab. 4. impet. prlm. Anat.
(c) Riolanus nullam diaphragmatis concavitatem; aut faltem non majorem ex ea parte effe contendit in vivis propter pondus viscerum dependentium. Animad. in Theat. Anat. Bauh. pag. 707., itemque in Animad. in Anas. Laurent. p. 649., & fubtiliori theoria Gliffonius op. cit. cap. 11.

<sup>(</sup>d) Cl. Bianchi durioris, densiorisque corpulentia membraneas productiones tab. t. litt. M. M. M., & N. per latum ligamentum delineatas habet: erantne ex morbo inductæ, utpote icon ex hydropico desumpta fuerit ? Cl. Santorinus I. c. haud absimiles compatlas, 6 teretes in peritonao elegantes productiones vidit in puerperis, quas albos lacertulos vocat, interiores tranfverse collocatos, & exteriores in longitudinem productos. Et aliquid etiam hujusmodi ex peritonæi laceratione Falloppius indicare voluisse videtur in opere cit. observ.

#### XI..

Venam portarum, & arteriam hepaticam in pene infinitos, & fenfim maxime minimos ramusculos elongari, sanguinemque in hepar infundere certo scimus, quemadinodum certo scimus bilem a ductibus hepaticis, ab initio quoque minimis, & pene infinitis retrahi, & infusum primum in hepar sanguinem ab egredieneibus hepaticis venis ad cavam venam hinc traduci. Id omne, imo quidquid usque nunc deferipfimus, hujus vifceris structuræ umbram viz præsefert, & quod maxime dolendum, quid præterea addamus, vix scimus: adeo effœti funt hominum oculi tum in iis rebus, quas tamen Divina munificentia nobis quocumque excogitabili modo pertractandas obtulit, adeo deficit tum in minimis naturæ operibus ars hominum, ah temper, femper in tentaminibus suis illusa ! LXI.

Videt oculus majorem portionem in efficienda hepatis massa venæ portarum esse, quam cavæ, isliussque majores ramos quam citissme in longe minores redigi; ceram, aut vini spiritum a portarum hepatica vena per aliquam visceris partem in hepaticum dustum traduci, itemque ex illa in cavam (a). Videmus, exciso in frutsula hepate, ingresientes venas præ egredientibus in axim replicari, & slaccescere (b);

<sup>(</sup>a) Boerh. Epift, ad Ruyfeh de glandular, fabr., itemque Lifshwig de principius venarum; Vieuffens opcit. Non vero penetrari credimus a minimis vafculis penitioris kepaticae fubftantiae, fed a longe majoribus, nempe anaftomofuma ratificio, aliquep profecto eft ratio de transfluxu per ductus hepaticos, fed Phyfologi munus modo non agimus.

<sup>(</sup>b) Uniuscujusque jezoris venæ unica admodum tenuis est, qualis nulla alia in toto animanti. Oribase op. cie. pag. 115. in sociibus, excepto cerebro, nullum vi-

venæ portarum hepaticæ ramos ita bene ductus hepatici ramis adiociari, ut ubique confociati progrediantur, egredientes venas hos, arque illos ramos per diversas directiones intersecare. ad angulos magis, aut minus acutos, obtufos, aut etiam rectos, arteriam hepaticam per quame libet visceris differentiam traduci, nerveaque filamenta ubique, & vario modo implicari. Videmus etiam ea omnia vafa in manifeste reticulato contextu substantiæ, inquam, cellulofæ, ab hepatis nempe portis in viscus produ-Az ( S. XXXVII. ), contineri, cujus cellulæ funt cujuscumque ordinis, & figuræ, & earum quidem reticulus ab exteriore eius facie apparet, tamquam hepatis fubftantiam in majora, aut minora puncta interdistinguens, præfertim in eiusdem convexa facie, tum præcipue, cum viscus succingens tunica detrahatur (a). Hac omnia videmus, at quot remanent ab Anatomicis nondum satis bene perspecta? Oculus videtne quidpiam ultra, quidpiam ultra revelantne injectiones, aut microscopia? Pulchra quidem vidimus, pulchriora per conjecturain scimus, at proh! quam longe pulcherrima

scus jecore mollius est. Paristenses in trunco vena portarum bubali, seu bovis Barbaria observarunt exiguas membranas, valvularum specie, que covistate, seu foramina ramorum, qui conducunt Jarguinem ex trunca porta in substantiam hepatis, dimida occludans, quo impediatur Janguinis ex ramis in truncum porta retrocessus. Nihil autem hujusmoit in homine.

<sup>(</sup>a) Hanc texturam habent ex capra Africana Parifati, & Blaf. Anat. Animal. tab. 12. fig. 2., aque etiam Bidoo l. c. omnium autem optime Bianch. tab. 7. Hifl. hepat. fig. extra ordinem, quam mirificam dixit Cl. Haller of cit. edit. Taur. tom. 2. nota (a) pag. 243. Bianchi autem dat eam ex fue, bove, ove, fele, cane, & homine pag. 1060. tom. 2. hifl. hepat., etum-que fequati funt Winslovy, Garangeo, Verdier, alique.

esse debent, quæ ignoramus! Subtilitas natura ræ, ait Magnus Angliæ Cancellarius, subtilitatem sensus, & intellectus multis partibus superat.

#### XLII.

. Veteres, qui pene infinitam vaforum seriem. in hoc, aliifque vifceribus erant quoque fufpicati, a perfuso sanguine in iisdem, & præcipue in hepate, alteram, diftinctamque substantiam , sanguineam offam ex eorum · descriptionibus dicerem, gigni credebant, eamque parenchyma nominabant; donec vir in perfcrutandis naturæ arcanis solertissimus Marcellus Malpighius eam sanguinis offam diligentiori opera perscrutatus demonstravit, quemadmodum venæ portarum hepaticæ ramusculi in quamdam substantiam producerentur, quam peculiari genere glandulosam nominavit: numquamne vidiffis in vitrariis officinis ab operariis conicos vitreos tubos in extrema parte ita aptari, us in vesiculas, subrotundas, ovatas, quadrangulares, hexagonas evadant, a quibus inde alter longe minor educatur tubulus? Idem pene naturæ artificium videtur in construenda hepatis interna fabrica . Venæ portarum , nempe hepasica extremi ramusculi, forte, imo certe, exiguiores iis, quos ex quacumque encheirefi videmus, in veficulam evadunt exiguam; cogitate, quantum exiguam, quum pene lincæi Anatomici eam numquam videre potuisse fateantur, alique non minus folertes, qui eamdem tuebantur, liquido demonstrare non potuerint, nisi cellulosæ substantiæ hydatides ex morbofo jecore pro Malpighianis vesiculis Anatomicos illuserint.

XLIII.

#### XLIII.

Hisce vesiculis Malpighius figuram nullam speciatim determinare voluisse videtur (\*), alii globofas, aut globofis non valde dispares, alii etiam hexagonas, aut plurium laterum fecere, ex harumque acervis lobulos minimos rimis distinctos ob interserpentem per eorum latera magis conspicuam cellulosam substantiam præstari scribunt, quos nonnulti polygonos, alii cubicos defignarunt; fingulis vero veficulis, aut glandulis fanguinea vafa, venæ scilicet porta, & cava extremi fines, arteria pariter, & porus biliarius ex Malpighio appendumur. Quemadmodum nempe in uvæ acino a ramufculo. seu petiolo in interiorem acini parietem tenuia. fuccofa vascula disperduntur, quæ in acini cavum uvæ liquorem extillant, ita venæ portarum hepatica extremi ramusculi, ac si exteriorem tunicam in vesiculam aptarent , pennicillo walculari, & interiore ejuldem interiorem fuperficiem obfident, iffque exterius, forte & interius subtilissimi egredientium venarum, & plus quam capillares ramuli priores incipiunt, in majores inde evadentes, ita quoque accedentibus extremis arteria hepatica ramulis; ab altero autem vesiculæ extremo minimi excernentes, seu egerentes hepatici dudus prodeunt, ex quibus in unum collectis hepaticus egerens communis dudus evadit.

#### XLIV.

Ita ex Malpighio hepatis glandulæ præstitæ videntur. Novam vero de viscerum, & speciatim hepatis fabrica sententiam inde invexit Cl. Rusyschius vir peritus, & experiens (a),

<sup>(\*)</sup> Atque, si ullam, eam certe hexagonam.
(a) Viri in critica Anatomica periti folliculosam,
aut. glandulosam viscerum structuram a VVepsero pri-

contenditque nullum dari folliculum, nullam dicam glandulam, extremis venæ portarum hepatica ramufculis appenfam, fed totum, quantum est maximum hoc viscus, simplicibus ejusdem vasorum continuationibus, quorum supellex ampliffima est, confici, ductufque hepaticos fine intermedio folliculo ab extremis venas portarum hepatica ramufculis oriri. & spectabiles, fi quippiam videant, visceris acinos. glomeramina, seu potius distinctos cumulos vasculorum nulla peculiari membrana obtectorum esse contendit. Oh elegantissimæ Malpighii obfervationes! Urgent porro aliæ Ruyschii; & cui modo credendum? Aliquidne utrique de hujus visceris substantia omnino reconditum semper extitit? Certe Cl. Bianchi in publicis. privatifque lectionibus nobis fæpe adfeveravit quidpiam a vasculosa, & glandulosa substantia diversum in visceribus existere, quemadmodum in elaboratissimis fuis Tabulis demonstraturum esse pollicetur (a). Ego autem meam disserta-

onem

chum ab Edmundo Kingio in Tranfaft. Philof., at quo ultra procefierunt Malpighiur, atque Ruychius!

(a) Ipfe quidem hepatis fubfiantiam granulis, feu aculais factam perfepexi, Malpighianus autem veficulas, aut folliculos, ingenuus dicam, numquam vidi; iem in renibus: illius cerre granula aut acini magis, quam inforum friabiles mihi videbantur, turgentes, pulpofi, & laxi, eorumque interior fabrica admodum obfotra; villofa, compade reticularis, & quidpiam ultra, quod bene non perfipicimus. Profesto facilis rendenni in alandulofo fifemate non

mum indicatam fuisse contendunt in Epist. ad John Henr. Pauli, itemque omnino vasculosam ante Ruys-

quidijam ultra, quod bene non perfpicimus. Profecto facile crederem in glandulofo fiftemate non minus, quam in vaículofo de acinorum diferentia cogitandum effe: atque forte in hac difquificinos lucem aliquam afferre poffent Phythologicae obtervationes, fruchum praccipue & foliorum, item Zoosomia fubtilior, in lifque jam a quatuor annis totas tionem nimium jam forfan cum Lectorum faflidio protractam existimo, ut in hoc argumento amplius non immorer, przecipue cum nondum tantam habeam experimentorum copiam, ut litem hanc folvere possim:

Non nostrum inter vos tantas componere lites.

fum . Interim conful. Petr. Nanum Inft. Bonon. tom. 1. pag. 326., & feq., Boeth. fabric. diverf gland. tom. 2. Inft e ejustem epift, ad Ruyschium de gland, fabr. & Ruyschii responsum. Bianchi progymnasma de varia animalium viscerum fabrica &c., & Histor. hep. L. ultimo c. Heister apolog. ad finem adenolog. , Morgagni epift. anat. 3. 5. 4., & feq. , at quoque non omittatur perspicacissimi, & optimi judicis Jo. Fantoni D.ff. Anat. E. ult. edit. a pag. 227. ad 236., cujus lisbrum gratiofissime nobis dono datum non semel deosculati sumus; addatur VVinslovo Acad. Parif. an. 1711., qui folliculorum vascula, imo ipsosmer folliculos intus villosos, & ea materia, quæ illic secernitur, jam ab initio hominis infarcta ponit expof. Anat. Trait. du bas-ventre §. 287. idem habet VVinslovvii Præcurfor Garengeotius, & ejustdem compendit Scriptor Verdierus, præmonstrantibus quidem Leibnitio, & Michelotto de feparat. fluidor.; alii ex Cl Ferrein, quemvis acinum fieri corticali fabrica, friabili, e rubro flava, & alia rubra molli, & quasi medullari scribunt . At eftne tanta hyporhesium licentia, ut, quum veficulas revera non viderint, quid in iiidem habeatur, proponere liceat? Ah nos nimium ad naturæ opera elegantiffima nimium cœcutientes!

Quarimus indagine vana.
Naturam semper sugientem: qua se ubi paullum
Oslendis nobis, mox sacies in mille repente,
Ceu Proteus, conversa sequentem cludis, & angit
Marentem seniique horas, cassiunque laborem.

Deficiente sensum ope, erroris periculum semper est, nec quidpiam de abditis natura operibus temere pronunciandum, non quid seri porueri, sed quid revera factum suerit sedulo inquirendum; nam sapiens natura eas ur plurimum, quas homines, vias non est sequata. 

#### TABULÆ

### EXPLICATIO

#### FIGURA I.

HEPATIS MARSUPIUM OSTENDIT, EJUSQUE
APPENDICES.

I ad hepar ligamenti lati vulgo dicti binas laminas dividas, feu potius peritonæum, quod a concava facie diaphragmatis prorogatum est, totumque hepar amicit, & inter majores ejus lobos in altam, validamque plicam duplicatur, ad hunc locum aperias, & apertas partes in longum diducas, & versus superiores loborum margines longius invicem semoveas, conspicue vides, hoc viscus sub diductis iis partibus omnino ab involucris nudum fieri; nimirum hanc plicam eamdem ipfam effe fuccingentem tunicam: vides insuper diductas illas ad loborum latera plicæ altitudines continuas esse cum binis aliis peritonzi plicis, quæ lobos hepatis dextrorsus. finistrorsus, atque etiam posterius, cum lateribus, & medio concavitatis diaphragmatis annectunt; dexirum ideo, nec non sinistrum ligamentum a nobis funt dicta: vides ulterius mediam, seu majorem istam tunicæ hepar suceingentis plicaturam inferius extra hepar protendi, ibidemque venam umbilicalem dictam complecti, & cum eadem ad usque umbilicum porrectam, ita ad locum umbilico, & jecori interpositum cum ibidem assidente peritonæi latere subterfirmari, & connecti, ut hæc ad hanc quoque sedem valide suspendat hoc vifcus, a posteriori in anteriorem partem oblique fitum; ne scilicet vel in erectis, magisque incubantibus, aut aliter jacentibus hominibus fuper subjectum cavæ venæ truncum, aliasque partes prolabatur: vides præterea hanc plicam; si rursus in proprium nexum componas, ita superius cum diaphragmatis centro continuam effe , ut illic veram , absolutamque suspendentis jecur ligamenti operam præstet : vides demum lateralia ligamenta posterius expansa ita unite, lateque hepar diaphragmati obligare, ut eadem femper ligamenta fint, quamquam alicubi varie inflexa, aut producta; neque ideirco diverso coronarii ligamenti , aut alterius cujuslibet nomine distinguenda esse. An non ergo ex ita ad hepatis viscus circumducto peritonzo, ejusque hic illic productis plicis elegantiffimum, fimulque validiffimum martupium vides, quatuor præcipuis anfulis, seu inhæsionis punctis firmatum? Primum scilicet punctum ad superiorem terminum lati ligamenti, seu ad centrum diaphragmatis; alterum ad ejus inferius extremum infra hepar sub albæ lineæ loco; tertium, & quartum ad lateralium ligamentorum oras, seu ad dextram, atque finistram diaphragmatis faciem? Porro suspendendi momentum . & vis in iis ligamentis a ratione occupati spatii computanda est. Latum ligamentum fuspensorii arcus duas partes occupat; tertium vero continuum umbilicale. Major finistri lateralis ligamenti longitudo a majori latitudine compensatur. Hæc autem nitidius percipientur ex confideratione sequentis figuræ.

Hæc a puero octo annorum desumpta est. AA. Est diaphragma superius declinatum. B. Einsdem centrum tendineum.

CC. Hepar a diaphraginate pendens, cujus tunica, & ligamenta sequenti modo suerunt explicata.

Nempe ligamentum umbilicale, vulgo fuspendens dictum, utpore facile dividuum, in duas laminas dividebatur.

DD. Igitur utræque devolutæ lamellæ funt.

quibus

E. Umbilicalis vena primum extra hepar infinuata videtur. Producta hinc per hepar harumce lamellarum divisione, unum, continuumque corpus cum succingente tunica ab iisdem diductis sieri apparet. Namque ab iis detractis nudum remanet hepar per spatium

FF. Et ulterius, fi velis.

At, neque peracta hac divisione, quo magis ad fuperiorem harum laminarum partem procedimus, eo jam in naturali statu plus diductas has laminas invenimus eo modo, ut pene ante cavam venam

G. In triangulum dehiscant, cellulosa, aut etiam

adipola substantia instructum.

Namque ab hoc triangulo, quæ per hepatis dorfum primo invicem adjunctæ hepaticæ tunicæ, seu peritonæi laminæ ligamentum latum, seu falciforme comparabant, per fummam hepatis, anterioremque partem ad latera intenduntur, & lateralia vulgo dicta ligamenta præstant; suntque hic partes,

HH. Quæ dextrorfum, & finistrorfum producuntur ad diaphragma, continuanturque cum peritonæo a diaphragmate in posteriorem hepatis partem producto, nempe cum strato

II. Porro declinato in naturalem fitum diaphragmate, & revisis in propriam sedem productionibus lati ligamenti HH., velut navicularem foyeam fub diaphragmate fimulari comcomperimus; eamque partem hepatis, quam navicule latera circumclaudunt, tamquam ad facci, feu aperti marfupii oram fub diaphragmate nudam observamus. An hunc membranaceum navicularem ambitum coronarium cum nonnullis vocabimus?

Quando porro diaphragma in naturalem un maturalem entur, non ita quoque in transverfum erunt ejustem crura, & alæ, quemadmodum hic videntur, propterea quod ad latera aciculis tendantur ad hoc, ut posterius velum magis, magisque appareret.

L. Est cystis fellea extra hepatis oram in hoc cadavere, quemadmodum in pluribus aliis

fuo fundo pendens.

#### FIGURA II.

#### DE HEPATIS STRUCTURA.

A. ST hepatis frustulum ex sue ita excifum, ut illud præcipue videatur, quod describebamus S. LXI., & not. 3. ejust. S.

B. Est 'venæ portarum ramus per granulosam hepatis substantiam situatus, & per anastomosim cum altero \* junctus.

CCC. Lobelli, seu hepatica apophyses exteriori tunica nondum nudata.

Hæc autem figura pertinet ad Cl. Bianchi Præceptorem meum, qui in peregregio suo opere LIV. Tab. eamdem nitidius cælatam exponet, atque explicabit, & magis quidem mirificam, quam viderit Cl. Haller. Vid. not. sup. cit.



#### DE HEPATIS

# ABSCESSIBUS.

QUI VULNERIBUS CAPITIS SUPERVENIUNT:

APITIS in vulneribus jecoris morbos quandoque subsequi vetus observatio est. Nervorum fympathicis, ut aiunt, affectionibus, vel refluenti materiæ ipsorum causam tribuerunt. Ouorum alterum Anatomiæ omnino repugnat; qui enim fieri posset, ne viscera quoque alia. quæ iifdem occupantur nervis, eodem pacto afficerentur ? Alterum , etfi metaftafeos doctrinam admitteremus, non ita constans est, ut hepatis abicessum perpetuo promovere, aut concomitari videatur : hepar enim quandoque . affecto capite, in pus colliquatum observaverunt, velut in apoplexia, morbis comatolis &c., ubi nullum puris indicium vel causa prostaret. Ab ipsa potius vitiata sanguinis circulatione huiusmodi affectum repetendum esse, mihi videbatur, quoties casus, in quibus hi eveniebant, fedulo perfequerer. Hypothesim non inquiro, observationes potius aliquas quambrevissime proponam, ex quibus conjecturam aliquam, quæ ad praxim quodaminodo referri possit, indicabo.

Vulnerato capite hepatis abscessium tunc maxime pertimescendum esse, multiplici observatione percepimus, quando æger ab accepto vulne;

vulnere bilem viridem evomit, delirio corripitur, convellitur, fanguinem ab ore, oculis, vel naribus emittit, genæ tument, jugula palpitant, hypochondria convelluntur; quandoque etiam, ne quidpiam ultro omifisse, aut diffimulasse videar, idem affectus accidit, si vulneratus comatofus decumbat, stupidus, vaniloquus, atque tunc jugula potius tument, & livent. hypocondria intenta dolent. Nonne ergo in hujusmodi ægrotis sanguinis motus per cerebrum vitiatus erit ? Ascensus arteriarum cerebri. earum tenuitas, visceris mollities & structura, finus arteriis, & venis intercepti, horumce ad jugularium venarum alveos declive, breve, & facile iter, semel perturbato motui maxime favent, & irruenti fanguini amplam & expeditam viam cedunt, vel massam majorem facile admittunt; hinc fanguis vel nimium præceps. vel nimia maffa gravis, per venam cavam descendentem propulsus, ascendenti facile vim faciet, quoniam nulla est ad harumce venarum confluxum striga cartilaginosa H ghmori, nullus Vieusfennii isthmus , nullum Lovveri tuberculum , & nequidem ipfarum venarum minimus angulus; quæ machinamenta etsi effent, nec quidem agere possent, ne ad auriculam dexteram vim pateretur a cava inferiore affluens fanguis. Quum vero liquidorum homogeneorum preffiones ita se habeant, quemadmodum altitudines & bases, basis autem, & altitudo cavæ ascendentis longe majores fint; descendentis excesfus, seu major vis tanta numquam erit, ut infringat omnino, & superet ascendentem. alias enim lethalis fyncope contingeret; aliqua tamen esse debet; at si quidem pressiones per annulos & fegmenta in liquidis undatim agant, pressio autem sit in ratione reciproca distantiæ & resistentiæ; ubi ideo minor erit distantia & resistentia.

flentia, ibi præcipue vis suæ excessim exeret a Quis ergo, considerando cavæ ascendentis ramos hepaticos duarum venarum confluxui propinquiores esse, in amplo reconditos inetti vifecre, & gregatim in cavam venam ascendentem consuentes, quis, inquam, non percipiet, ibi descendentem sanguinem eo pacto vitatum primum agere, ascendentis motum remorari, & perpedire, atque ideo stassm promovere, ex qua inflammatto tandem contingat, in gangrænam, aut abscessum, qui certe frequentior est, terminatura.

Subdole ut plurimum fiunt hujusmodi absceffus in hepate, & pluries ego certe vidi in cadaveribus vulneratorum capitis, in quibus nequidem suspicabatur. Quid porro, fi & ipsi Medici . teste Boerhaavio , de ipsamet hujus visceris idiopathica inflammatione raro cogitent? Arteriæ enim, habita ratione ad molem tanti visceris, ea est parvitas, sistematis porro venosi ea laxitas, & tam parvus sanguinis venæ portarum impetus, ut symptomata nec vehementia, nec adeo perspicua gignant. Viscerum inflammationes, quando ipforum maffam occupant, obtufum habent dolorem, qui longe obtusior erit in hujusmodi hepatis affectibus, quando venofum svstema obstructione præcipue afficitur; atque recte ab ipsomet Galeni tempore graviora symptomata hepatitidis defignabantur, & perspicue definiebantur, fi sanguis infarctus effet ad finem arteriæ hepiticæ, vel arteriarum, quæ a diaphragmate, vel aliis proximis partibus illuc pertingunt, & fuperficiem hepatis perreptant. Membranarum inflammatio generatim præ cæteris majorem dolorem & reliqua inflammationis fymptomata longe graviora habet; atque fi in suppurationem abeant; hæc ad alterutram visceris faciem, aut extremos

ntos limbos, sæpe-sæpius fluere, & adunari. multis observationibus compertum est; verum in capite vulneratis profunde latentem absceffum fæpius observavimus.

Juvenis tobustus post ter institutam cranii terebrationem convulfus tandem moriebatur; præter piæ matris levem necrosim reliqua in cadavere optime constituta, & sana videbantur: & jam cadaver linguebamus, quando ad superiorem jecoris faciem parva alba pustula nobis oftendebatur, ex qua, dum rumperetur, albiffimi, nec adeo male olentis puris unciæ septem educebantur; atque ab eo tempore in perquirendo diligentiores facti, frequentiores effe hujufmodi hepatis affectus, quando nedum ulla erat suspicio, sæpe commonstravimus. Et quidem vidi ego capite vulneratos, quorum vulnus bene restitutum videbatur, nec amplius sub Chirurgi cura erant, quorum tamen functiones animales non ita bene restitutæ videbantur, ictero tandem corripi , respiratione difficili , atque cum dolore, vel non, laborare, urina lateritia, dejectionibus purulentis, languidos, emaciatos post aliquot menses obiisse, quibus nil, nisi hepar purulentum observabatur, ceu veri essent hepatici, dum tamen a vulneris accepti die usque ad mortem in Nosocomio sub Medicorum cura, quibus Chirurgi commiserant, durassent. Historiam referam, quæ horumce abscessuum diutinam durationem, subdolam, nec adeo incommodam oftendet.

Rusticus quidam quadraginta annorum Taurini in Nosocomio D. Joannis per duos menfes de accepto capitis vulnere, quod usque ad duram matrem penetraverat, curabatur; menfe Junio ad agriculturæ opera redibat, verum ad finem menfis Julii æger ad idem Nofocomium sterum deferebatur, cui caput erat monstrose turnidum, atque emphyfemate ita deformatum ut non novissemus illum hominem esse, quem de eo vulnere curaveramus: facies erat hic illic eryfipelatofis maculis interdiftincta, tumor emphysematicus ultra claviculas & scapulas ad pectus extendebatur; respiratio difficilis, anhelofa, cum fibilo; atque æger intra paucas horas moriebatur. Ipse ego cadaver incidi, atque in capite nil aliud observavi , nisi crustam levem facile deciduam ad antiqui vulneris locum, quæ ulcufculum obtegebat; reliqua incapite fana, ut ingens illud emphysema, quod intra sex dies ad eam molem ob solis calorem, ut opinabantur, pervenerat, nifi ab aere exteriore enatum crederetur ; Verum ab hepate ingentem puris copiam eduximus, perforato quodam albo tenui folliculo, ad convexam jecoris faciein sub diaphragmate protuberante. Ictericum iam a pluribus diebus devenisse, stupidum quandoque, vaniloquum nobis narrabatur, nunquam vero de lateris dolore esse conquestum, fed tantum de gravitatis quodam sensu.

Claristimus Molinellius, qui consulto hanc materiam proposuit, potius quam pertractavit, abscessus non sæpius in gibba parte hepatis, quam in concava oriri, quemadmodum Ballonius tradiderat, fed pariter in utraque, observavit, atque meæ confentiunt observationes; sed abscussus, aiebam, sæpe profundus fuit, & non æque ad exteriora latus : ftagnare interdum faniem etiam in aliis partibus comperit, cum hepar esset integrum; quæ porro partes, nunquam ex iis non erant, quæ abdomine continentur. In quodam homine, qui ob capitis vulnus moriebatur, abdomen intentum, & tumens comperit; atque in eo cadavere superficies intellinorum, tenuium præfertim, quibufdam in locis quafi ulcufculis cum multa fanie. & tu& tuberculis quamplurimis huc illucque difperfits, depravata erat. Viderunt & alii in pulmonibus faniem fuiffe coactam. Urrumque vero
ex propofita fententia explicari poffe videtur.
Alterum enim in fyftemate venarum tepaticarum comprehenditur; alterum ex vitiato fanguinis motu, ob cavarum venarum confluxum
ad dexterum cor, hine ad Pulmones, facile
intelligitur. Ornamenta porro, & rationes, quas
ulterius poffem referre, libenter pratermito;
nam fi forte erraverim, nimium jam dixero;
fi vero rem propius attigerim, fatis quidem
dixiffe coram artis Magiffris probe fentio.

Hanc unam tainen, quam ab initio pollicitus fum, conjecturam proponam: si nempe ex hujulinodi caula hepatis affectus post capitis vulnera contingunt, sanguinis missiones e pedibus quas adeo celebrant, & fæpe repetunt, fi ingravescant vulneris symptomata, instante hepatis morbo, an nocuæ potius non erunt? Cum enim ex aperta pedis vena fluxus sanguinis per cavam ascendentem imminuatur, hinc & ejus refistentia, qui vel nimium præceps, vel nimia massa gravis a capite descendit, vis excessum majorem habebit, unde hepar magis magisque repleatur depleatur difficilius . Non ignoro . nec ultro præterfugio, quæ in doctrinam revulfionis, & derivationis a fapientibus viris allatæ funt difficultates, ut ex delectu alterutrius venæ fectionis, nihil boni expectandum, aut mali pertimefcendum videatur. Quemadmodum vero decessus, & velocitates liquidorum fint in ratione composita altitudinum & orificiorum, & in ratione inversa resistentiarum, cæteris paribus, quis, inquam, non viderit venæ fectio, nem in pede hanc ita in vena cava ascendente imminuere, ut velocitates, & deceffus in superiori augmentum capiant, utpote etiam BERTRANDI TUM. TOM. I. in

in continuo venoso canali non pulsatili. Vidi ego non semel in hujusmodi casibus, post infitutuam venæ sectionem in pede, ægros mox ictericos devenisse, & ut videant alii, auctor sum.

Hujufmodi abReffuum historiæ, quæ apud Chirurgiæ Şcriptores prostaht, nusquam ina sunt descriptæ, ach sucrint prævis ; e cadaveribus omnes sunt depromptæ, atque ideo eorum etiam curationes desiderantur. In Disfertatione de hepate, quam anno 1748. (a) evulgavi, brevem historiam ipse discripteram, eamque modo totam dabo.

Homini robusto, ob capitis vulnus cum cramii diacope, & late sparsa fissura, post institutam cranii terebrationem, febris adaugebatur, & fitis, color ictericus devenerat, cum dolore, & tenfione quammaxima ad hypochondrium dextrum, ibique oborto tumore, qui ultimas costas mendosas elevaret, atque pene disjiceret. quin tamen ultra ipsas extenderetur. & incasfum quibusdam adhibitis remediis, quæ nil sorte præstiterant, nisi integumentorum intumefcentiam leucophlegmaticam, confultum fuit, ut tumor aperiretur; eoque prope marginem duarum postremarum costarum, qui locus magis congruus videbatur, oblique incifo, multa puris copia quotidie per dies fex e longinquo prodibat; at tandem æger moriebatur. Cadaver ego incidendum infumpfi, atque observatum fuit, puris materiam ab eo loco ad latus ligamenti lati, juxta lobi dextri convexitatem, alte infediffe, quæ ad ipfius lobi verticem pertingeret, ibique late expanderetur in plica ligamenti lateralis dextri, quæ a diaphragmate non parum fuerat divulfa, atque adeo amplia-

<sup>(</sup>a) Vid. pag. 174. n. (e) noft. edit.

ta; per totum illud latus, hepatis lobus diaphragmati erat coalitus, quemadinodum post prægressas inflammationes, pleuræ pulmones adhærere folent.

Semel hujufmodi abfceffum vidi , qui ad epigastrium turgeret, quo tamen inciso, tanta puris vis effluxit, ut æger intra paucos dies obierit: quam certe fortunam bis expertus Hildanus, perpetuo lethalem pronunciaverat . In eo autem ægroto multa fanguinis copia intus. & extus effluxerat. De hujusinodi hoemorrhagia. propter exesam hepatis substantiam, memorabi-lis casus habetur apud Vesalium. Celebris Jurisconfultus, qui languida valetudine dudum vixerat, cumque nonnulla per transennam Vefalius percunctatus fuerat de morbo suo, qui circa hepar hærere obstructionem dixit, promisit sequenti die se adfuturum Anatomicæ administrationi circa viscera abdominalia instituendæ . ut nempe morbi fui fedem attente confideraret. Verum eodem die, paucis post ea horis, inter cœnam, de mira corporis imbecillitate conquestus fuit, ac impedita respiratione, & paulo post expiravit. Vesalius sequenti die tam subitæ mortis caufam in cadavete inquirens, invenit universum corporis fanguinem adhuc calentem in peritonæi cavum confluxisse, rupto venæ portarum trunco. Hepar totum candidum erat. & multis tuberculis asperum, & tota anterior jecoris pars. & universa sinistra sedes instar lapidis erat indurata; posterior vero pars, ubi vena cava hæret, putredine vitiata, & mollis apparebat.

Si vero de hepatis abfcessibus in universum aliquid audeam dicere, postquam summi hujus Academiæ Viri tam solidos, & optimæ doctrinæ plenos commentatios scripserunt, qui a pertractando hujusmodi argumento me deterrere debuiffent, nonnulla, quæ mihi observare con-

tigit, proponam.

Aliquando ex hepatis regione abfceffus fuerunt judicati atque ideo aperti, qui tamen ad ipfum non pervenerant. Vir quidam, in fumma curia Præses, ictero jam diu laboraverat cum dolore & tumore, qui a cartilagine enfiformi ad tertiam ufque coftam fpuriam extendebatur materiam fluidim contineri, pene omnes Chirurgi , qui sæpe fuerant convocati , præsentiebant, atque ideo hepatis abscessum esse, quem aperire consulebant. Renuebat æger atque post quatuor menses, per quos febre comfumptiva continue laboraverat, moriebatur. Instituta cadaveris Anatome, absceffum in cysti conclusum reperimus, qui a cartilagine ensiformi, desuper inferiorem dextram partem ventriculi, ex uno latere hepatis limbo coalitus, sui etiam per policis longitudinem fubjacebat, ex altero lineæ albæ, porro nullo pacto cum hepate, cæteroquin fano, communicaret: fanies vero prodierat ex tumore skirroso, ulceroso, glandularum pyloro adjacentium, quæ multum intumuerant; & fanies ipía fublutea, mucofa erat, ita ut fi tumor ille, dum viveret æger, fuiffet incifus, locus, fames, & fymptomata eorum sententiam probassent, qui hepatis abscesfuin effe pronunciaverant, etfi non fuiffet (a) .


Quemadimodum lutea depluens materia hepatis ableestum perpetuo non indicaverit, ita quoque si alba fluat, hepar assective sesse que non que non minus est suspiciandum. Utrumque jam agnoverat Hipportates. Qui suppurato hepate urnum, se pus prum & album suar, scripserat ipse in Aphoris. 45. sest. 7-, evadunt;

<sup>(</sup>a) Eandem historiam narrat Auctor in tract. de tumoribus §. de abscessibus, internis abdominis.

in tunica enim his pus ineft: si vero qualis amurca fluat, percunt. Ubi enim bona fuppuratio fit, commentatus est Cl. Swieten, in uno loco circumscripto pus colligitur: & forte hoc tunc imprimis fit, quando circa exteriorem hepatis convexam partem vomica hæret, per externam hepatis membranam coercita, & tecta. Ubi vero in intima substantia hepatis abscessius fit, tunc in amurcæ funilem putrilaginem omnia convertuntur, & nulla spes superest. Utrumque vero ita intelligendum esse experien ia comperimus, ut alterum neque ita temper bene vertat, neque alterum perpetuo fit lethale: in primo enim casu, propter nimiam puris copiam, qua multam hepatis partem exederit, hujusmodi voinicas lethales evadere posse, Hildani, & Drelincurtii observationes, ut plures alias antiquiores præteream, oftenderunt, & ratio ipsa suadet. Aliquando per multos dies puris copiam effluxisse visum est, cui tandem materies biliofa adjungebatur, neque tamen lethales fuerunt . Ita Lysterus in epistola ad Bartholinum notat, quod hepate suppurato, per candens ferramentum via facta fuerit puri copiose erumpenti, quod per plures dies confertim effluxit . Dum autem Chirurgus stylum profunde in ulceris cavum demitteret, materiæ citrinæ copia ad tres libras & ultra profluxit. quo fluxu ceffante, pus iterum prodiit, & perrexit ultra annum exire, fed mediocri quantitate, & relicta fuit fistula in hypochondrio dextro; atque in Commentariis Acad, Reg. Scientiarum anno 1730. abscessus hepatis curati historiam legimus, qui biliofam materiam adeo acrem evomeret, ut lamina plumbea vulnus defendere oporteret, ne a depluente liquido acriori cutis excoriaretur.

#### 198 DE HEPATIS ABSCESSIBUS:

Vidimus hujusmodi absceffum, qui talem amurcam fœtidam, & quandoque fanguine permixtam stillaret, atque hic sistebatur, illa corrigebatur audacter instituta injectione decocti vulnerarii, cui parum adjectum fuerat . spiritus vitrioli. Cæterum illud pejoris ominis esse tunc percepimus, quando ea amurca magis fusca ejicitur, atque fi in aquam projiciatur, nulli amplius flocculi pulpofi, vasculares observantur: tunc enim tota substantia in liquamen habita vel resorbetur, mortem quam citissime illatura quocumque traducatur. Quantis enim viis, per ventriculum, intestina aut etiam pectoris cavum ab hepate effluxiffe hujufmodi materies visa est: vidit Stalpart Vander Wiel vomicam hepatis per sputa purulenta evacuatam, cum hepar, & pulmo dexter infimul perfracto diaphragmate coaluiffent, atque commune ulcus habuiffent.



# APOLOGIA DELLA PRECEDENTE

# DISSERTAZIONE

Pubblicata dall' Autore a pag. 40. del II. tomo del trattato delle operazioni.

Anno 1757., nel III. Tomo dell'Accademia Reale di Chirurgia pag. 484., fu pubblicata una mia Differtatione sopra gli ascelli, che adcune volte accadono al segato dopo le gravi serite del capo. Il signor Pouteau, celebre Cerusco di Lione, li 14. Novembre dello stesso anno anno anno

anno, presentò una Memoria alla stessa Accademia, nella quale proponeva una teorica della cagione di quegli ascessi diversa da quella, che io aveva proposta: fummi trasmesso il manoscritto del signor Pouteau dal signor Morand Segretaro dell'Accademia, ed io non risposi. penfando che gli Accademici farebbonfi per loro stessi soddisfatti senz'alcuna mia apologia. chente, e quale io l'avessi fatta; ma il signor Pouteau ha poi pubblicata la fua Memoria l'anno 1760 nelle fue mescolanze Cerusiche pag 123.; e l'anno 1762. il signor David. nelle sue ricerche sopra gli effetti delle diverse cavate di sangue pag. 199., venne a disapprovare non meno la mia spiegazione di quegli ascessi, che quella del signor Pouteau; mi perdoni il Lettore se vò profittare di questa occasione per rispondere: io prima erami abbandonato all'autorevole giudizio degli uomini favi, ed intendenti, nè ora pretendo fare altra cosa, se non se di aggiungere alcune riflesfioni a quei fondamenti, su quali io aveva creduto di potere stabilire la mia opinione, dappoiche quelli non fono stati altrimenti confutati da miei avversari, se non esponendo una teorica affatto contraria, e perchè il Lettore possa meglio giudicare delle nostre opinioni prima esporrolle colla maggior brevità

Di 'ali afcessi', che qualche volta accadono dopo le ferite di testa, alcuni Autori avevano dedotta la cagione dalle asfezioni simpatiche de' nervi, o dalla metassa di materia purulenta; ma ristettendo, che, se da' nervi dipendes fe tale asfezione del segato, dovrebbe non meno accadere ad altre parti più vicine, alle quali giungono gli stessi nervi, e, se dalla materia, non dovrebbe accadere, come pure accade, in alcune matattic del capo, nelle quali non

vi è stata alcuna suppurazione, sembrommi che un'altra potesse esserne la cagione, la quale dipendesse dal vizio della circolazione del fangue, il quale parevami dovesse prodursi in fimili casi : cioè a dire i feriti al capo sovente gettano fangue dagli occhi, dalle narici. dalle orecchie, e dalla bocca, il loro volto diventa infiammato, e tumido, roffeggiano gli occhi, evvi uno zufolamento, e tintinno degli orecchi, palpitano i giugoli, e fopraggiungono febbre fortiffima, delirio, e convultione, i quali fintomi tutti fembrano dimostrare, che nel capo è cresciuto il movimento del sangue, e conseguentemente pei polposi vasi di quel viscere, per gli ampli seni, per le brevi vene giugolari potrà discendere precipitoso, e grave per la pesante sua massa nell'ancor più breve vena cava discendente, e perciò non potrà non fare qualche forza contro il fangue della vena cava ascendente, giacchè, ove fi congiungono queste due vene, non vi è la striga cartilaginofa dell' Higmoro, nè l' iftmo del Vieufsenno, nè il tubercolo del Lovvero, nè il minimo angolo di quelle vene, le quali cose, se anco vi fossero, nemmeno potrebbero impedire, che il fangue della cava ascendente non soffrisse resistenza nell' orecchietta destra del: cuore; poste le quali cose, si dovrà non meno dedurre, che quella refistenza cada sui prosfimi vafi, e principalmente fulle proffime vene epatiche, le quali alcune volte si aprono nella vena cava ascendente vicinissimo all' orecchietta destra del cuore (a), onde ne possa essere impedito, o perturbarsi il movimento del sangue nel fegato viscere inerte, e grave, e quindi pro-

<sup>· (</sup>a) Vedasi la sua Dissertazione de hepate §. xxx. pag. 168. della nostra edizione.

produrfi la stafi, la infiammazione, l'ascesso, o la cancrena: l' eccesso dell' ampiezza della vena cava ascendente, e conseguentemente la maggior colonna del sangue sono cagione, che non così sovente più lungi si sentano quegli effetti, che pure qualche volta fi fentono, come offervò il celebre Molinelli, ved. il III. Tom, dell' Accademia di Bologna, ma sempre ne' rami della vena porta. Quando tale affezione fi produce al fegato, l' ipocondrio diventa dolorofo, tumido, e sopravviene l'itterizia; e, perchè tale mi fembrava potesse esfere la cagione degli ascessi del fegato, io conchiudeva in quella mia Differtazione, che in tale stato di cose non dovremmo essere sì rifoluti di cavar fangue dal piede, come fi fuole, per le ferite del capo; imperciocchè, se ancor fosse diminuita, ed infranta la forza del sangue della vena cava ascendente, molto si dovrebbe temere, che ancor più s'inzuppassero le vene epatiche soggette al peso, ed all'impeto di quello, che discende.


Conseguentemente alla mia Dissertazione i fopra citati Pouteau, e David fono anco giunti a pensare, che dal vizio della circolazione del fangue potessero dipendere tali ascessi; ma l' uno, e l'altro hanno supposto, che in simili cafi minor quantità di fangue giungeffe al capo, mentre che io aveva pensato, che troppo ve ne dovesse andare; cioè quegli nell' Opera eitata pag. 137. scrisse, che per la commozione del cervello debbano effere caduti in atonia i rami delle carotidi, e delle arterie vertebrali, e che perciò una parte di sangue non potendo giungere, e penetrare pel cervello, fosse obbligata paffare nell' aorta descendente, e ne' fuoi rami principali, come l'arteria epatica, donde si facesse ingorgamento nel fegato, e sinalmente ascesso. L'altro pag. 208. della sua Opera suppone, che per le ferite del capo debba cangiarfi la direzione de vafi fanguigni di quella parte, per la qual cosa vi potrà passare una quantità minore di fangue; ma quella che perció dovrà foprabbondare nell' aorta ascendente, non vuole, come il signor Pouteau, che passi tutta nell' aorta descendente, ma debba allo' ncontrario restare nel ventricolo sinistro del cuore, nel quale non potrà pienamente, e liberamente vuotarsi l'orecchietta finistra, nè in questa le vene polmonali, e perciò resterà maggior quantità di sangue nelle arterie polmonali, nelle quali anco non fi potranno con eguale libertà vuotare il ventricolo, e l' orecchietta del destro lato, nè in questa le cave; sicchè facciasi ingorgamento nella cava ascendente, e ne' fuoi vasi più prossimi al cuore, cioè nelle vene epatiche, e conseguentemente l'ascesso al fegato.

La differenza dunque de'nostri argomenti. ispiegare in questi casi la produzione degli ascessi al fegato, dipende dalla dimostrazione, se al cervello per le ferite gravi del capo vi possa giungere maggiore, o minore quantità di fangue. L' uno, e l'altro de' lodati Autori hanno supposto piuttosto, che dimostrato, che per le ferite del capo i vasi del cervello cadano in atonia, o cangino di fituazione, e perchè in una materia tanto difficile, ed oscura, come il Lucullo di Cicerone, non vinci me malim , quam vincere, oltre gli argomenti, che io aveva già fatto dell' accresciuto movimento, e quantità di sangue, aggiungerò, come diceva, i feguenti, loro dimandando, fe non è vero, che una puntura, una lacerazione, una qualunque ferita muova straordinariamente la irritabilità, e la sensitività delle parti. conseguentemente la infiammazione? che le parti

dolenti ricevano maggior quantità di fangue? che le subitanee violente ostruzioni siano le principali cagioni de' tumori infiammati? che sovente i feriti del capo muojono per una vera frenitide? che, se ne' cadaveri si trova la suppurazione, o la cancrena delle meningi, e del cervello, ne ha dovuto precedere la infiammazione? che il fangue alcune volte torna stillare dagli occhi, e dal naso molti giorni dopo ricevuto il colpo con fintomi di dolore, d'infiammazione, e di tumulto nel capo? che questi non possono diminuire, o cessare, se non colle cavate di fangue, per le quali dovrebbe piuttofto crescere la suppost' atonia de' vasi? che nelle ferite contufe quasi sempre confecutivamente s' infiammano le parti vicine? Una totale atonia de' vafi del cervello dovrebbe apportare infrantaneamente la morte, una parziale, e limitata, quando anche fi provaffe, potrebbe effere come una ligatura, una compressione principali cagioni d' infiammazione locchè si potrebbe anco dire del cangiamento di sito di essi vasi, il quale pure non sappiamo, se non potesse forse essere tale, che ne rendesse maggiore il diametro, e più facile la strada al sangue ne' tronchi di quelle arterie; ma qual cangiamento potrebbono prendere le carotidi nel forame lacero (a), o le arterie vertebrali . che sono si bene custodite? De' loro rami tra gli anfratti del cervello, nella duplicatura della pia meninge, e dell' aracnoidea, nella pienezza della ealvaria egli è difficile immaginarfi un tale cangiamento, e se vi potesse essere cagione bastante per produrlo, dovrebbonsi

<sup>(</sup>a) Per forame lacero intende il canale carotidale scol-

piuttofto rompere que vafi, e produrfi uno fpergimento mortale. L'unico esempio d'ascesso al fegato, rapportato dal signor David pag. 237., fu conseguentemente ad un' infiammazione del cervello. Potremmo anco domandare al signor Pouteau, come proverebbe, che il fangue, il quale non potesse ascendere al capo, dovesse tutto distribuirsi all' aorta descendente, e come principalmente all' arteria epatica; perchè si facesse piuttosto l'ascesso al segato, che alla milza . ai reni, o la infiammazione, e cancrena al ventricolo, ed agli intestini? Così anco potremmo chiamare le ragioni al signor David, perchè una tale perversione del movimento del fangue, com' egli l' ha supposta, non produrrebbe una fincope mortale, o la suffocazione de polmoni, prima che l'ascesso al segato, il quale alcune volte tarda a prodursi e giorni, e settimane? E con queste poche riflessioni terminando la nostra apologia, protestiamo, che noi, qui sequimur probabilia, nec ultra id, quam quod verisimile occurrerit, progredi possumus, & refellere sine pertinacia, & refelli sine iracundia parati sumus; ma che le cavate di sangue dal piede, ciò, che più importa di mostrare, possano nuocere, quando vi sia minaccia d'ascesso al fegato, o sia esso già fatto, meco confentono gli accennati Autori obbligati dalle stesse mie ragioni. Vedansi le Opere qui fopracitate, c le offervazioni del signor Andouillé in favore di mia opinione nel III. Tom. dell' Accademia di Chirurgia pag. 506., la Difsertazione del signor Bordenave de vulneribus capitis, & de venarum sectionis usu, stampata in Parigi l'anno 1755.; la quale è stata pubblicamente difesa nelle scuole di S. Cosimo.





# OPERE DEL BERTRANDI TOMO I.

PARTE II.

CHE TRATTA DE' TUMORI CALDI.



# DISCORSO

PRELIMINARE DEGLI EDITORI

#### AL TRATTATO DE TUMORI

R IN PARTICOLARS

AI TUMORI INFIAMMATI.

ANtichissima è la distinzione delle malattie Cerusiche in tumori, in ferite, in ulcere, e in malattie delle ossa; il Ber-TRANDI l' ha adottata non meno pel comodo degli Studenti, che per conformarsi all'uso comunemente ricevuto nelle altre Università. E' vero, ch' egli avrebbe potuto seguire la distribuzione metodica de' morbi, di cui il SAUVA-GES avea già dato uno schizzo sin dall' anno 1732. (a), poi nuovamente nel 1739. (b), indi ampiamente spiegata,

Monspelii 1739. in 8.

<sup>(</sup>a) Nouvelles classes des maladies dans un ordre semblable à celui des Botanistes, comprenant les genres, & les especes. A Avignon 1732. in 8. (b) Pathologia methodica, seu de cognoscendis morbis;

ed eseguita nella dottissima sua Nosologia methodica sistens morborum classes, genera, & species, juxta Sydenhami mentem, & Botanicorum ordinem, pubblicata in Lione nel 1763. Ma tale distribuzione difficilmente può essere seguita in un Corfo di Chirurgia, che non tratta di tutte le malattie, ma solamente delle esterne, ed è poco adattata alla capacità de' giovani allievi, oltrecchè ( a dir vero ) malgrado le correzioni, e le aggiunte fattevi dai celebri SAGAR, CULLEN, VITET, altri, ella è molto difettosa, come fa benissimo offervare il Borseri nella Prefazione al III. Vol. delle sue Instituzioni di Medicina pratica. Più che in altro Trattato in questo de' tumori ha il BERTRANDI seguitato un ordine metodico, avendoli distinti in tre Classi, cioè in tumori. umorali, in sarcomatosi, e in erniosi, e le Classi in Sezioni, ordini, e generi; le spezie, e le varietà trovansi descritte, e notate sotto il rispettivo genere. Dobbiamo però ingenuamente confessare, che i caratteri assegnati ai diversi generi, e spezie sono lontanissimi da quella precisione, e certezza, che i Botanici hanno faputo offervare ne' generi, e nelle spezie delle piante; anzi neppur esatta è la distinzione de' tumori nelle accennate tre Classi, da che, ri-

gorosamente parlando, i sarcomatosi sono. veri tumori umorali. Checchè ne fia però di questa Classe, ognuno troverà naturali le altre due, che comprendono i tumori umorali, e gli erniofi, e naturaliffima la distinzione degli umorali nelle due sezioni di tumori caldi, e di tumori freddi. Non sapremmo dir lo stesso della divisione de' caldi ne' quattro ordini, che sono de' tumori flemmonosi, degli erifipelatosi, degli ascessi interni. e. della cancrena. Questa divisione è puramente artifiziale, ed arbitraria; ma chi non fa, che i Botanici steffi sono costretti d'introdurre ne' loro sistemi moltissime cose artifiziali?

Questo Trattato è stato dettato dalla Cattedra l' anno scolastico 1761.-62., e nuovamente nel 1764.-65., nel qual ultimo anno vi aggiunfe il capitolo degli ascessi interni, il quale, se non c'inganniamo, farà dagl' intendenti confiderato come un capolavoro. Nella Sezione de' tumori caldi, o sia infiammati sarà da tutti ( speriamo ) commendata la bella teoria dell'infiammazione, perchè aliena da ogni ipotesi, e fondata sulle fole offervazioni anatomiche, e patologiche. Sonvi inoltre in quella Sezione molte cose essenziali, e proprie dell' Autore, le quali dall'erudito Lettore faranno facilmente distinte; noi ci con-

BERTRANDI TUM. TOM. L.

tenteremo di accennarne una, o due. Per esempio al n. 196. nota (a) facciamo notare, come quì il BERTRANDI annoveri tutt' i segni, che indicano un travasamento nella cavità del petto, alcuni de' quali dal dotto signor VALEN-TIN (1) sono rapportati come non ancora da chicchessia osservati. Vedasi nel numero seguente, qual profitto sappia egli trarre dalle più minute cognizioni anatomiche per ispiegare l'ascesso del petto offervato dal FOUBERT tra la cartilagine xifoidea, e il margine cartilaginoso dell' ultima vera costa, e delle due prime false ( ascesso, che era stato preso da molti Pratici qual ernia del ventricolo), e si capirà, se han ragione coloro, che sprezzano quasi inutili fiffatte cognizioni. Lo stesso dicasi dell' ascesso del fegato offervato dal PETIT figlio, e rammentato al n. 203. pag. 125.

Nel IV. Tomo della Reale Accadadi Chir. di Parigi a pag. 545. il celebre De LA MARTINIERE ha fatto inferire una fua crudita Differtazione sur Popération du trépan au sternum, nella quale tra i vari casi, ne quali deesi trapanare quell'osso, meritamente annovera anche quello di un ascesso formatossi.

<sup>(</sup>a) Recherches critiques fur la Chirurgie moderne .

fotto di esso tra le due lamine del mediastino in conseguenza della infiammazione di quel tramezzo. REALDO Co-LOMBO è stato per avventura il primo a dire, che, quando nella donpiatura del mediastino havvi raccoglimento di pus, di acqua, o di altro umore, bifogna loro dare efito colla operazione del trapano (a): Mais je lui voudrois volontiers demander ( riflette molto a proposito il buon Ambrogio Pareo (b) ) , comment nous cognoistrons que tel humeur y soit contenu? Per soddisfare pertanto alla domanda del PA-REO ecco i segni, che dà di tale ascesso il DE LA MARTINIERE (c): Les signes de l'abscès du mediastin, produit par cause interne, se déduiront de la considération des symptomes, qui auront primitivement manifesté l'inflammation de cette partie, & des signes rationels, qui en indiqueront la terminaison en suppuration purulente, tels sont la remission des symptomes inflammatoires, pendant que le malade éprouve des frissons irréguliers, & autres indices locaux, qui pourront ne pas échapper à un Praticien éclairé. Ora si paragoni il diagnostico di questa

(a) De re anatomica lib. x1. cap. 3.

<sup>(</sup>b) De l'Anatomie liv. 1v. chap. VII. (c) Acad. Royale de Chirurg. Tom. 1v. pag. 556.

questa malattia quì recato dal DE LA .MARTINIERE con quello, che ne dà il BERTRANDI al n. 199., e farà facile il decidere, chi dei due abbia meglio foddisfatto al voto del PAREO. pure, com' egli individua prima dello Scrittore Francese i casi, ne' quali quell' ascesso si può evacuare senza l'operazione del trapano, e quanto sia utile l'avvertimento, che dà, di aprir tostamente gli ascessi, che qualche volta si fanno al timo, e che sogliono manifeftarfi alla parte inferiore della gola, affine d'impedire, che la marcia non si spanda al di sotto dello sterno, com' è accaduto al Cocchiere, di cui narrasi la storia a pag. 552. di detta Accademia.

Ma perchè i fegni dell' afcesso fattosi sotto quell' osso debbonsi principalmente ricavare da quelli della preceduta infiammazione del mediastino, noi qui gli addurremo. Il FREIND nella sua Storia della Medicina pag. mini 241. sa osservare dopo il Zacuto (a), che il primo, il quale abbia fatto menzione di quella insiammazione, come di morbo esservate, è AVENZOAR (b): i segni, che ne dà, sono della contra della contra

<sup>(</sup>a) De medicor. principum historia lib. 2. histor. 23. (b) Nel suo Libro intitolato Restissicatio medicaminis, & regiminis cap. 63., & 65.

sono una tosse continua, un leggier dolore, che si stende d'alto in basso per la lunghezza dello sterno, la respirazione difficile, frequente, e piccola, la febbre acuta, il polso duro, e inuguale con una grandissima sete. A questi fegni Pietro Salio Diverso, Medico di Faenza, aggiunge un eccessivo calore nel torace, doloris nihil fere nisi in sterno ( non già come dice il DE LA MARTINIERE ibid. ( pag. 354. ) une petite douleur partout excepté au sternum), quo in loco molesta potius angustia, & interclusio, quam in spirando dolor, sentitur. Soggiunge, che questa infiammazione si distingue dalla pleuritide per la fede, e per la minore acutezza del dolore, dalla peripneumonia, perchè la respirazione è meno disficile. Se all'infiammazione del mediastino si aggiunge quella del pericardio, come sovente accade, allora i mentovati fegni sono più intenfi, e inoltre fuccedono frequenti fincopi, e palpitazioni di cuore ( vedete Petri SALII DIVERSI curat, morbor. particular. pag. 225. ) Il MORGAGNI vedendo, che il Salio tra i segni della infiammazione del mediastino mette costantemente una certa molestia, e restringimento piuttosto, che un vero dolore allo sterno, domanda, perchè la stessa molestia dolorosa non pruovasi ugualugualmente al dorso, dove il mediastino va ad attaccarsi, come si attacca allo sterno. Risponde ciò poter dipendere, o perchè sia più frequente, e conseguentemente meglio offervata l'infiammazione della parte anteriore del mediaftino (a), o perchè le vertebre nel tempo della respirazione muovansi molto meno, che lo sterno (b). Non sempre però nella infiammazione del mediastino si osservano tutt' i mentovati segni; qualche volta, essendo essa di natura cancrenosa, e suffocativa, ammazza in pochissimo tempo l'ammalato, come è accaduto al Medico TROMBELLI. di cui è riferita la storia nel Tom. II. part. I. pag. 187. dell' Accademia Bologna. È queste poche rislessioni bastino per la prima Sezione de' tumori umorali . Al principio del II. Tomo ne metteremo alcune altre riguardanti i tumori freddi, e il rimanente di questo Trattato .

N. B.

<sup>(</sup>a) De sedibus , & causis morbor. Epist. XXI. ad finem n. 46.

<sup>(</sup>b) Ibid. Epift. xx. n. 12. Il VVansvvieten Comment. in aphor. Boerhaev tom. 111. pag. 57. edit. Taurin-narra la ftoria di un ascello sattosi sotto lo sterno dopo una pleuritide, la cui materia corrose quell' offo, e fi aprì la firada per gl' integumenti: il malato ne guari, ma vi rimafe una fiftela.

N. B. Ai 24. di Luglio, mentre eravi ancora l'ultimo foglio di questo primo Tomo da stamparsi, ci arrivò il primo Tomo delle Instituzioni di Chirurgia del signor Giuseppe NESSI Professore di ostetricia, e Instituzioni Chirurgiche nella Regia Università di Pavia, ivi stampato 1786. in 8., il qual Tomo già avevamo veduto annunziato negli Opuscoli di Milano. Da tutto, il contesto dell' Opera, e da molti squarcj della medesima si vede, che il chiarissimo Autore, forse nel tempo, che soggiornò parecchi mesi in Torino, ha letto i MSS. del BERTRANDI, e certamente noi avremmo giusto motivo di dolerci, che mai non lo citi, se nella Prefazione non avesse addotte le ragioni, per le quali ha creduto di non dover citare nessun degli Autori . ai cui fonti ha bevuto .

~~

In iis negotium majus est, quæ per se, vitio intus orto, intumescunt, & ad suppurationem spetlant. Ea omnia genera abscessum sunt. Cels. de Medic. lib. VIII. cap. II.

Errori occorsi nella Dissertazione de hepatis
abscessibus.

crata . Corri

Pag. 194. lin. 12. discripseram descripseram. Pag. 196. lin. '9. stuidim fluidam . Pag. 198. lin. 10. habita abit.



## TRATTATO

DE' TUMORI.

DE' TUMORI IN GENERALE .

I. CIASCUNA parte del corpo animale ha un determinato volume, maffa, e figura. Tumors nella Patologia Cerufica è l'eccesso della naturale estensione di qualche parte, per cui la figura n'è sempre cangiata, e non di rado anche l'azione viziata.

2. I tumori (1) sono prodotti o dagli umori del corpo, che in alcuna parte troppo abbondantemente si portano, e si raccolgono, e questi diconsi tumori umorali: fra i quali quelli, la cui materia si trova rinchiusa in una vescica, o, come dicesi, in un follicolo, tumori follicolati, o cistici sono chiamati: o sono prodotti da ricresciumenti di soltanze, e allora crescenze si appellano sarcomatose, adipose, osse ca., o da parti, che, lasciato il loro sito naturale, sono passitate ad occuparne un altro non prese

BERTRANDI TUM. TOM. I.

ne del sue

Cagioni congiunto de' samoria prio, come accade negli slogamenti, nelle fratture feomposse delle ossa, e nelle mutazioni di sito d'alcuni visceri, od organi, che in certi casi ernie, in altri procidenze si addomandano: o da corpi estranei, che introdotti in qualche parte più, o meno la distendono, come da palle d'archibugio, da chiodi, da pezzi di legno, e simili: o finalmente (ciocchè più raramente accade), da un vapore aereo, e questi si chiamano tumori statulenti.

Cagioni an-

3. Queste sono le cagioni congiunte, e materiali, che immediatamente formano i diversi tumori. Le primitive, o antecedenti sono o i vizi degli umori, che peccano in quantità, in qualità, o nel moto, o i vari difetti organici delle parti, le quali cagioni o internamente per certe, come diconfi, spontanee mutazioni inforgono, o dall'esterno sono promosse, e in generale possiamo dire, che la cagione predi-(ponente de' tumori è l'eccesso delle forze delle parti contenute, cioè dei fluidi fopra la contrattilità, e la refistenza delle contentinti, cioè dei folidi, fia che essi fluidi siano stati antecedentemente viziati, come dicevamo, onde abbiano per se stessi vinta la resistenza de' solidi. fia che questi abbiano prima patito nella loro struttura organica; il che meglio dimostreremo trattando di ciascun tumore in particolare.

Segni gene-

4. Il fegno generale de tumori è l'apparente maggiore effentione della parte (1), paragonata al fuo natural volume, e finmetria, secondo l'età, e la natural forma del foggetto. I fegni patognomonici poi, che caratterizzano ciafcun tumore, fono vari, come i tumori ftessi, come i tumori rale.

. Se la materia, che forma il tumote (2). non è di cattiva qualità, dicesi benigno, e se ella è maligna, maligno è il tumore, o anche pestilenziale, se da una pestilente infezione dipende. Se i sumori sopravvengono ad un' altra malattia con alleviamento della medefima, appellanfi critici, se con aggravamento, sintomatici .

Distinzione de' tumori in benigni , . maligni , pes filenziali critici, e fintomatici .

6. Quattro fono i tempi de' tumori ; cioè il principio, che è quando la materia comincia foprabbondare in una parte : l'aumento, quando quella fempre più accumulandovifi, il tumore continuamente cresce, nè ancora è circoscritto in limiti terminati, anzi, a mifura che fi spande, fempre maggiori fintomi produce : lo ftato, quando essa materia persiste costantemente in quella quantità, a cui è pervenuta in tutto il tempo dell' aumento, niente crescendo, nè scemando i fintomi: la declinazione, quando, ri- Declinazione folvendofi, o evacuandofi la materia, colla gravezza de' fintomi anche il volume del tumore diminuisce . Ne' tumori caldi (42) il principio, e l'aumento con somma prestezza si seguono, nè lo fato dura molto; allo 'ncontrario ne' tumori freddi ( ibid. ) ed ancor più in quelli, che sono prodotti dal crescimento di una nuova fostanza (2).

I tempi de tumori fond uattro: Principio : Aumento .

7. Sei sono le terminazioni de' tumori, cioè risoluzione, suppurazione, retrocessione, mortisi-

sazione, induramento, ed esulcerazione.

8. Dalla necessità, o possibilità dell' una, o dell'altra di queste terminazioni (7) si dee trarre il pronoftico buono, o cattivo, dovendo conseguentemente la cura riescire o breve, facile, e felice, o lunga, difficile, e di cattivo efito .

Le terminazioni de' tumori fono fei, e quali, Pronoffico .

9. Det .

La rifoluzione quando fi debba tensare.

9. De tumori benigni (5) si dee sempre tene tare la risoluzione (16), la quale però ne riesce anche difficilissima, se la materia è trattenuta in gran quantità, e fuor de' vafi, dovendofi allora fin da principio quafi fempre tentarne la suppurazione.

Quando la suppurazio-

10. I maligni fiano critici, o fintomatici (5), e i pestilenziali si debbono sempre muovere alla suppurazione (17) per trarre dal corpo la materia, che può nuocere (21).

La retroceffione perche fi debba Schivare.

11. La retrocessione, se è possibile, deesi fempre evitare; concioffiachè alla materia retrocessa non sempre felicemente si apre la strada per sudore, per gl' intestini, o per la via delle urine, onde non si abbia a temere, che non . resti diffusa nel sangue, per cagionar maggior turbolenza, ed infezione ( fendo fempre maligni i tumori, che fogliono retrocedere ) o che non vada ad arrestarsi in qualche altra parte con molto più grave pericolo (21).

La rifoluzione, ela recroseffione come fi facciano .

12. La risoluzione, e la retrocessione sono fatte per le stesse azioni meccaniche, cioè per l'afforbimento nelle vene della maggior parte del liquido, che formava il tumore; il qual liquido, fe fi rimette al circolo, nel primo caso (9) l'umore buono si assimila col sangue buono, nell'altro (11) l'umor cattivo gualta il fangue, che ancor fosse buono, o lo rende peggiore, se già era tutto guasto, massime se non accade qualche evacuazione, onde fi efpurghi; e perciò fi perde il vantaggio della crisi, se il tumore era critico (5), e s'aggrava ancor più la malattia, s' era fintomatico.

La mortificat da gvitarfi.

13. La mortificazione di una parte dee non gione perchè meno evitarfi, che la morte del tutto, non potendofi così facilmente sperare di regolarne i termini, quantunque cominciasse in luogo meno pericolofo, e meno importante (22). 14. L' ing

14. L'induramento (23) si dee anch' esso evi- Cosi puro tare; ma qualche volta fatto ch' egli è irrefolubile, è necessario di promuoverlo, e di sostenerlo, se non è possibile, o permessa l'estirpazione del tumore (39), acciocche non ne ac-

cada l'efulcerazione (7).

15. Questa è anche una pessima terminazio- L' esulcerene, perchè è sempre l'effetto della pervertita natura degli umori, che difficilmente fi può cangiare affatto, onde alcuna volta fia meglio averne una qualunque evacuazione. L'etiologia. i modi meccanici, e gli effetti di queste tre ultime terminazioni ( 13. 14. 15. ) faranno efposti negli articoli della cancrena, dello scirro,

e del cancro.

16. Quando dunque la materia di un tumore è di buona qualità, nè raccolta in troppa copia, nè con troppo impeto, ed i vasi sono nè troppo rilaffati, ne troppo refistenti, se ne può sperare la risoluzione (9). Questa si conosce, vedendo il tumore diminuire a poco a poco nello stesso tempo, che anche scemano i sintomi ; la parte è meno tela, meno refistente, ed al color naturale sempre più si avvicina,

fino che il tumore affatto svanisce.

17. Siccome la cattiva qualità della materia, La fuppura che produce il tumore, e la gran copia, ed il forte impeto, con cui fi è raccolta, deono obbligare il Cerufico a tentarne la suppurazione (9. 10.), così gli faranno prevedere, che facilmente vi fi determinerà, principalmente allor quando vedrà, che l'umore quasi ad un centro fi accumula; che quivi la durezza, la renitenza, il calore, la pulfazione divengono maggiori, e che il colore si fa più intenso; e quanto più crescono questi accidenti, e si fanno fentire in un determinato luogo del tumore. tante più farà imminente la suppurazione, mas-

poffima tere minarione.

Segni indicanti la rin foluzione,

tione , che &

fime

fime fe il dolore fi fa più acerbo, e fopràvviene, o crefce un'interna perturbazione colla febbre: Dum pus conficiur ( diffe IPPOCRATE (a)), dolors, & febres magis accidunt. Nella fonma turgiderza del tumore nafec un certo martellamento, e bollore, crefcono ancora l'interna agitazione, e la febbre, la quale qualche volta è accompagnata da rigore di freddo.

La fatte .

18. Quindi a poco a poco gli accennati fintomi diminuifcono, la parte diventa molle, bianca, alcune volte appuntata, col tatto fentefi l'ondeggiamento della materia, ed allora il tumore dicefi afselfo, od apoltema (b).

19. Non sono però sempre tanto chiari i fintomi della suppurazione; ma alcune volte, producendosi esta piuttosto per lo scomponimento spontaneo della materia stagnante, per cui si fa puttida, ed i sodi essendo inerti, leggierissimi sono que sintomi della suppurazione, che si fa (17), e appena sensibili i segni della già statta (18).

Segni della marcia buona, 20. La materia della fuppurazione, per effere buona, debb effere uguale, bianca, non molto

(a) Aphor. 47. sect. 11. Dolores, & sebres contingunt magis circa puris generationem, quam eo consecto. (b) Questo è il senio, che si dà comunemente a'

<sup>(</sup>b) Questo è il senso, che si da comunemente a sostiti giorni alle parole afcesso, e apellum; non crediamo però inutile l'avvertire per l'intelligenza degli Scrittori antichi, che essi sotto inume di afesso, o di apossima son intendevano già il tumore suppurato, ma qualtunque tumore umorale tendence alla suppurazione. Ciò si ricava da più luoghi di Cesso, come dal seguente: Si quid estam absessifis, so antegnam suppurates s'subsessi (cap. 7, 11b. 2, pag. 63, 1), e ancor più da quest' altro (lib. 5, cap. 43, pag. 326.) Sed quum omnes si (avea parlato del suroncolo, del sima, e del signo) nitisi ni si munia sistessi si suppurationemen trashi latius virium, totum qd suppurationem presente.

21.

fetente, aver confumata, ed ammollita la maggior parte del tumore, ed effere raccolta tutta in un alveo: cattiva è la icorofa, la giallognola, la verdafita, e la negricante (a).

(a) Circa la buona, o cattiva qualità delle diverse. spezie di marce leggasi nel Trattato delle ukere l'articolo delle ulcere in generale. In ogni tempo si è incontrata moltiffima difficoltà a spiegare la natura, e l'origine del pus. Questo umore, perchè è sempre accompagnato da un qualche benchè leggiere puzzore, e per certe altre sue qualità, vedesi, che sa approffima alla nasura degli umori corrotti, e putrefarti : ma fe si bada poi all' indole sua blanda, mite, dolce, e quafi balfamica, al fuo colore bianco, e alla fua confiftenza craffetta, e uguale, non gli si può negare una natura propria, e specifica, di gran lunga differente da quella degli altri umori corrotti. Quafi tutti i Medici, e Cerufici hanno per lungo tempo creduto, che il pus fosse prodotto dall' azione accresciuta delle forze vitali, e quindi spiegavano, perchè ne' tumori caldi, ne' quali, come vedremo (44. e feg. ) quelle forze fono sempre accresciute, così sovente si generi il pus. Il chiarissimo PRINGLE è stato il primo a dimostrare con esperimenti convincentifimi, che fenza il concorfo dell' azione vitale, esposto al fuoco di digestione, si separa dal fiero del fangue un fedimento, che ha tutte le qualità della vera marcia ( vedere il fuo eccellente Traité sur les substances septiques, & antiseptiques tom. avendo ripetute, moltiplicate, e diversamente variate le sperienze del PRINGLE, non solamente con esse ne ha confermato la dottrina, ma dilucidati inoltre diversi punti essenziali riguardanti la generazione del pus, e provato, che la fola parte albuminosa del siero è quella, che lo forma, che in niente vi concorre la parte cruorofa del fangue, come nenpure la pinguedine, la bile, o gli altri umori, e neppure le parti fode del corpo . Intende però egli parlare della marcia pura, e schietta, non negando, che quegli umori, e quelle fostanze sode più, o meno putrefatte vi fi possano aggiungere, ma allora la marcia degenera fempre più, o meno dalla fua blanda natura, a proporzione di quel mescuglio, e

Quali tumori fogliano retrocedere: 21. Sogliono retrocedere que' tumori erlici, o fintomatici, de' quali la materia è maligna, e questa, come accennai, (11.12.) o fidificade

della maggiore, o minore putrefazione di que' corpi eterogenei. Un esempio evidente ne abbiamo negli ascessi del fegato, de' quali quelli, che si fanno nella cellulofa della fua tunica, fogliono produrre un pus di buona qualità (208), allo ncontrario quelli, che ne occupano la sostanza parenchimatosa, mai non danno una schietta marcia, ma una materia di diverso colore, e confiftenza, quafi fimile alla feccia del vino (203). Che poi neppure nel corpo animale vivente non fia neceffaria l'accresciuta forza vitale alla generazione del pus, lo dimostrano la prestezza, e la quantità, che non di rado se ne forma in certi tumori senza precedente instammazione nè locale, nè universale, e ciò può anche far credere, che non sempre il pus si generi nel tumore stesso dal siero travafato, e stagnante, ma che vi possa essere porrato già bell', e formato dentro de' vafi medefimi. Vedete nelle Miscellance di Torino tom. 11. pag. 80. Johannis Baptifla GABER experimentorum de putrefactions humorum animalium specimen secundum, e specimen tersium nel terzo tomo. Questa dottrina fondata su tante ingegnose sperienze è stata abbracciata da molti dottiffimi Scrittori, e tra gli altri dal Cullen ( Inflieutions de Médécine pratique tom. 1. pag. 121.), e da Ernesto PLATNERO nel primo supplemento alle institugioni cerufiche del Padre pag. 29., e feg. Il BRAMBILLA però nel fuo Trattato fopra il flemmone parte 1 pag. 244: fa una lunga riflessione per combatterla, facendone Autore, oltre il PRINGLE, ed il GABER, anche il CIGNA, il quale non ha, che fi fappia, mai trattato di questo argomento. Le ragioni addotte dal BRAM-BILLA fono, che avendo esso ripetuti gli esperimenti del PRINGLE, e del GABER sopra la crosta flogistica di alcuni pleuritici, la materia, che dalla fua corruzione ne nacque, era biancastra, ma lontana dall'effere il ve+ ro pus. Anche al GABER fembro ne' fuoi primi esperi-menti di offervare una tale differenza ( loc. cit. tom, 11. pag. 91. n. 26. ), e perciò avea confutata l'opinione del Quesnay, e di altri celebri uofi.ini, che avevano detto la materia del pus effere la stessa, che quella della grofla pleuritica, ma poi con puovi

fonde, e fi rimeícola con tutta la mafía degli unnori, ed allora i fintomi della malatita principale vedonfi crefere e, e divenire fempre più pericolofi, quanto più il tumore diminuice, o la flessa materia a qualche altra parte si determina, e vi si raccoglie, e secondo il suo ulo, e struttura vari sintomi produce, come delirio, convulsione, assezione soporosa, se si trasporta al capo, e se ai polmoni, difficoltà di respiro, ansietà, palpitazione, e sputo di sangue, d'icore, o anche di marcia; itterizia, dolore, tensione all'ipocondrio destro, singhiozzo, e vomito, se al segato ec., e in questi casi il tumore dicesti terminato per metallassi.

22. Quando que' fintomi, che dicemmo indicare, doverfi fare la fuppurazione (17), non fi determinano ad una data parte del tumore; ma tutta la massa ne occupano con somma durezza, tensione, calore, e pulsasione, divenendo il colore della cute occuro, violaceo, e finalinente livido, il peso della parte crescendo, e il calore, e la sensibilità diminuendo;

Segni della imminente mortificazione.

esperimenti si convinse del contrario e da uomo ingenuo, com' egli era, si ritrattò nel terzo suo Sag-,, la parte fierofa , la più inerte , e la più glutinofa ,, del fangue cagiona lo scirro: questo adunque più , d'ogni altro tumore paffar dovrebbe alla suppurazione." Se il BRAMBILLA avesse letto attentamente il secondo Saggio del Gaber, avrebbe veduto, che ha risposto appieno a questa sua obbiezione, poichè alla pag. 80. num. 20. dell'accennato Tomo di quelle Miscellance dice, che, lasclato il siero per lungo tempo in ripolo in un vale chiulo ermeticamente, se ne diffipa tutto il sedimento puriforme, rimanendovi in suo luogo nel fondo del vase minutissimi frammenti, quai fabbie, di una fostanza calcare, e poi dubbioso domanda: An ex ea calcarea materie skirri origo est explicanda?

egli è segno della imminente mortificazione; ancor più se sulla superficie del sumore si elevano vescichette piene d'icore, o sentesi col tatto una spugnosa mollezza, da cui esala un odore cadaverico.

Dell' indura

23. L'induramento de almori umorali fi conofice dal vedere, che, come diminuifice il memore, crefce la fua durezza, e folidità, diminuificno, e infine affatto ceffano i fintomi, che
possono dipendere dal movimento de' liquidi,
e dall'azione de' vasi, e la patte fatta quasi indolente sempre più si avvicina al color naturale.

Della efulcé-

24. La esulceragione (15) suol essere il termine delle rispote maligne (161), e di alcuni tumori duri (14), e questa dipendendo dalla corruzione dell' umore, e dalla viziata azione organica della parte è sempre, come ho già detto (15), una pessima terminazione: si screpola, si rode, e si consuma la cute, sorge una sostanza fungosa più, o meno dura, divisa in maggiori, o minori masse disquali, inverniciata, e grondante una marcia icorose, rodente, e ferente. Le screpolature delle buganze (a) sono piutrosto l'effetto d'una leggierissima cancena, ancor più quelle de carboncessi (177); quelle poi del suoco facro (161) sono piuttosto simili alle scottature.

Modi di aprire gli afcessi. 25. I tumori suppurati (18), se non si aprono da se, deonsi aprire coll'arte, e quest'apertura si può sare in due maniere, cioè col caustico attuale, o potenziale, o collo strumento tagliente.

In quali cafi convenga il cauftico . 26. Il cauflico, quantunque agifca con maggior dolore, in più lungo tempo, e con maggior

<sup>(</sup>a) Ved, il capit, ult, del Trattato delle ulcere,

gior guaffamento di fostanza, nulladimeno è da preferirsi in que' tumori, i quali per la lentezza, e craffezza degli umori, e per l'inerzia della sostanza organica difficilmente possono pervenire ad una perfetta maturazione, quantunque necessaria; o che hanno bisogno d'una lunga, e copiosa suppurazione, o quando fi dee consumare una qualche sostanza, che forse mai non suppurerebbe, nè si potrebbe altrimenti togliere, come dimostreremo ne' casi particolari .

27. Il caustico attuale, date le sopraccennate In quali il circostanze (26), si dee preferire in que' casi, caustico atdove si temerebbe lo spandimento del caustico potenziale (18), perchè non vi fosse modo di appoggiarlo, e contenerlo, o perchè la sua lunga azione potesse nuocere, o vi fosse per ogni ritardo pericolo di retrocessione (21), come fuole accadere in alcune parotidi suffocative ( 95. 99. )

28. Tra i caustici potenziali soglionsi usare Quai caustila pietra infernale, e piuttosto la preparata col rame, la quale, più facilmente sciogliendosi. più prestamente agisce: ancor meglio convengono le altre pietre caustiche preparate colle ceneri clavellate, o colle semplici ceneri di farmento, e colla calce viva, o con questa, e col lissivio di sapone. E questi caustici sodi in forma di pietra fi deono preferire, quando vi fono durezze da intaccare: negli altri cafi può bastare un caustico estemporaneamente composto con egual porzione di fapon molle, e di calce viva ridotta allora in polvere.

29. Per applicare il caustico potenziale si copre il tumore con una pelle spalmata d'un impiastro attaccaticcio, quale sarebbe il diaquilon composto, o altro: la pelle debb' essere aperta in mezzo per quell'ampiezza, che si desidera ci potenziali ufare fi poffano.

Maniera Si applicarli.

bruciare, che farà maggiore, o minore secondo il volume del tumore: dee l'apertura corrispondere a quel luogo, dove è già accumulata la marcia, dove può avere una più facile uscita; dove con maggior profitto si abbrucia. maggior fostanza confumando, e quella principalmente, che più difficilmente suppurerebbe. Ben attaccato l'empiastro, si applica in mezzo l'apertura la pietra caustica (28) in grossi frammenti rotta, oppure anche intera, ove fiavi maggior fostanza da abbruciare, si copre con filaccica, o con cotone, poi fi applica fopra un altro pezzo di pelle intero, e spalmato dello stesso empiastro, il quale si estenda alquanto oltre la base del sumore, e vi si attacchi ben difteso, e fermamente: vi fi soprappone una compressa, ed il tutto si contiene colla convenevole fasciatura, raccomandando al malato di tener la parte ferma, perchè non pericoli di fare sdrucciolare il caustico.

Tempo di toglicili. 30. Quando se ne conosca il valore per isperienza, si saprà il tempo, in cui potrà effere stata fatta l' ¿scara pel totale dicioglimente del caustico. Allora si scioglie l'apparecchio, si ripulice la superficie del umore, e se l'escara non s'è screpolata, si aprirà col servo, o si romperà col dito, per dar esito alla marcia. L'azione del caustico produce anche un' infammazione allo intorno dell'escara, più, o meno ampia, della quale si dee proccurare la suppurazione, tanto più, che per averla più abbondante si suole esso applicare (16).

Precauzioni da averti nell' applicargli, e dopo avergli applicati.

31. Nell'applicarlo bifogna evitare i vasi di qualche diametro, perchè colla caduta dell'efcara non possa accadere emorragia, e se mai il caussitico avesse penetrato ad ossendere alcuno, si conshietturerà da una sorte, ondosa, e limitata pulsazione, che il malato sente in alêun luogo; ed allora coi difeccanii, ed astringenti si proccurerà di mantenere sompre più soda l'escara, sino che incallisca, e si restringa l'estremità del vase lesco, e il sangue si aggrumi (a), per togliere ogni pericolo di emorragia. Come lungi da'vassi, così anche da'nervi, da'tendini, e dalle aponeurosi si applicherà il scussiva perchè il malato non resti storpio, e per evitare le gravissime insiammazioni, gli assessità, le convulsoni, ec., che alla lessone di quelle parti sogliono succedere (b).

32. Se non ve pericolo di emorragia (31) fi proccurerà, il più prefto, che fia possibile, il totale distaccamento dell'escara, con far suppurare l'infiammazione, che abbiam detto farsi attorno la circonferenza della medefina (30). Fra pochi giorni si vede, comparire un solco bianco tra l'escara, e la parte sana, donde quella per qualche parte si distacca, secchè poi,

traen-

<sup>(</sup>a) Nel Tratt. delle ferite capit. 2. è diffusamente spiegato il modo meccanico, onde la natura si serve per arrestare l'emorragie, modo, che quì è semplicemente accennato dall' Autore.

<sup>(</sup>b) Oltre ai vafi ragguardevoli, che fi deono préfervare dall'azione del caustico, bisogna anche badare nell'applicarlo a quelli di minor diametro, che si possono incontrare nel tumore. Questi corrosi spandono non di rado fangue, che ferve di mestruo, e di veicolo al caustico stesso, il quale va qualche volta ad offendere parti effenziali, o almeno fa guafto, dove non dovrebbe. Da un caustico applicato fopra un bubone venereo abbiam veduto corrola buona parte dello scroto, e scoperto il testicolo di quel lato, e un' altra volta prodotta un' ampliffima ulcera alla faccia interna della coscia. Se pertanto non si possono que' piccoli vasi difendere dall' azione del caustico, si applichi almeno un addattato, e sufficiente apparecchio per impedire lo fpandimento e del fangue, del caustico.

traendola colle molle, facilmente fegue, o firecide colle forbici.

33. În alcuni cast conviene prima aprire col ferro il tunore per quella parte, che già suppurò, ed il rimanente co' cateretici, e co' cauestici si dee consumare, perchè non sarà possibile, come già accennammo, di altrimenti muoverne la suppurazione a cagione dell' inerzia dell' organo, e della spessera del tumore; nè il taglio allora ad altro serve, che per portare immediatamente su quelle parti il caussitico.

34. Il Cerusico non dee mai far uso di alcun caustico potenziale, senza conoscerne la
composizione, e per pratica l'azione, per non
esse rica richia di a veemenza, od inefficacia: nè mai se ne faccia impostura, quantunque moltissimi sieno i modi di prepararli: si
usino con molta discrezione gli arsenziali, e i
mercuriali, non solo pel veementissimo essetto,
che possono produrre alla parte, ma anche perchè possono essere facilmente trasmessi a fangue.

Modo e aprire g afcessi co serro I modi di applicare il cauflico attuale faranno spiegati nel corso di questo Trattato (a).

35. Quando l'apertura de tumori suppurati
si dee fare col taglio (15), facciasi nel luogo
più molle, fotto cui siavi la marcia, nella
parte più declive, ond'essa possa più facilmente colare, e facciasi proporzionata al volume
del tumore, per lo più tagliandone tutta, o
quasi tutta la volta, che su distaccata dalle
marce: si segua la direzione de muscoli, si suggano i vasi s'anguigni, i nervi, e i tendini: riguardo alle aponeurosi è alcuna volta necessario di tagliarle, quando le marce si sieno raccolte

<sup>(</sup>a) Vedafi tra gli altri il S. del Bubone n. 102,

volte fotto di esse, e si debbono tagliare in croce, o a foggia di T, per togliere lo stiramento, che può recare gravi fintomi, e per dare un più facile efito alle marce.

36. Se il loro cumulo fosse in grande quantità, non si facciano uscire tutte in una volta, che il malato potrebbe cadere in fincope (a). E neppure converrà in fimile caso aprire il tumore per tutta la fua lunghezza (35); concioffiachè con grave danno fi scoprirebbono sovente certe parti, che dovrebbono effere meglio custodite, e difese: si faranno piuttosto col tempo contro-aperture, o s' introdurranno fetoni. come ne' propri luoghi insegneremo.

37. Evacuata o tutta, o folamente in parte la marcia, si riempia mollemente di stuelli il fondo dell'ascesso, per non produrre un maggiore discostamento delle parti. Si useranno poi i digestivi, gli astersivi, e i cateretici secondo le durezze, e le fordidezze, che vi possono rimanere; e fe si vedono lembi di sostanza cellulosa imputriditi, e già qualche poco distaccati, fi taglieranno fenza afpettarne la naturale separazione, che forse tarderebbe troppo a farsi.

38. Il tempo di aprire gli ascessi è, quando Tempo la suppurazione è fatta in tutta, o nella massima parte dell'estensione del sumore, quando si sente l' ondeggiamento della marcia, e vedesi

Precauzioni da averfi fe l'afceffe è molto

afceffe aper-

effo

<sup>&</sup>quot; (a) Illud jure aliquis mirabitur, quomodo quæ-, dam fimul & affligant nostra corpora, et parte ,, aliqua tueantur. Nam five aqua inter cutem , quem implevit, five in magno abfceffu multum , puris coiit, fimul id omne effudiffe, æque morti-" ferum eft, ac fi quis fani corporis vulnere factus ,, exanguis eft. " CELS. de Medicina lib. 2, cap. 8. Pag. 72. Le ragioni, per le quali accade la fincope, fono addotte dal nostro Autore nel Tratt. delle operazioni cap, della paracentesi dell' addomine

esso cumors in alcun luogo appuntato, è tocacasi molle (18). Ma i tumori maligni, e i pefilanziali (5) alcune volte vogliono essera perti, quantunque non perfettamente suppurati, o per alleviare il corpo dalla cattiva materia, che li forma, quanto più presto sia possibile, o perevitare il pericolo della retrocessione (21). Lo stesso della natura) nati in vicinanza dello cavità, dei visceni, opora le articolazioni delle ostati, o nelle parti molto adipose, acciocchè non vengano maggiormente guastate le parti vicine, che per l'eccellenza della loro struttura, ed uso non potrebbono, se non con grave danno, essere ossere direco office.

Cura pei durari duri errefolubiti. 39. I tumori duri irrefolubili, i carnoss prodotti dalla vegetazione di nuova fostanza (2), quelli, che fono organici, come fono i cilicia (ibid.), richieggono l'estirpazione, quando il volume, la struttura, il sito, e il carattere del tumore il permettano; che altrimenti la via de' saussici è troppo lunga, dolorosa, e qualche wosta pericolosa.

40. În fine ogni qual volta dovrete curare alcun tumore, penfate prima qual terminazione possa egli avere pel fuo carattere, per la fua cossituzione, per la causa, che l'ha prodotto, pel foggetto, e per la parte, in cui accade, e secondo queste considerazioni determinatevi da principio, per non perdere tempo, cercando una terminazione o impossibile, o pericolosa. Le cagioni primitive, o antecedenti (3) si debbono togliere, o correggere, e gli accidenti combattere, e allora più facilmente si potranor immovere le congiunte (2) con alcuna delle accennate terminazioni, promovendole, e diriggendole secondo la necessità, o la possibiti sità.

41. Noi incomincieremo questo Trattato da' eumori umorali, dopo i quali passeremo ai sarcomatosi , e quindi agli erniosi , trovandosi in questa maniera quasi naturalmente distribuiti in tre Classi. I tumori offei, e quelli, che fono fatti dagli slogamenti, e dalle fratture scomposte saranno riserbati pel Trattato delle malattie delle offa, e i fatti da corpi estranei per quello delle operazioni .

Ordine, che fi fegue in questo Traca

#### DE' TUMORI

## CLASSE PRIMA.

Che contiene

#### TUMORI UMORALI.

42. LA materia de' tumori umorali (2) o Diftinzion con prestezza, ed impeto, o lentamente, e generale de fenza gran muovimento eleva la parte; nel reliprimo caso diconsi fatti per flussione, infiammaii , o caldi , nel secondo per congestione , o freddi . Avuto pertanto riguardo al maggiore, o minor tempo, con cui la materia fi raccoglie ne' tumori umorali, debbonfi distinguere in due Sezioni , cioè in caldi , e in freddi ; fe ne dovrebbe fare una terza dei flatulenti (che questi pure si possono ridurre agli umorali ); ma dell' enfisema, nel quale l' aria è sparsa net tessuto cellulare sottocutaneo, si parlerà nel Trattato delle ferite; degli altri poi, l'aria de' quali è contenuta in ricettacoli particolari, tratteremo in un co' tumori cifici .

# DE' TUMORI UMORALI

#### SEZIONE I.

CHE TRATTA DE' TUMORI CALDI, OSSIA INFIAMMATI.

De' tumori infiammati in generale.

43. NE' varj temperamenti degli uomini evvi una certa quantità, e modo d'azioni de' fiquidi fopra de' folidi, e di questi fopra di quelli, dalla quale quantità, e modo la fanità dipende; ma però la vita non si mantiene, se non colla maggiore parsimonia di quelle azioni, ed ogni eccesso solo effere morboso.

Segni generali dell' infammazione.

44. Dicefi infiammata una parte, quando diventa più del folito calda, rossa, tumida, e pulsatile. Così dicesi infiammato l'uomo pallido, e debole, se per una qualunque cagione diventa rosso in faccia con vasi sanguigni sugli occhi, e fulle guance ora apparenti, che prima non fi vedevano; se le arrerie in esso si muovono con maggiore celerità, e forza, e gonfiano per ogni parte le vene, fe ha la respirazione più frequente, forte, e calda, se suda, e da una maggior forza animati tremangli gli articoli, e gli arde il corpo. Le forze della vita in quest' uomo sì violentemente, e con sì straordinaria forza allora agiscono, che finalmente caderebbe gravemente infermo, o morto, fe tale violenza durasse.

Cagioni.

49. Ma quel tumulto (44) nella macchina può inforgere tenza l'applicazione meccanica di alcun corpo, per efempio per una paffione dell' anima; dunque tutti quegli effetti allora dipendone dono dalla forza follecitata della vita, che per se stessa tutto il sistema de' nervi, e de' vasi irrita, e commuove, dalla qual irritazione sono con maggior forza spinti i liquidi , ed essi stessi maggiorinente gli organi irritano, ficchè fi raddoppi mutuamente, e in un istante la violenza e l'impeto degli uni contro gli altri, quantunque prima, come dicemmo, non fosse stata altrimenti offesa la macchina.

46. Se un dito, o altra parte viene punta L'infiammada una spina, o altrimenti irritata, quella diventa rossa, tumida, dolente, pulsano le arterie, che prima non fi fentivano, e quivi fi fente un maggior calore, e un dolore, che instantaneamente offende; ma questa meccanica cagione esterna ha solamente potuto commuovere la forza vitale di quella parte, fenza offendere l'universale sistema: dunque come l'eccesso d'azione della forza vitale può muoversi in tutto il fistema, e produrre un' infiammazione universale ( 44. 45. ); così può anche essere mossa solamente ne' termini di una parte. onde questa fola fi veda infiammata: così certe parti di alcuni animali mostrano di avere una irritabilità propria non attenente al sistema univerfale del corpo, dappoichè si muovono anche separate da questo. Nel Sepolcreto del Bo-NETO fi parla di una febbre parziale del braccio destro (a).

47. Alcuni hanno data per cagione perpetua immediata della infiammazione la oftruzione di alcuni menomi vafi, ne' quali non potendo più,

zione può ef-

<sup>(</sup>a) BONETI Sepulchret. tom. 3. pag. 135. la offervazione , che è intitolata Febris brachii dextri particularis quotidiana è stata estratta dalle Miscellance de' Curiofi della natura anno 1673. obferv. 205. . ed è stata tatta da Andrea CNOFFEL.

Perchè la oftruzione non possa essere la causa immediata dell' inflammaçio-

il sangue passare, debba necessariamente crescere l'impeto di esso ne' vasi prossimi laterali. 48. Ma, ammettendo anche per vero, che la infiammazione foglia fuccedere alla oftruzione di alcuni canali, dobbiamo però niente di manco confessare, che essa non si può muovere, se non per l'accresciuto stimolo della forza vitale o in tutto il corpo (44. 45.), o nella fola parte infiammata (46); « Imperciocchè la-.. ligatura di un ramo arterioso ( scrisse il celebre GORTER nel Trattato 47. del suo Compendio della Medicina S. x. ) non produce già » l'infiammazione, ma il diffeccamento, e la » paralifia della parte inferiore, nè fi vede na-» scere infiammazione, quando una materia vi-» scida glutinosa ostrue l' arteria. Aggiungasi, » che una minima arteria compressa, od ostrut-» ta non vale per se sola ad accelerare la cir-» colazione nelle altre arterie, delle quali essa » forse non fa la millesima parte. Perchè, sic-» come le velocità ne' molti canali, che ven-» gono da uno stesso tronco, crescono pro-» porzionalmente, come si diminuisce la loro » capacità, questa poca diminuzione non po-» trebbe muovere una maggiore circolazione » fenfibile nemmeno ne' ramicelli, i quali fi » dipartiffero dallo stesso ramo; conciossiachè, » come dimostrano gl' Idraulici, un ramo, che » venga chiufo, distribuisce egualmente la ve-» locità per tutti gli altri rami nati dallo stesso » tronco. "

49. În fatti qual potenza può avere la oftruzione, per accrefeere il muovimento del liquido fuperiore, fe la parte ftefa, che lo manda,
e lo contiene, non ha altrimenti acquiflata
maggior forza? I liquidi agifcono per linee perpendicolari fopra i vafi, ne quali fono contenuti a e 2 come da uno schizzatojo, che abbia
de de le

due, tre, o quattro cannelle, quantunque una, o due se ne chiudano, non uscirà per le altre con maggiore velocità il fluido, fe non coll' accrescimento della forza dello stantusto; la stessa legge dovranno seguire i fluidi, che nel corpo animale repentinamente con istraordinaria velocità fi muovano.

50. I fintomi della infiammazione (44) fono tutti d'un inuovimento accresciuto, e tanto più grave, e violenta ella è, quanto sono maggiori que' fintomi : s' infiamma un edema, uno scirro. fe fi aggiunge lo stimolo eccessivo della forza vitale, che la inerte materia commuova, nè questa, quantunque fosse in gran copia, avea potuto produrre la menoma infiammazione : dunque, se la ostruzione in ogni caso ha preceduto. non potrà eslere stata, se non causa occasionale, la efficiente dovendo sempre dipendere da quell'accrescimento di stimolo della forza vitale. la quale agifca per se, onde vincere l'oftacolo nato dalla oftruzione, questa potrà medefimamente effere effetto di quello stesso flimolo, che abbia spinto il sangue contro argini, che non si possano così facilmente vincere.

51. Ogni infiammazione se non si risolve, o fe non suppura, termina in scirro, od in can+ crena (238), ed allora evvi la perfetta inerzia. e stast; il che è un'altra pruova, che questa non ha potuto effere la causa efficiente della

infiammazione.

52. L'anno 1703. il BOERAAVE (a) ha descritti nuovi vasi linfatici, i quali continuati

Argomenez addotti dal in prova di delle arterie linfatiche.

<sup>(</sup>a) Questo grand' uomo fece per la prima volta menzione di queste pretese arterie linfatiche nella sua Orazione De ufu ratiocinii mechanici in Medicina, stampata a Leiden l'anno 1703. in 8., e poi più ampiamente le descriffe pelle sue Instituzioni Mediche n, 245.

immediatamente dalle arterie fanguigne, di figura cilindrica, di un diametro più stretto del folo globo rosso, portassero un tenue umore acquoso, cioè la vera linfa, la quale, somministrato il sugo nutritivo alle parti, passasse poi come da arterie tinfatiche nelle già conosciute vene linfatiche nodose; e se tali arterie non si potevano dimostrare all' occhio, tentò di pruovare la necessità della loro esistenza co' feguenti argomenti di fatto, e di conghietture : fulla cornea lucida, e full' adnata in alcune ottalmie fi vedono vasi sanguigni, che prima non apparivano : le arterie fanguigne dell' uvea fi continuano sopra di essa con tanta tenuità, e fempre con ordine di arterie, che chiarifimamente fi vede, che alla fine non dee poter paffare in alcuna parte di esse, se non un umore più tenue della parte cruorofa, nelle quali però fi può ancor far paffare l'olio di trementina; i vasi, pei quali passa il sugo dei nervi. e gli spermatici de' testicoli, quei, che il LEEU-VENOECKIO (a) scriffe di aver offervati di un diametro minore del diametro del globo rosso. anzi 200000, volte minori di un pelo, certamente ci possono determinare a credere, che tali arterie linfatiche facciano un particolar fistema di vasi nel corpo animale: le injezioni passano in vasi del periostio, della pleura, del peritoneo, del cervello, ec., che prima non fi vedevano, e nelle infiammazioni di esse parti divengono ancor più visibili.

In prova dell' error di luogo, 53. Abbiam vari sperimenti ( continua il BOERAAVE ) che dalle arterie sanguigne abbia

po-

<sup>(</sup>a) Nel suo libro intitolato: Arcana natura detesta, stampato colle altre opere del Leeuvenoech a Leiden 1722, in 4

botuto passare nelle vene linfatiche la materia delle injezioni, e in alcuni cadaveri è stata trovata rossa, e sanguigna la linfa dentro queste vene: sonvi esempi di sudore, e di orina fanguigna per femplice, come dicono, deofculazione de' vafi, come a un di presso esce il sangue de' mestrui dalle arterie dell' utero ne' dati tempi: l'acqua del pericardio è rossa, sanguigna negli animali morti per un violento corfo: dopo le gravi infiammazioni del cervello, de' polmoni, o di alcuno de' visceri dell' addomine, si trovano acque rossigne nelle cavità: infine la midolla è roffigna nelle infiammazioni delle offa: dunque il fangue ha una grande facilità di passare oltre i termini dei vafi propri, e perciò egli conchiudeva. che nelle arterie linfatiche potesse alcuna volta paffare il fangue oltre l'ordine naturale, dove poi arrestandosi facesse la ostruzione, dalla quale, cresciuto lo stimolo della forza vitale, dovesse dipendere la infiammazione, essendo indefinibili. e tenuissime le divisioni delle arterie sanguigne, onde nella ultima loro ferie possano produrre tali arterie veramente linfatiche (a).

54. Ma, quantunque fi anmettesse la esistenza di tali vast, non sembra egualmente provato, che in essi possi alcuna volta passare il globo rosso del sangue; imperciocche, quanto è maggiore la distanza de canali, dat cuore, se dimi-

Ragioni contro l'error di luogo.

<sup>(</sup>a) Quefia reoria Boeravviana dell'infammarione fembra poco differente da quella dell'antichifimo Anatomico Erasistratto, il quale, al dir di CELSO (pref. lib. 1. de Medicina pag. 4.) pretendeva, che nelle inflammarioni fungui in eas venus, qua fipitui accommodatae funt (gioè nelle arterie) transfundius, vinflammationem, quam Graci phlegmonem nominans, exitits.

diminuendo la velocità del fluido, che vi fi muove dentro, non pare, che sì facilmente que tenuissimi vasi potrebbono ammettere, nè contenere in tanta copia un umor sì tenace, crasso, e pesante.

Contro l'efiftenza delle arterie linfatiche. 55. La îtestă facilită, colla quale il fangue può passare pei condotti secretori (53), c' induce a credere, che non vi sa tra quelle bocche, e l'estremità arteriose sanguigne frapporto un altro sistema di arterie linfatiche; e se pure queste vi si trovassero, non potremmo dire, che il sangue potesse con eguale sacilità feorrere destro delle medesse, e iempirle per la loro lunghezza; imperciocchè esso dovrebbe piuttosto artestaria ne' loro principi, o romperle, quanto poco in este avanzasse.

56. La linfa fanguigna trovata nelle vene linfatishe (53) era flata afforbita dalle cavità, e dalle cellule, come si afforbe nell'ecchimof. L' ANTRUC (a) trovò rossigna la linfa delle vene linfatiche in un cane morto flagellato. Che dalla cellulosa principalmente nascano le vene linfatiche, è stato dimostrato da MONRO il si-gliuolo (b): e che il sangue si travasi nelle cellule, il dimostreremo qui sotto (58. ad 62.)

57. Il microscopio ci fa vedere, che quanto più sono feparati i globi del sangue, meno rossi appajono, e pellucidi sono i vasi, che così separati, e solitari li contengono, donde sembra molto più probabile, che que vasi sanguigni, i quali nuovamente si vedono per le instammaziani (44. 52.), siano piuttosto tali

<sup>(</sup>a) Traité des tumeurs, & des ulceres. Tom. 1. pag, 34. à Paris 1759. in 12. (b) In una sua Differtazione intitolata: De venis

lymphaticis valvulosis, & earum poisssum origine. Be-

arterie, le quali allora più denfi, e più copiofi portano i globi finiti dallo fitimolo (bbid.);
tali debbono effere quelle, che fanno il fubitaneo roffore della faccia per le passioni dell'
animo, pel vomito, pel violento corso, e simili: coll' occhio femplice fulle natatope, e ful
mesenterio delle ranocchie, e fulla coda dei
pesci non si diffinguono vasi sanguigni, i quali
si vedono col microscopio, e questi tanto più
appajono, quanto più è irritato l' animale, e
più velocemente scorre il sangue, sicchè si accumulino, e si addensino i globi rossi gui
cogli altri; perchè dalla maggiore loro densità se ne sa più intenso il colore, come appunto nelle infammazioni.

58. GALENO nel cap. 2, del lib. XIV. del metodo di medicare (crifie: Se ff au un taglio fopra una parte, ove fiavi un flemmone, fi vede,
che il molto fangue, che n'efce, sembra sparso,
e trattenuto, come l'acqua in una spugna; e
ful fine dello stesso oa gagiugne, che nelle
infiammazioni tutte le parti si riempiono di sangue, il quale trassuda dai vassi a traverso le loro
tonache, che poi come una rugiada si dilata,
e si spande in ogni parte della carne (a); e
sappiamo, che GALENO cogli antichi intendeva
per carne principalmente la tunica cellulosa.

59. Quefto spandimento del sangue nella cellulosa è stato dimostrato dal celebre ALLERO, cioè ei vide nelle infammazioni degl'intessini, del ventricolo, del mesenterio, della vessicichetta del fiele, che il sangue sparso nella ecilulosa rappresenta ramicelli, i quali accompagnano i Argomenti comprovanri, che nelle infiammazioni il fangue fi travafa nella cellulofa.

<sup>(</sup>a) GALENO ripere la ftessa cosa nel lib. x.cap. 6. della ftessa Opera del Metodo di medicare, e nel lib. z. cap. 1. ad GLAUCONEM, come pure in altri luoghi delle molte sue Opere.

vasi stessi, dai quali doveva aver trasudato (a). Se si guarda un dito infiammato, egli è tutto rosso, come se sosse un panno inzuppato in una tuntura rossa, e non si distinguono i lati, e le distanze de vasi: alcune volte sul globo stesso dell'occhio si vedono sossano sosse sul proportioni dell'acchio si vedono sossano sosse sul proportioni dell'acchio si vedono si vedon

spugnose piene zeppe di sangue.

60. Che per l'estremità de' vasi sanguigni. anzi per le loro pareti possa trapelare la parte rossa del fangue, ce lo dimostrano ancor più quelle strisce rosse sanguigne con ecchimosi, che alcune volte si trovano contro le pareti delle maggiori arterie nelle infiammazioni del petto. e dell'addomine. Non di rado, facendo fervente, e con forza la injezione per un tronco arteriofo, fi trovano attorno le fue pareti esterne grumi di cera sparsi nella cellulosa, la qual cera ha dovuto trapelare pei pori delle stesse pareti, Il TEICHMEYER ha descritto un' aneurisina anomala (b) fatta dalla trasudazione del sangue con perfetta integrità dell' arteria pei pori di essa, il quale si era accumulato, e condensato attorno della medefima.

Sentimento dell'Autore cuca quel travafamento. 61. Come lo posso afficurarvi per le mie proprie osservazioni esser verifisme, e assai frequenti le rapportate dall' ALLERO (59. 60.), non saprei però determinare, se tale spandimento del sangue nella cellulare sia la vera causa congiunta. o l'effectto della infiammazione giunta al grado di produrre la suppurazione, o la cana

crena,

<sup>(</sup>a) Vedaſi nella Raccolta delle Oper minori di quefio dottifimo Svizzero tom. 3. pag. 349. l' offervazione 53. degli Opufoli patologizi. Vedanſi pure le pag. 37., e 116. del tom. 1. della ſua grande Fiſologia.

<sup>(</sup>b) Nella Dissertazione, che ha per titolo: De supendo aneurysmate brachii feliciter per operationem curato, Jenæ 1734. in 4.

erena, massimamente che allora tali spandimenti fi trovano maggiori. Non vediamo noi spanderfi a questo modo il sangue negli scorbutici, nelle suggellazioni, e nell' ecchimosi, fenza aver

sono il calore, il rossore, il dolore, la pulsazione della parte, che dicefi infiammata (44); sopravviene la febbre, se non ha anteceduto. ed altri vari fintomi inforgono, fecondo le parti, che sono infiammate, questi altro non essendo, se non se i modi viziati delle azioni,

a cui le parti infiammate servono.

63. Le sue cagioni sono esterne od interne : queste sono la pletora, il sangue crasso. viscido, tenace, o troppo rarefatto, o mosso con troppo impeto, perchè le forze della natura fiano per se stesse violente, o altrimenti irritate, ficche i vasi vengano troppo riempiuti, e sfiancati da quelle forze, che violentemente lo fpingono, o per la cattiva qualità degli mnori acre, falina, biliofa, deleteria, che ferve essa stessa di stimolo, e d' irritamento, onde in alcun luogo fi faccia il raccoglimento del fangue.

64. Le cagioni esterne (63) sono tutte quelle Esterne. cose, che possono ugualmente accrescere l'azione dei liquidi, o dei folidi, o di amendue infieme, come il troppo calore, l'eccessivo moto, il freddo acre, le applicazioni dei rimedi astringenti, le violente fregagioni, i corpi estra-

nei infiffi in qualche parte, e infine tutto ciò, che può premere, distrarre, storcere, rompere, ammaccare, crifpare, abbruciare, rodere l'estremità de' vasi, sicchè il sangue non posta più liberamente pastare, e conseguentemente, come dicemino (63), si faccia il raccoglimento, o la flussione del sangue: per la

preceduta infiammazione? 62. I fintomi dunque della infiammazione Sintomi ge-

nerali dell' infiammazio-

Cause fiammati .

qual

qual cofa allora la forza vitale, e l' irritabilità crescendo contro l'ostacolo, i prossimi vasi debbano dilatarfi, quivi farfi maggiore l'impeto, e la copia dell'umore, ed in tal modo produrfi un tumore di maggiore, o minor maffa, e volume, fecondo la maggiore, o minore quantità dello stesso umore ivi spinto; ma però i tumori infiammatori sono sempre gli stessi in genere, e solamente pel loro diverso mode di procedere, e per le diverse parti, che occupano. se ne sono fatti i diversi generi, e loro dati i diversi nomi. Noi li ridurremo a due ordini generali, che fono i flemmonosi, e gli erisipelatosi, ai quali ne aggiungeremo due altri, uno degli afcessi, e l'altro della cancrena. perchè queste terminazioni sono assai frequenti ne' tumori infiammati . Ogni ordine farà diviso in diversi paragrafi, che corrisponderanno ai diverfi generi di questi tumori.



## DEI TUMORI CALDI

ORDINE PRIMO,

Che tratta dei tumori flemmonosi

65. I tumori stemmonosi delle parti esterne che di questi soli intendiamo di parlare ) hanno la loro sede nel tessito cellulare sottocutaneo, e delle altre parti ancor più prosonde, e comprendono fotto di se il stemmone, il bubone, l'angina, l'infiammazione delle mammette, il suroncolo, e altri subercali, il panereccio, l'outamia, l'orquiblo, ecc.

### Del Flemmone.

## §. I.

66. Il flemmone (a) è un tumore più, o meno largo, e profondo, con colore rosso intenso, lucido però, e risplendente, che appena svanise col tatto, con durezza renitente,
con dolor sisso, forte, continuo, e pulseggiante,

Definizione del flantmone.

<sup>(</sup>a) La parola Greca fegmone fignifica incendio, andore, e i Latini, come giá fi è veduto dal paffo poc anzi addotto di Criso, hanno tradotto quelho vocabolo con quello d'inflammatio. Si è poi dato particolarmente tal nome al tumve inflammato, e circo-feritto deferitto in quelho paragrafo, lafciato quello di floggisi all'inflammatione in generale; la parola flegmone viene dal verbo flegmaintin; effere inflammatio, e

giante, infine con calore fecco. Secondo la grandezza maggiore, o minore del morbo evvi quafi fempre congiunta una proporzionata f.bbre con polfo duro, e frequente, colla lingua fecca, calor universale, ec., imperciocchè la forza della vita è follecitata a maggiori azioni, è irritata, e perturbata dallo fimolo, da cui dipende la infiammazione, come abbiamo dimostrato parlando de' tumori instammati in ge-

erifipciatofo.

nerale ( 44., e feg. ) 67. Il flemmone (66) è stato diviso in erifipelatofo, in edematofo, e in feirrofo. L' erifipelatofo non è guari differente dalla rifipola Remmonosa, solamente come si dee dire risipola flemmonosa (166), quando vi è più di affezione erifipelatofa , che flemmonofa , così fi dirà flemmone erifipelatofo, quando vi è più di flemmone, che di Asipola; sicche bisogna sempre in fimili casi combinare i segni di amendue le malattie infieme, è come eccedono questi, o quelli loro dare l'uno, o l'altro nome.

Edematofo.

68. Il flemmone edematofo (67) è quello, che accade o ad una parte, che prima già fosse edematosa, senza però, che i sintomi dell' edema, cioè la mollezza, il pallore, indizi d'un inzuppamento linfatico, svaniscano affatto, oppure il flemmone, e l'edema inforgono nello stesso tempo; ed anche in questo ca- . so l'eccesso de' sintomi dell' una, o dell' altra malattia ci defermineranno a chiamare il tumore o flemmone edematofo, o edema flemmonoso. 69. Il flemmone scirroso (67) non può mai

Scirrofo;

effere, se non come accidente dello sciero, per le ragioni, che ivi accenneremo (452). 70. I fegni del flemmone sono gli stessi suoi Segni, e loro fpiegacaratteri, che abbiamo riportati nella defini-

zione (66).

IL

vasi della parte, ed ancor più per l'umore.

sparso nella cellulosa ( 58. 6 seg. )

A Il cotore è rosso initasso, perchè ne' menomi vasi sanguigni sono spini con forza, ed in gran copia i globi rossi del sangue, il quale i maggiori vasi ha già eccessivamente riempiuti (65): la parte tutta si colora, come una sipugna inzuppata di un liquor rosso, perchè lo stesso sangue si depone nel tessuo perchè dischednossi i canali, e la cute, si attenua la loro spessera, quel colore si fa lucido, e rispiendente, che appena svanisce per la compressione, non potendosi dividere affatto l'onda del sangue per la somma tensone, e pienezza de vasi:

y La duretta remitente è prodotta dalla maggior tenfione de' folidi, e dalla maggior maffa ; e muovimento de' liquidi: l' arco più tefo, e la vefcica più piena d' aria hanno maggior grado di elafficità; ancor più dunque le parti animali, che fono irritabil, e fi rifentono d' ogni

preffione.

de Il dolore è forte, fiffo, continuo, e pulfeggiante, perchè i nervi della parte fono violentemente diffefi per tutta la lunghezza del tumore, compreffi, ed angufitati, e come hanno una quantità, ed un' modo d'azioni pel muovimento, pel fenfo, e pel piacere, l'ecceffo a quel modo, e a quella quantità produce in quefto cafo il dolore: dalla pulfaçione ne nasce un certo fenfo fastidioso, che va sino al dolore, perchè è straordinaria alla parte; e perchè continuamente fecuote i nervicelli; ma quella pulfaçione segue il ritmo del polfo, nuova pruova evidentifima, che l'infammazione dipende principalmente dalla forza solleciata della vita, supposto anche, che l'offrazione fiane stata la cagione occasionale ( 43. 40. 50?

Del calore

51. ) s Il calore procede dalla maggiore ottillazione de' vafi, e dal maggior muovimento de' liquidi , come le fregagioni riscaldano le parti: egli è secco, perchè è troppo tenue ciò, che s' evapora, e l' onda precipitosa dei liquidi quasi tutto trasporta; ed essendo da quell'eccesso, e perturbazione de' folidi, e de' liquidi afforti gli umori, la lingua rimane secca, perchè si fa minor secrezione di liquor salivale: le orine sono rossigne, e tenui, perchè alcuni globi rossi sono stati rapiti colla facile secrezione del siero urinoso per le aperte papille dei reni; oppure esse vengono acquose, tosto che il malato abbia bevuto, fegno che il liquido non ha potuto pel rapido muovimento, e per la tenacità del sangue mescolarsi con esso, il che dimostra un maggior grado d' infiammazione .

ξ Ouanto questa è maggiore, tanto più spesso, e tenace si fa il sangue, e più tenacemente fi coagula, appare più nero, e forma nella superficie una cotenna spessa, bianca, giallognola, verdeggiante; perchè fotto la contimua violenta pressione de vasi non possono non . addenfarsi i globi rossi del sangue, e con esso il fiero, e gli altri umori. Per la qual cofa mel maggior fervore dell' infiammazione quasi tutte le fecrezioni fono diminuite, o foppreffe, nè si riaprono, o eccedono, se non per qualche terminazione imminente di risoluzione, di Suppurazione, di retrocessione, o di mortificazione. Avverrà il delirio, se il sangue si porta con impeto al capo, o un' affezione soporosa, fe colla troppa copia lo aggrava. La respirazione si farà difficile, anelante, e frequente, se esso sangue col troppo moto, o colla troppa copia offende i polmoni (21).

71. Le cagioni del flemmone possono essere Cagioni. tutte quelle, che abbiamo accennate de' tumori infiammati in generale ( 64.65. ): il pronoflico buono, o cattivo fi trarrà dalla maggiore, o minore delicatezza di struttura, ed uso della parte, dalla grandezza del tumore, dalla veemenza de' fintomi, dalle forze, e dal temperamento del malato, e finalmente dalle cagioni esterne, od interne, che l'hanno potuto produrre: così è più facile a guarirsi quello, che è stato prodotto da un fangue, che pecca folamente in quantità, ed in moto, in un foggetto giovane, e forte, quello, che non ha gravi fintomi, nè è troppo grande, e trovafi in parte men nobile, e di più robusta tessitura: i contrarj fanno la maggior gravezza del morbo, per cui si abbia ad annunziare il pronostico di pericolo, o di morte.

72. Abbiamo già dimostrato parlando de' tumori in generale, come alcune volte fi avanzane alla cancrena i tumori infiammatori, e con quai fintomi (22): un pessimo segno egli è, quando, l'ardore interno effendo grandiffimo, le parti esterne sentonsi fredde; che allora vi è sommo pericolo di mortificazione. Imperciocchè come l'ardore interno denota una violenta interna infiammazione, la quale per qualche tempo, mercè l'eccesso del muovimento, ha prodotto lo stesso ardore alle parti, esterne, se queste cominciano a sentir meno il calore, e divengono finalmente fredde, egli è segno. che le forze della vita fi fanno deboli in modo, che, quantunque follecitate dalla materia irritante. Conciossiachè tale effetto non si osserva quafi mai se non ne' flemmoni maligni ), pure non può il muovimento effere continuato fino alle esterne parti; e in questa maniera lo stimolo, che faceva il morbo, continuamente

BERTRANDI TUM. TOM, I.

Segni della proffima mortificatios

diminuendofi, finalmente ceffa in ogni parté; e ne accade la morte.

Flemmone Juffocativo.

73. Sonvi flemmoni, che con furore si producono, e fi avanzano, minaccianti da principio cancrena, e chiamanfi suffocativi.

Cura interna del flommone .

74. La cura del flemmone dee farsi, moderando prima il troppo muovimento degli umori, nè vi è rimedio più efficace della cavata di sangue, la quale si farà, e si ripeterà nel principio più, o meno abbondante, così pure nell' aumento del tumore secondo la veemenza del morbo, l'età, e le forze del malato. La dieta, e i rimedi interni faranno quegli stessi, che proporremo per la risipola benigna (167). Se il fangue fosse cacochimico, si somministreranno i più propri per la cacochimia, che vi potrebbe essere, come gli antiscorbutici, se vi fosse il vizio di scorbuto (a), o quelli, che commenderemo per la risipola maligna (170), quando gli umori fossero acri, biliosi, e putrefacienti. In questi casi dobbiamo esfere - più cauti nel cavar fangue, perchè non fi produca anaggiore scioglimento, e putrefazione, ed ancor più per evitare la retrocessione, che tanto più facilmente può accadere, quanto più liberi fi rendono i vafi.

75. Quando il flemmone fosse prodotto da un sangue puro, e il tumore fosse piccolo, e nel fuo principio, gli antichi, e anche non pochi de' moderni raccomandano l'uso de' topici ripercussivi, come l'ossicrato, le decozioni di Percufferi. balaustre, di scorze di pomi granati, di rose roffe, il fugo di femprevivo, e fimili, co'quali wogliono, che si facciano fomentazioni anco fredde .

<sup>(</sup>a) Vedasi nel Tratt, delle ulcere il cap. delle ulcere Colparient .

fredde, oppure cataplasmi, mescolandovi bola d' Armenia, terra cimolia, sangue di drago, pietra ematite, bacche di mirtillo, fcorze di pomi granati, balaustre, sandali rossi, e simili polverizzati.

76. Io non faprei raccomandare tali timedi (75), i quali, quantunque alcuna volta poffano corroborando i vafi, ripercuotere, e risolvere la materia, possono parimenti addenfarla maggiormente, e fiffarla nella parte, ficchè il tumore si faccia scirroso; oppure, crescendo l'impeto interno, quivi potrebbe prodursi la cancrena ( 238. 239. ) Imperciocche fe i rimedi interni (74) non fedano i muovimenti del fangue, e non temperano la forza della vita cost toftamente, il flemmone, che è piccolo, per quegli stessi muovimenti, che continuano, dovendo ampliarfi, l' impedirlo non può se non esser dannoso, dovendosi allora confiderare come critico (5).

Perché non convengano ful pran-

77. Quando dunque fi avrà raccomandata Bensi i fi una dieta tenue, e rinfrescante, e l'uso de' solrenzi. rimedi interni attemperanti, antiflogifici, o altrimenti alteranti, fecondo la spezie di cacochimia, che vi potrebbe effere (74), alla parte si faranno lungo la giornata fomentazioni non troppo calde colla decozione di fiori di sambuco, di camomilla, di viole, oppure con quella di foglie di meliloto, di parietaria, di branca ursina, di acetosa, e simili; di notte poi vi si applicherà un cataplasma di farina di fave, di orobo, di lupini, e d'orzo, oppure di fegala, di fien greco, e di lenticchie, fatto colla decozione di quelle erbe, o fiori, le quali anche fi potrebbono mescolare colle stesse farine, ridotte che fossero in putrilaggine, e passate per le staccio, come il seguente :

R. Flor. Jambuc., camamul., violar. a pug. ij; form. melilor, parietar. a manip. ij: coquantur ad putrilagimen, & per cribrum trajiciantur, addendo farin. fabar., ficael. a lib. fs. cum decoll. f. catapla/ma.

Quando fi debbano ufare i maeuranti-

78. Ma se si osfervasse, che l'umore per la fua tenæcià non potesse risolversi, anzi che aggravasse sempre più la parte col suo impeto, e colla sua copia, onde il tumore crescesse, e colla fua copia, onde il tumore crescesse, e se si facesse più caldo, converrebbe allora tentarne la suppurazione, facendo di giorno le fomentazioni con decozione di foglie, e di radici d'attea, di parietaria, di bieta, di mercorella, di asparagi, di verbasso, è simili: la notte poi vi si applicherebbe il seguente catapassama:

R. Radic., & folior. althaæ a manip. ss., femin. lin., & fanugrae. a drachm. vj., flor. camamel., & melilot. pulverat. a drachm. ij., farin. hord., & tritic. a unc. vj. f. cataplasma addendo mell. commun. unc. ij.

Oppure

"N. Radic, atth., lilior, albor, a unc. ij, folior, malv., bijmalv., mercurial., verbafc., parietar., violar, a manip. fs., flor. camamel., melilot. a pug. ij: coquantur adpurtilaginem cum f.q. aq. commun.; per cribrum trajiciantur, addendo ung. atth. unc. ij.

La mollica di pane cotta col latte, o con una forte decozione di piante emollienti, a cui fi aggiungano tuorii d'uova, e qualche poco di zafferano, fa un cataplassima maturante assai efficace.

Quando gli 79. Alcune volte il dolore, e l'ardore della parte sono così forti, che vi abbisognano gli

anodini non folamente esterni, ma anche interni, e gioverebbe in simil caso il seguente cataplasma:

Rl. Folior, visc., hyosciam. a manip. ij, flor. papaver. manip. is., pom. dulc. n. j, coque in s. q. ladis vaccini, per cribrum trajiciantur, & cum unc. vj medulla panis albi s. cataplassa. addendo vitell. ovor. n. ij, putver. croci drachm. j.

80. Quando per la tenacità dell' umore, e per la refiftenza della parte, come nelle foflanze ghiandolofe (100), difficilmente fi poteffe promuovere la fuppurazione, converrebbe applicare quest' altro cataplafma:

Quando i maturanti più forti

R). Radic. lilior. albor. unc. iij, capar. fub cineribus codlar. unc. ij, fummiat. alth. manip. ij, caric. ping. toft. n. vj: caric. ping. toft. n. vj: coque, & contunde: adde farin. trilic., & femin. lin. a unc. ij., axung. porcin.unc.ij, ung. bafilic. fimpl. unc. fs., cum vitello ovi, & croc. gr. vj
f. f. a. cataplafma.

81. Come i Cerusici sono talvolta accusati a torto di aver tratto alla suppurazione un stemmone, il quale pareva, che avrebbe dovuto risolversi, così altre volte meriterebbero di esferio, per aver reso maggiore un stemmone, tentandone la risoluzione, quando da principio doveano determinarsi per la suppurazione. La risoluzione è indicata (16), quando il stemmone non è molto grande, ed è prodotto da un sangue, che pecca solamente in quantità, ed in moto je ed anche in questi casi, se si osserva

Quali fiano
i fegni indicanti la rifolutione, e
quali la fuppuratione,

che i rimedi interni antiflogifici, nè i rifoliventi esterni non impediscono in un certo tempo il progresso del tumore, che esso anzi con prestezza cresce, e l'umore ne rende tutta la massa renitente, e piena, che niente assattocede, rimanendo in issuo per qualche tempo, che il martellamento piuttosso aumenta, che diminuire, dessa allora non perder più tempo,

Qualche
wolta quelle
serminazioni
secadono
inaspettatae
mente.

e proccurarne la fuppurazione (17).

81. Ma se non si può negare, che i rimedi prescelti possano promuovere piutrosso l' una, che l'altra terminazione (81); osserveree però in pratica, che non di rado l' una, o l'altra inaspettatamente ascade, sicchè non se ne possa promettere alcuna sicuramente. Quante volte suppura un tumore, quando, secondo l' apparente indicazione, i più efficaci rimedi si applicano per la rijoluzione l' E viceversa quante volte si vedono risolvere tumori, de' quali si tentava la suppurazione? Ciò dipende da un cangiamento d'umeri, da una forza de' vasi per certi muovimenti spontanei, a' quali non così facilmente possamo comandare.

Cura del flemmone erifipelatofo, e dell' edematofo, Tacilimente politamo comandare.

83, il flummone erificialos[0(7)] fi dee curare come la rifipola benigna flummono[a (168); per l'ademarofo (68) convengono timedi, che abbiano maggiore attività per ificiogliere; e perciò fi preferiranno le fomentazioni fatte colla decozione di fiori di camonilla, delle fommità d'affenzio, di maggiorana, e fimili. Alcuni fanno ufo del lifivio, o dell'acqua di calce, a cui aggiungono spirito di vino femplice, o canforato, fat ammoniaco, fat gemma, o fat nitro, perchè meglio fi possa flemperare l'inzuppamento fierolos fi usano pure i cataplaqui fatti colle quattro farine rifolventi, e coll'osficrato, o col mosso; ma i timedi fi denon pratigare più, o meno attivi, secondo che per la

natura de' fintomi il tumore parrà piuttofto flemmone edematofo, che un edema flemmonofo, come meglio avvertiremo parlando dell' edema .

84. Quando fi scorge, che la materia del Rimedi inflemmone è in muovimento di risolazione, perche già il tumore diminuisce (16), conviene usari, quanallora fomministrare qualche purgante, come la polpa di tamarindi, la manna, la caffia, l'elet- folve, tuario lenitivo, il diapruno, o fimili in bolo, o sciolti in una infusione di senna, o di rabbarbaro, secondo che parrà necessaria maggiore, o minore purgagione. Convengono anche i leggieri diaforețici , come l'infusione di thé . una leggiere ebullizione di fiori di papaveri rossi, o una leggier decozione di radice di bardana . Se la risoluzione si facesse lentamente , quantunque i fintomi della infiammazione (62) fossero non poco diminuiti, potrebbono giovare allora alcuni de' repercussivi sovrannominati (75), per vincere con essi l'inerzia de'liquori flagnanti, che altrimenti non si muoverebbero.

85. I flemmoni suffocativi minacciano, come Sintomi del dicemmo (73), piuttofto la cancrena, che la ri- flemmone sufsoluzione, o la suppurazione. L' ardore, la tensione, il martellamento sono egualmente fora ti, ed intenfi in tutta l'estensione, e profondità del tumore, il colore è d'un rosso intenfo, molto più lucido ( 70. 73. ); vi è inol-

tre sempre congiunta un' ardentissima febbre. fete, vigilie, e qualche volta la convulsione. 86. Se il mmore è in parti aponeurotiche, e Offervazio-

tendinose, soffre il malato profondamente uno stiramento, e un senso di lacerazione veemen- parti affette, e continuo, ed allora quantunque il tumore fia teso, e renitente nella superficie, in alcuni luoghi però si sente col tatto una certa vacuità, ove, se si taglia, come si dee tagliare, per togliere le strangolamento, poca, o niuna sup-

do il flemmone ii ri-

focativo.

purațione vi fi trova, ma molto fangue nero; e putrido, travafato nella foftanza cellulofa tra gli interfizi; dei mufcoli, i quali alcuna volta fi trovano esti stesti fosfocati, e cancenati, quantunque la cancena non ancora appariste agli integumenti. In un flemmone di questa spezio alla gamba trovai lembi di aponeurosi laceri, e sciolti, inspessati però, i quali diffecati erano tutti ripieni di vasi turgidi di fangue, che mai non vidi così bella injețcione.

87. In queste profonde infiammazioni il periosito stesso accume volte s'insiamma, sente il malato un acutissimo dolore, come dicest, ostecopo, e per lo più succedono le convulcioni, ed il delirio: il periossito piuttosso si caraca, che suppurare, ed all'apertura del umore coll'accennato guastamento de' muscoli (86) trovasi l'osso in alcuna parte scoperto. Vedete simili esempi nel V. Tomo delle Difutazioni Cerusche raccolte dall'ALLERO pag. 542. (a).

Cura interna di questo fempione, 88. Le cavate di fangue si deono fare più abbondanti, e ripetere in più breve tempo (74): i diluenti, e gli antisfogissici interni si sominisfireranno in maggior copia (77); dappoichd il corso di questa malattia è così veloce, che spesso al cancrena inaspettatamente accade, effendo le parti organiche pel violento impeto interno celeramente portate al termine come della loro tensione, così anche a quello della loro coessone; conciossiache queste forze non possone.

<sup>(</sup>a) Nell'edizione di Napoli trovanfi nel tom. x. page 100, e feg. le differtazioni, nelle quali 'questi efempi sono rapportati, sono una di Gioanni Herselle, ch' è intitolata Historia brachii pratumidi, e l'altra di Alessandro Camerario intitolata Historia pedis temidi.

possono non accompagnarsi sino al medesimo punto estremo, in cui debbano finire. Chepperò quanto più cresce la durezza, e la renitenza del tumore, tanto più cresce il pericolo della rottura, e dello scomponimento delle parti organiche, e dello spargimento degli umori; cessa infine ogni azione, e la cancrena è già

89. Riguardo alla cura esterna, tosto che in Cura esteralcuna parte mollezza, e vacuo fi fente, quivi na da farfi fi dee incidere; e come nelle ferite, e nelle contusioni non si può meglio impedire il flemmone suffocativo, e la cancrena, che colle ampie dilatazioni (a), egualmente in questo caso, quantunque la cagione fosse tutta interna; concioffiache il modo dell'affezione locale fia lo stesso, tanto più se la cagione interna fosse in qualche modo maligna, come dimostreremo parlando del carboncello ( 177. e feg. ), e della cancrena (240).

90. In questo stato di flemmone convengono Co' rimedi fomentazioni, o cataplasmi fatti colle radici di angelica, aristolochia, imperatoria, brionia, iride fiorentina ec., coll' abrotano, affenzio, betonica, maggiorana, marrubio, menta, origano, pulegio, rosmarino, ruta, falvia, scordio, serpillo . lavanda , tanaceto , e simili ; le quali erbe, o radici cotte, e macerate nell' officrato

<sup>(</sup>b) Vedete il Trattato delle ferite. Notifi però, che l'Autore già non intende, che si facciano le ampie, e profonde scarificazioni solamente ne' casi, ove sentest in alcuna parte mollezza, e vacuo, ma anche ogni qual volta è talmente tesa, ed infiammata la parte, che il pericolo della soffocazione è imminente; questo suo precetto, quantunque qui non abbastanza spiegato, si raccoglie da molti luoghi di questo desso Trattato, e degli altri, che seguiranno,

si possono applicare calde inchiuse in sacchetti, aggiungendovi sale ammoniaco, o nitro, se la sussociacione è siù prossima.

## Del Bubone

## C. II.

Definizione del bubone. 91. Il bubone è il tumore di alcuna ghiandola, ma principalmente di quelle, che gli
Antichi chiamarono emuntori del cervello, del
cuore, e del fegato, cioè le parotidi, le fortoalfetlari, e le inguinati (38): bubon in greco
propriamente fignifica l'anguinaglia, e perciò
bubone dicevafi anticamente foltanto il tumore
delle ghiandole, che quivi fi trovano (a). GALENO fu il primo, che chiamò bubone il mimore di ogni qualunque altra ghiandola (b).

Distinzione in 92. I buboni sono o inflammati flemmonos, o erisspelatosi, oppure sono seirose con magiore, o minor durezza: gli uni, e gli altri possono possono estere benigni, o maligni, o anche pestilenziali.

Buboni benigni, 93. I benigni fono quelli, che non procedono da alcuna caecchimia, come il gonfiamento delle ghiandole inguinali nella prima pubertà, per gli sforzi del parto, pel camminare flentato, o per altra cagione efferna: conì alcune volte gonfiano le ghiandole fottoma scellari pel caldo, o pel freddo, e quetti sono sempre più, o meno infammati.

94. I

(b) Method, medend, lib. XIII. cap. 5.

<sup>(</sup>a) Epperciò Cesso chiama il bubone inguen, come apparifice dal feguente passo, e da altri ancora: se mulieri ex inguine sebricula ora est (lib. 2. cap. 7. pag. 60. ). Il nostro volgo, e gli stessi unoni Scrittori Tosteni il chiamanto anguinata.

As. I maligni possono esfere critici, o fin- Maligni; somatici, come la parotide, che suole gonfiare nel tempo, o dopo alcune malattie acute; e in questi cafi la cagione congiunta del bubone sempre dipende dalla slussione di un umore di cattiva natura.

95. I pestilenziali sono quelli, che accadono Pestilenziain tempo di peste, e tanto questi, che i ma- li, ligni (94) sono pure ben sovente infiammatori: le parotidi ( ibid. ) fono alcune volte persino

suffocative.

96. Mettonfi anche nella classe de' maligni Venerei, e (94), e inoltre sono contagiosi quelli, che procedono da un commercio impuro, o da lue celtica altrimenti comunicata, e questi, che diconfi venerei, di rado fono infiammatori.

97. Evvi una cacochimia linfatica, che il si- Strumosi. stema glandoloso più, o meno offende, le parotidi, le ghiandole fottoascellari, e quelle del collo principalmente inzuppando, ed allora que' buboni scrofole, o strume si appellano: essi anche di rado fono infiammatori, ma di così difficile guarigione, che tra i maligni (94) si posiono comprendere.

98. I buboni benigni infiammatori hanno gli stessi segni del flemmone (66), o della risipola benigna (158): il luogo folo ne fa la differenza, onde fi debbono trattare cogli stessi rimedi, e

colle steffe cautele ( 74. ad 90. )

99. I maligni eritici, o sintomatici (94) debbonsi sempre trarre alla suppurazione, per togliere dal sangue quella materia di cattiva qualità. Siffatti buboni crescono per lo più in poco tempo, e con impeto, quantunque non abbiano sempre la stessa intensità d' infiammazione, la quale qualche volta è eccessiva, e minacciante suffocazione come abbiamo già accennato del gonfiamento delle parondi (95).

Segni, e cura de' beni-

De' mali-

Cara d

100. I buboni critici alcune volte non avanzano a quella pienezza, che recherebbe maggior vantaggio; conviene allora ufare fomentazioni emollienti, e un poco irritanti, come quelle fatte colla decozione di radici di altea, e di giglj bianchi, o delle foglie di taffo barbaffo, e di parietaria coll'aggiunta delle radici di brionia. Alcuni fogliono applicare fopra it tumore una coppetta con molto fuoco, e firapparla per ifcuotere i vafi, e attrare gli umori: giovano altresì i cataplafmi più, o meno acri, e fiimolanti, fecondo che fi feorge maggiore, o minor inerzia degli umori, come il feguente:

R. Radic. tilior. albor., capar., bryon. fub cinerib. calid. affacar. a unc. fs., ferment. pan.unc. ij gumm. fagapen. unc. fs., cum vitello ovi f. catapl.

vi si possono anche aggiungere i fichi secchi pingui, il mele, il sapone, il croco, o altre giomne, come l'ammoniace, il bdeglio, l'opoponace, ec.

Tot. Alcune volte, quando vi fi fcorge una refistenza, e turgidezza, fenza che i fintomi fieno gravi, possono bastare alcuni di que ca-taplassi suppuranti, che abbiamo proposti pel stammone (78), oppure l'empiastro diaquison con gomme, quello delle mucilagini risormati con olio di gigli bianchi, aggiungendovi pure sapone, croco, sterco di colombo, semi di senapa, di ortica, e simili secondo il bisogno, oppure

R). Capam magnam, excavetur, & impleatur eius cavitas theriaca; deinde papyro involuta coquatur sub cineribus calidis, & cum ol. scorpion. unc. s. f. cataplasma, addendo serment, veter, unc. j.

102. Ab-

Come debba apri-

re la paro-

tide fuppu-

102. Abbiamo avvertito, parlando de' tumori in generale ( 26. 33. ) quando, e come fi debbano aprire questi tumori ghiandolosi, suppurati che fono. La parotide suole aprirsi con un ferro rovente, che chiamano faetta di fuoco; perchè ella è una lamina di ferro piatta della figura di un cuore di carte da giuoco, continua ad angolo retto con un lungo manico, più o meno larga, lunga, ed acuta, secondo che fi vuole più, o meno penetrare, giusta il volume del eumore (a). Con questo strumento si fanno una, o più aperture in forma di T, a di croce. E quantunque alcune volte il tumore paja turgidiffimo, duro, e renitente, e non vi fiano fegni esterni di suppurazione, nulladimeno, se precedette quella febbre, e quella interna perturbazione, la quale dicemmo promuovere la suppurazione (17), la materia poi fi trova nel più profondo, quando colla faetta, col caustico, o col ferro maggiormente si avanzi dentro il tumore; e se vero pus non se ne vede uscire, molto sangue nericcio, fetente, o icorofo ne suole scaturire, essendosi già rotti i vafi, e fatto spandimento di umore per l'impeto, e per la copia, con cui vi era pervenuto.

103. I buboni critici, o fintomatici fattifi Cura de bat con impeto, e con molta infiammazione, se non uccidono il malato pel loro precipitofo enorme crescimento, colla mole stessa suffocandolo, evvi molto pericolo, che passino in cancrena (132) per la preffione, che fanno ai

boni Suffoces

<sup>(</sup>a) La fig. 5. della Tav. xvII. degli strumenti di Chir. rappresentati nel tom. 111. delle figure dell' Enciclopedia mostrerebbe assai bene la saetta qui descritta dall' Autore, se la lamina, che dee farsi ara roventare, ne folse più fottile, e più piatta,

Sogni della

104. Ma se la suppuracione non si muove, se il uumore senza crescere di volume si fa sempre più duro, se diminuiscono gli accidenti della inflammazione, e sopravviene un certo color fosco, e piombino, se le labbra delle incisioni diventano secche, o trasuda da esse una linfa rossigna, per lo più n'è vicina la cancerna, e di malato ne muore.

Cura de buboni duri, che difficilmente fuppurano.

105. Que' buboni cricici, che abbiamo detto creccere lentamente, e con leggieri fegni di infammazione (100), fe non fi hanno potuto trarre a suppurazione perfetta coi mezzi sovra indicati (ibid.), per lo più non terminano, fe non quando co' caussitici, e coi corrosovi fi seno consumati i duri globi ghiandolosi. Alcuni propongono di estirparli, la qual cosa ono sempre è possibile per ragione di luogo,

<sup>(</sup>a) Pare, che si otterrebbe più presto l'intento, si ny ece di applicare nelle scarificazioni il caustico, il quale sa un'elcara, che ritarda sempre più, o meno la sipopurazione, vi si applicassero a dirittura à digestiri seru, e animati.

e non fi dee fare per lo stato, in cui si trova il malato. Si possono almeno in simili casi separare, ed estirpare quelle porzioni globulari, che o dalla poca suppurazione fattasi, o dalla forza de corrossivi, e de caussici fossero già state in parte sciolte; il che talvolta anche si sa per una certa cancerna, che accade nel profondo del tumore, quantunque non appaja esternamente; ciò però suole solamente accadere nel principio, quando dura ancora il furore della malattia principale, di cui è eristi bubons. Dei rimedi interni non so parola, perchè decono effere diversi, e adattati al tempo, allo stato, e alla natura della malattia, per la quale sono nati i buboni.

106. I buboni pestilenziali sono quelli, che accadono in tempo di peste; sogliono per lo più occupare le glandule inguinali, e tendere sin da principio alla cancrena, la quale difficilmente si può impedire. Nella peste di Atene, descritta da TUCIDIDE (a), e da LUCREZIO CARO (b), la cancrena si estendeva sino alle parti genitali, delle quali motti restarono privi (c): Tali buboni di rado sono critici, quasi sempre satomatici; ed ecco le osservazioni, che ha fatto il Diemererrocce.

Segni de buboni pestilenziali

<sup>(</sup>e) Antichiffimo Storico Greco, contemporaneo d'IPPOCRATE, il quale ferifse la ftoria della guerra del Peloponnefo, nel libro fecondo della quale deferive con fomma energia la pefte di Atene accaduta in quegli fteffi tempi.

<sup>(</sup>b) De rerum natura lib. vi. vers. 1136., & seq. (c) Lucret. ibid. vers. 1204.

<sup>.....</sup> in nervos morbus, & artus

<sup>...</sup> Et graviter partim metuentes limina lette

<sup>,</sup> Vivebant ferro privati parte virili

quale vide una peste in Germania (a). » I tu » mori negli emuntori ( dic'egli (b) ) princi-» palmente quelli, che si elevavano nelle fau-» ci, e dietro le orecchie, se crescevano nello » spazio di 12., o di 24. ore, ed erano mol-» li, come tumori flatulenti con infiammazio-» ne, o fenza, erano fempre mortali, e tutti » i malati morivano, quantunque all' appari-» zione di que' tumori pareffe, che in qualche » modo foffero follevati. Allo 'ncontrario fe » nel principio erano duri, come tendini, ri-» gidi, e allungati, e se crescevano a poco a » poco con un tollerabile dolore, era piuttofto » di buon presagio, principalmente se, cre-» scendo, conservavano quella durezza. Ma se » que' buboni duri avevano un circolo di di-» versi colori a foggia d'iride, era indizio di » profilma morte, come pure, fe diventavano » rossi, lividi, o neri. Il pericolo era mino-» re, se i buboni prestamente suppuravano, ed » anche se a poco a poco, cessando la febbre, » fvanivano fenza fuppurazione.

I buboni pestilenziali sono per lo più accompagnati da carboncelli, come di questi parlando

faremo offervare (180).

Segni della peste, 107. Quantunque presso che tutte le pesti, di cui abbiamo le storie, dimostrino una dissoluzione purtida degli umori, i sintomi però non ne furono sempre gli stessi nè in quantità, nè in grado. Essi surono per lo più nausse, vomiti, itterizia, tremori, dolori di capo, sete intensissima, convulsioni, putride icorose dejezioni del ventre, flussi di sangue al naso, si:

(b) Nel suo Trattato de peste stampato per la prima yolta Arenaci 1644, in 4

<sup>(</sup>a) Cioè la peste di Nimega, che sacea orribile strage negli anni 1636., e 1637.

fudori freddi, toffi, anelito, difficoltà di respiro, finghiozzo, sternuto molesto, tumori nella gola, ficcità, raucedine, stralunamento degli occhi, fopore, prostrazione delle forze ec.

108. I rimedi interni fono i bezoardici, i diaforetici, e tutti gli antisettici. Alcuni vogliono, che il bubone si estirpi da principio, quando è ancor piccolo; la qual cofa non fi può sempre fare per ragione del luogo, e ancor meno si dovrebbe, se la materia fosse in muovimento, nè ancora forse terminata la sua

flussione alla parte.

109. Per attrarvela, e poscia evacuarla nella maggior quantità, che fia possibile, onde sgravarne il corpo, tutti gli Autori raccomandano di applicare ful bubone, quantunque non fosse ancora perfettamente suppurato, il caustico. Paolo BARBETTE nel fuo Trattato della pefte (a), ne propone la seguente cura : vuole, che ful tumore, comecche non sia ancor pervenuto a tutta la fua grandezza, s'incominci ad applicare un vescicante, e che, fatta la vescica, si tagli, per subito applicarvi l'empiastro magnetico arfenicale, la cui virtù dice effere in questo caso così grande, che non conobbe mai alcun miglior rimedio . La composizione lasciatacene dall' ARTMA. NO, (b) e dall' AGRICOLA (c) è la seguente: BERTRANDI TUM. TOM. I.

Cura esterna, ed interna di tali bubeni.

Rimedi topici per ime pedirne la retroceffions.

(b) Nel suo libro, che ha per titolo: Johan, HAR! TMANNI Praxis chymiatrica, stampato per la prima volta a Lipfia l'anno 1633. in 4. La descrizione dell' empiastro magnetico arsenicale trovasi all' articolo Pestis.

<sup>. (</sup>a) Questo Trattato è intitolato Methodus sanandi peste affectos. Leidæ 1667. in 12.

<sup>(</sup>c) Molti effendo gli Scrittori , che hanno il nome di AGRICOLA, bisogna sapere, che qui s'intende Giorgio AGRICOLA Autore di molti Trattati, e tra gli altri d'uno de peste stampato a Basilea l' anno 1554. in 8., dove trovasi la composizione dell' smpiastro magnetico arfenicale

R. Antimon. crud., sulphur, slav., arsen. alb. a unc. ij: subtilissime putveraca, & in phiata excepta speliantur in arena, deinde subministretur ignis, donec liquescant; & colorem rubrum subobscurum indutant: vase refrigerato, exime materiam, qua magnes arsuncalis vocatur.

e ci afficura, che ha perduta la fua forza velenofa, come ciafcuno può provare fui cani; per fare adunque l'empiaftro

R. Gumm. fagapen., ammoniac., galban., magnet. arfenical. a drachm. ij: terebinth. daric., cera a unc. fs.: ol. fuccin. drachm. ij: eerr. viriol. dulcif. drachm. fs. gummata disflove in aceto forti, & per pannum lindum experigle bulliendo iterum inspisentum experigle bulliendo iterum inspisentum edinde feorfim liquescant cera, & terebinthina, & extra iguem agita, donec in spisefuedinem unguenti redigantur: adde porro supradicul gummata, & magnetem arsenicalem cum terra vitriolica, & oleo succini, fat emplassum.

Si applica questo sopra tutto il tumore, e vi rimane un' escara, che si può facilmente separare; si proccura allora un' abbondante suppurazione, che per lungo tempo si dee sostenere. Ottimo sarebbe, secondo lo stesso Autore, il Eguente unguento:

R. Mell. virgin., axung. anat. a unc. ss. fuligin. camini drachm. vj. terebint. unc. ss., vitell. ovor. n. ij: theriac. drachm. iij: ol. scopion. q. s. m. s. unguentum.

e fi centinueranno gli empiafri gommofi, fino che più non vi rimanga alcuna durezza. Se il bubone sossi e ancrenoso, si faranno scarificazioni, poi si applicherà il cunstico, e il. SILVIO (ae) raccomandà il butiro di antimonio, o lo stello empiastro di magnute arsenicale. Racconta lo stello BARBETTE d'aver veduto uomini in tempo di peste, i quali, avendo buboni senzi altro sintoma di malattia, morirono per aver voluto risolventi. De' buboni venera (96) discorreremo nel Trattato delle malattie venete, e delle strume (97): ini altro luogo di questo stesso Trattato (410).

Della infiammazione delle confille, e dell' uvola.

## S. III.

110. Quando le tonfille sono tumefatte, l'ammalato inghiottisce più, o meno difficilmente, e con maggiore, o minore dolore secondo il maggiore, o minore gonfiamento di quelle ghiandole, sente un ardore in gola, il tuono della voce cangia, e, se l'infiammatione è grave, la respirazione stessifi si adifficile, e i polmoni anch' effit finalmente s' infiammano; quasf sempre sono anche tumefatte le ghiandole somascellari, e quelle del collo.

111. Questa infammazione alcune volte de fichiertamente fiammonofa, altre volte in parte fierofa, o, come dicono, catarrale, il che fi distingue per la maggiore, o minore intensista de fintomi. Che, quando ella è fierofa, il calore,

Segni delli infiammazione delle 1013 fills •

Distinzione di questa infiammazione.

<sup>(</sup>a) Il vero nome di questo Autore è Jasques du Bois, ed è nel suo libro de peste, & febre pestilenziali, stampato a Parigi l'anno 1557, in 16.2 che da questo precetto.

Segni della

lore, il dolore, il roffore, ed il lancinamento fono minori, quantunque le ghiandole fiano anche molto tumefatte, anzi un certo color pallido vi fi feorge, la faliva è meno vifcida, e la lingua meno fecca, ne il tumore così prefamente perviene alla fua grandezza.

Cura interna, ed efterna della flemmonofa.

112. Se il tumore è schiettamente flemmonofo, i rimedi interni fono gli stessi, come pel flemmone ( 74., e feg. ). Per tentare da principio la risoluzione, il malato gargarizzerà decozione di radice di bistorea, di tormentilla: di foglie di acetofa, di fiori di fambuco, o di rofe, l'officrato, o fimili, aggiungendovi nitro, fal prunella, sciroppo di viole, diamoron, vino di pomi granati, o altri subacidi, e quando l'ardore fia forte, si farà una crema con polpa di pomi cotogni, e mucilaggine di femi di psillio, rimescolandoli con acqua di piantaggine, ed aggiungendovi mel rofato, rob diamoron, e nitro, e con un pennellino, oppure con ispugna, o con filaccica all' estremità di una tenta, se ne ungeranno le fauci. Giova tenere il collo difefo dall' aria, e se si sentono, comecchè poco, tumefatte le ghiandole del collo (110), si applicheranno sacchetti pieni di fiori di sambuco, di camomilla, e rose cotti nell'acqua. Alcuni raccomandano come specifico un nido di rondini applicato a quella parte, impastato prima colla polpa di cassia estratta di fresco, o quello di meliloto canforato; e quando l'infiammazione si facesse maggiore, i pediluvi tiepidi, i finapismi, e le fregagioni ai piedi, e alle gambe; ma il più efficace rimedio si dee sperare dalle cavate di sangue, e dalle bevande tenui, acidule, e nitrofe.

113. Se poi al quarto, o quinto giorno non cedessero i sintomi della insiammazione, ed il convengatumore perfiftesse, anzi prendesse aumento, converrà allora passare agli ammollitivi, come sono le decozioni di radice di altea, di malva, di foglie di parietaria, di mercorella, di verbasco, di semi di siengreco, e di lino, cotti nell'acqua femplice, o nel latte, colle quali fi faranno frequenti colluzioni in bocca, o gargarismi, facendone anche cataplasmi da applicarfi al collo. Nè, quando fi faccia la fuppurazione, bisogna essere troppo solleciti ad aprire l'ascesso; imperciocche vi possono poi rimanere durezze molto difficili a risolversi ; egli è però vero, che sovente si apre da se senza l'opera del Cerufico.

Quando

114. Alcune volte l'infiammazione delle ton- Cura delle fille si fa con tanto surore, e crescono a tanta mole, che, fenza poterne sperare una pronta rifoluzione, o suppurazione, il malato corre pericolo di restar suffocato. Deesi allora scarificare, ed incidere col faringotomo la tonfilla, che è più tumida, e trarne fangue; convienealcune volte quafi spaccarla; ed è accaduto in fimili casi, che essendo esternamente turgida, e dura, ne sia nulladimeno uscita dal profondo materia già fatta putrida. Può anche effere neceffario di fcarificare la membrana delle fauci. e del palato, se si trova anche turgida, ed infiammata, onde si tragga una maggiore quantità di sangue, e forse si tolga a quel modo il pericolo della suffocazione, o della cancrena. Giova ugualmente in tanta gravità del morbo cavar fangue dalla venta giogolare, piuttosto che dalle ranine, acciocche se ne possa trarre una maggior copia, e in minor tempo, e così ottenere una maggiore derivazione. Si continuano poi i cataplasmi, e i gargarismi ammollitivi,

tonfille fuf-

e fuppuranti (113), principalmente il latta, in cui fianfi fatte cuocere radici d'altea, e fichi pringui. Se in quel futore del morbo accado tumore efternamente, deefi promuovere, e fo-ftenere colle fomentazioni, e co' cataplafini maturativi.

Attenzioni da aversi dopol'apertura dell' ajcesso. 111. Fatta la fuppurazione, ed aperto l'afcesso, ai gargarismi sopraccennati (113. 114.) si aggiungerà mele rosao con alcune gocce di essera di fuccino, o di pimpinulla. Accade alcune volte, che quantunque siasi rotto un maggiore ascesso, refinivi nulladimeno alcune cellette della stessa dacchè queste glandole sono cellulos, e quasi cavernose. Conviene in questo caso inciderle in croce più, o meno profondamente, e colla punta del dito sinuoverse, e da pririe maggiormente, acciocchè tutto l'unorer n'esa. 116. Se tanta è la gravità del morbo, che,

In qual cafe convenga la tracheptopria. 110. Se tanta e la gravita del morbo, che, nulla avendo giovato le copiofe, e frequenți cavate di fangue (114), nulla i dilucnii, ed anuiflogifici, i quali il malato può appena inghiotire a forfi, nulla le fearificazioni fatte alle parti infiammate (ibid.), l'infiammațione, ed il rumore fiano pervenuti ad occupare le parti inferne, ed efterne della faringe, e della laringe con evidente pericolo di fuffocațione, l'ultimo rimedio fară altora la trachetonima (e), almeno per follevarlo, fe pure non può guarire pel progreffo, che nulladimeno potră fare la malattia, pervenendo alla canerena.

Cura della fusione casarrale delle sontille. 117. Nella flussione catarrale (111), in cui, come si è detto ( ibid. ), l'infammazione è leggierissima, il tumore molle, bianchiccio, gial-

<sup>(</sup>a) Il modo di fare questa operazione vedasi nel Trauato delle Operazioni cap. XX.

giallognolo, e appena rosso, manca la febbre, o, se sopraventene, è per lo più critica, poco convengono le cavate di sangue, piuttosso i purganti, e i diurctici, ed il richiamare altrove la flassone co specicianti, e colocatto; Giovano i gargarismi, le colluzioni, i someni, e i cataplajmi risolventi, affiriganti, ed incie, stri, come il seguente gargarismo:

Rl. Flor. ligustr. unc. X.,
fyrup, e quatuor radic. aperient, unc. s.,
fal. pharyng. ZOBEL. drach. ij,
Oppure

R. Aq. rorismarin. unc. viij, nîtr. purif. scrup. ij, esfent. pimpinell. alb. unc. ss. rob. dianuc. drachm. ij, syr. violar. unc. ss. misce.

Il sale saringeo del ZOBELIO (a), che è un ortimo rimedio in questi casi, è una cristallizzazione di exemor tartaro, e di nitro purissimo a parti eguali, e di alume bruciato alla metà fatta nell' aceto forte. Convengono anche per la stessa indicazione le tavolette, come diconsi, de tribus, e, quando il tumore sia in diminuzione, quelle di terra catechù, e di acetosela (b).

118. Può

<sup>(</sup>a) Frederico Zonello fiori verfo la metà del paffato fecolo al fervizio del Duca di Holstein-Gor-Torp. Dopo la fuz morte è fitata pubblicata la feguente fua Opera Tattarologia spargytica Jenz. 1676. In 12., nella quale si dà la compositatione del fale faringeo.

<sup>(</sup>a) Ne' foggetti cachetici alcune volte alla base della lingua, nel tesluto cellulare, che attornia la glandute sottomascellari, e spatinguali, e negl' interstizi de molti muscoli, che qui si movano, si fanno inzuppamenti linfatici, pei quali, se non si corregge a tempo il vizio degli umori, e ancor più se non si

In quali cafi debbanfi le tonfille estirpare, 118. Può accadere, che le tonfille facciansi fiirrose o per l'abuso de repercussivi, o pella fomma viscidità degli umori, o per l'inerzia dell'organo. Poco giovano allora i gargarssimi, le lavature, i sussimi gi, e le passe emollienti, e discuzienti; che, se recano incomodo, bifogna finalmente estriparse (a).

Inflammazione, e inzuppamen, to tierofo dell' uvola, e cura. 119. Anche l'avola ora s' infiamma, ora fi ri-lassa, e s' incuppa di umori ferosi fola, o in ma colle fauci, e colle tonsillet: nell' infiammazione convengono gli stessi rimedi esterni, edinterni fin qui propositi pei simili tumori delle tonsillet (112. e feg.) Si sono veduti guarire rilassimenti dell' avola per mezzo delle farissi-azioni satte al velo palatino, essendo per esse esternola, e feiroso a vocando esse si fendosi per esse della serio di a stata pendula, e feiroso a vocando esse si aglio di questa particella ossende (b), nei il taglio di questa particella ossende in alcun modo la voce, o la degluticione, comè è comun timore.

Angina po-

120. Debbo avvertirvi di una certa epidemica infammazione di gola, che cominciò in Ifpagna l'anno 1610., donde pafsò in Italia, ove durò più di 20. anni con tanto furore, e tanta ftrage, che questa malattia prima chiamata dagli Spagnuoli garotillo, perchè i malati ne erano soffocati, come se da un laccio soffero stati strangolati, su poi dagl' Italiani nominata

apre di buon' ora ne luoghi più convenienti, ne fuccedono poi sfessi di cattiva natura, con moltiplicati deni, e caverne, dai quali fi vedono poi uficire lembi di quel tessiuto fracidi, e quasi canaranati, e talvolta medefimamente lobi delle accennate glandule, ficche la faliura stessa per qualche tempo ne coli.

(a) 11 modo di ciò fare è infegnato nel Tratt. delle optrazioni Tom. 11. cap. XVIII.

(b) In che modo debbasi fare questa recisione, yedasi nel luogo cit, delle Operazioni,

minata merbo strangolatorio, pestilente affesto delle fauci, carboncello anginoso, angina pestilenziale, laccio della gola, ascesso suffocativo, e pestilente de fanciulli, afte maligne, fuoco facro, e con altri spaventosi nomi. Vedete le Consultazioni di Ludovico MERCADO cap. X. Consultazione XXIV. (a), Gioanni Andrea SGAM-BATO de pestilence faucium adfectu Neapoli fæviente (b), EZIO CLETO de morbo strangulatorio (c), MARCO AURELIO SEVERINO nel fuo Opuscolo de pestilente, ac præsocante pueros abscessu, aggiunto al Trattato della recondita natura degli ascessi . Erafi quafi perduta la memoria di questo pestilente morbo, quando nuovamente comparve in Inghilterra, ed in Francia, non fono molti anni (d), ove io ancora ho potuto vederlo, e vo'darne la descrizione, e la cura, quale ci fu comunicata da Gioanni FOTHERGILL celebre Medico di Londra (e), acciocchè fappiate conoscerlo, e curarlo, se mai ( il che tolga Iddio ) aveste a trattarlo alcuna volta. Evvi niente di esaggerato, e la

nuova

<sup>(</sup>a) Le Confultazioni di questo verbosissimo Spagnuolo formano il v. Tom. della raccolta di tutte le fue Opere stampare in cinque volumi in foglio a Francfort Panno 1614.

<sup>(</sup>b) Stampato a Napoli l'anno 1620. in 4. (c) Stampato a Roma l'anno 1636. in 8.

<sup>(</sup>d) In Inghilterra se ne videro alcuni ammalati fin dall' anno 1739., fu poi frequentissimo dal 1748. fin oltre il 1752. In Francia comparve nell' Autunno del 1748., e non ceisò, che nel 1753.

<sup>(</sup>e) In un fuo Trattatello intitolato: Description du mal de gorge accompagné d'ulcères, qui a paru à Londres &c. traduit de l'Anglois par Mr. de la CHA-PELLE. Paris 1749. in 12.

nuova descrizione colle antiche de' nominati Autori concorda (a).

E' conta-

121. In tutt' i Pacfi, dove comparve questa malattia, fi offervò, che i fanciulli principalmente, ed i giovani, le femmine piuttofto che i maschi, n'erano sorpresi, e ancor più, se deboli fosfero, e cagionevoli. Quando incominciava a metterfi in una famiglia, per lo più tutti la ricevevano, fe converfavano infieme. Terribile è la ftoria raccontata dal COR-TESIO pag. 698. delle fue Miscellance (b): Divi Francisci Custos hac tue obsessus tonsillas folummodo, & gargareonem inflammatione lasa habebat , & continuo querebatur , fe percipere in ore fatorem quemdam; & ut hac de re certion redderetur, ad fe vocavit Baccalaureum quemdam amicissimum , rogavitque , ut vellet olfacere, pereipereque naribus, an verum effet, talem fætorem emittere , an ab ejus imaginatione prodiret . Olfecit Baccalaureus, me prafente ( dice il CORTESIO ) & emuliis aliis , & flatim , nonnullis elapfis horis , decubuit fola faucium , & glandularum inflammatione vexatus absque manifesta corruptione partium, omnibusque præsidiis ex arte factis, quarto die suffocatus peritt. Il MERCADO racconta di una nutrice, a cui si cancrenò la mammella, per aver allattato un fanciullo, che avea tal malattia, e al padre s' infiammò il dito, e contrasse lo stesso male di gola, per avergli messo quel dito in bocca.

(b) Stampate a Meffina in foglio l' anno 1625.

<sup>(</sup>a) Chi defideraffe ulteriori notizie circa la ftoria di si feroce morbo, legga nella Scelta di Opufoti intereffanti, che già fi ftampavano in Torino, Tom. 1. per l'anno 1777. la Storia della squinanzia cancrendi di Gionni BRUGNOME.

122. Essa comincia ordinariamente colla ver- Suoi segni. tigine, o giramento di capo, preceduto fovente da una debolezza, e tremore fimile a quello di un accesso di febbre : succede tosto un gran calore, alternandosi il freddo, e il caldo per alcune ore, fino che poi questo diviene intenfiffimo, e costante, Allora il malato si lagna di un dolore di capo acutissimo, di calore, e dolore in gola, di rigidezza del collo per lo più dolorofiffima con vomito, o diarrea, o amendue infieme, Il volto si fa rosso, e gonfio, gli occhi infiammati, e umidi di lagrime, succedono vigilie, inquietudini, e debolezza. Il morbo forprende ordinariamente al mattino, e fulla fera il calore, e l'inquietudine crefcono fin verso il mattino seguente, nel qual tempo, dopo un leggierissimo, breve, e torbido sonno, fi trovano bagnati di fudore, pel quale diminuisce il calore, e l'inquietudine, onde pare, che in qualche modo la febbre fia intermittente. Efaminando la bocca, e le fauci dopo il primo accesso, si vedono l'uvola, e le tonfille molto turgide, e di un color rosso vermiglio, come pure il velo pendulo del palato, e tutte le fauci. Alcune volte fi offervano macchie pallide più, o meno irregolari, ma circondate dallo stesso color vermiglio: quelle macchie fono molli al tatto, come fe fotto vi fosse umore. Generalmente al secondo giorno della malattia il volto, il collo, il petto, e le mani sono di un color rosso erisipelacofo, e tumide, e vi si elevano tubercoletti rosti, e quantunque per questa espulsione i sintomi univerfali fi facciano più miti, quelli però della gola continuano, anzi fi fanno più gravi, fuori che le macchie bianche diventano d'un color bianco opaco, ed allora fi vede, che fe prima pareva, che coprissero un ascesso, non erano

erano in realtà, se non escare fatte sulla superficie di un' ulcera. Tutte le parti della gola fono foggette a quelle' ulceragioni; ma generalmente cominciano ad apparire ne' fuoi angoli fotto, e sopra le tonfille, comecche sovente se ne vedano anche al velo pendulo, e al di dietro di esso nella faringe, alla faccia interna delle guance, e alla base della lingua, le quali parti ne fono coperte come da un' escara spessa. Quando il male è benigno, in vece dell' escara, molte, o foltanto alcune delle stesse parti sono ulcerate superfizialmente, e irregolarmente, ne da altro fegno se ne distingue l'ulceragione. che dal vederne la superficie scabra, e disuguale. Le parotidi dell' uno, e dell' altro lato gonfiano, e si fanno dure, e dolorose, e nel furore del morbo tutto il collo diviene tumido. ed edematofo, stendendosi il tumore sino al petto con pericolo di fuffocazione. Il polfo è generalmente precipitofo, in alcuni duro, e piccolo, in altri pieno. Il fangue estratto nel principio della malattia difficilmente si coagula, ed è vermiglio, l'urina cruda, e pallida, poi diventa biliofa, e torbida; la fete non è grande, e la lingua coperta di un umore spesso, e bianco: efala dalla bocca, e dalle narici un odore putridissimo, e la deglutizione è più, o meno impedita a proporzione della gonfiezza maggiore, o minore. Finalmente l'ulceragione fi estende verso le narici, che si osservano internamente rosse, oscure, e livide, ne cola una fanie chiara, e corrofiva, meschiata con materia bianca, fpessa, e putrida, della quale tanta è l'acrimonia, che esulcera le parti, ove posa per qualche tempo, e vi eleva vescichette principalmente agli angoli delle labbra, e fulle guance, e fe i fanciulli ne ingojano, forgono accidenti, che dimostrano l'escoriazione degl'intestini, sicchè

gior

fi esulceta poi anche l'ano. Sopravvienc emorragia dal naso per lo più mortale, e nelle donne è anticipato, e più copioso il sussione fruale, così che esso pure minaccia pericolo. 121. Tutti questi sintomi (122) dimostrano

una costituzione di umori acri, putrefacienti al foinmo grado, come meglio faremo notare nella risipola maligna (161). La cavata di sangue ( secondo l'osservazione di molti Autori ) fu sempre piuttosto perniciosa, e ancor più i purganti . " L'uso di questi ( dice il-FOTHER-GILL (a) ) quantunque dolci, è implicemente » lassativi, apportò fintomi pericolofissimi, il » roffor della pelle fvanì, crebbe la fluffione " alla gola con pericolo di suffocazione, e, con-» tinuando le evacuazioni, la gola divenne » molle, ricascante, secca, e livida, e i ma-" lati poche ore dopo morirono". Sono anche stati provati nocivi i rimedi nitrosi, e rinfrescanti. essendo per essi cresciuta la debolezza, e sopravvenuti copiosi sudori, o slussi di ventre, che fino alla morte refero fempre più debole il malato: allora il polfo fi abbassò , la respirazione si fece difficile, e l'estremità fredde, gli occhi perdettero il loro fplendore, e le forze diminuirono a poco a poco fino all' estinCura in-

zione. L'esperienza adunque dimostrò, che, quando al principio del morbo vi era il vomito, giovava di ajutarlo, facendo bevere un'infusione di thé verde, di fiori di camomilla, di cardo benedetto con alcuni grani d'ipecaquana; anzi il celebre HUXAM (b), per 'eccitare un mag-

<sup>(</sup>a) Nella Differtazione qui fopra citata.

(b) Vedafi la fua Differtazione fur les maux de gorge gangemens aggiunta all'altra fua Opera insitolata: Effai fur les fieyres, Paris 1765, in 12,

gior vomito in alcuni fanciulli, che farebbero altrimenti stati sussocia dalla copia dell' unnore, che loro sgorgava in gola, su alcuna volta obbiligato di far uso dell' offimete squillitico, o dell' esenza di antimonio. Conviene poi somministrare ogni cinque, o sei ore qualche cordiale calefaciente aromatico, come la polvere di convargieva, le confecioni cardiache composte, le fectie aromatiche, l'acqua alessieria spiritosa, l'acqua manta ec., per esempio:

N. Aq. alexiter. fimplic. unc. vj, alexiter. spirituos, unc. j s., consect. cardiac. drachm. j s., pulver. simplic. contrajerv. drachm. ss., syr. croc. unc. ss., cap. cochlearia duo singulis vibus horis.

Il soprabbondante flusso di ventre può essere mortale, perciò bifogna arreftarlo cogli aftringenti, o cogli anodini, come col diascordio del FRACASTORIO sciolto nell'acqua di cannella orzaea, della quale si prenderà un cucchiajo dopo ogni evacuazione. Giovano pure le infusioni di origano, di marrubio, di falvia, e di menta; ma se sopravviene un sudor abbondante, e fetido. conviene allora fomministrare a piccola dose l'elissire di vetriuolo colla tintura della correccia Peruviana, che è il miglior antisettico. Nella fomma debolezza, per fostenere le forze del malato furono utili i vescicanti applicati alle gambe, e alle braccia. Il fopraccitato HUXAM li fece applicare alcune volte con vantaggio alle parti laterali del collo dal di fotto delle orecchie fino alle clavicole. Deefi avvertire il malato di non mai inghiottire l'umore, che ha in bocca, perchè non tragga con fommo danno quella

quella putrida materia nello stomaco, e negli

124. Come quì (opra abbiamo avvertito (122), quell' escare non coprono un aseiso, ma un uscer, e fu provato pericolois, anzi mortale il proccurarne tostamente la caduta; imperciocchè l'ulcere si faceva dipassente, e la canienna si allargava, ritornando l' escara in breve tempo più spessa, ritornando l' escara in breve tempo più spessa, più bastare un gargarismo dell'instusione di salvaia, e di rose con qualche poco di ossimate, oppure una decozione di schi pingui, di rose soppure una decozione di schi pingui, di rose rospe, aggiungendovi mele, o mucilaggime di pomi cotogni, stroppo di more, tintura di mirra, o spirito di vetriuolo. Ma, se la putrefazione è al sommo grado, sono necessari antifutici di maggio essenzia cai con il seguente il s

R. Decocl. pectoral. lib. j., tempore ebullitionis adde radic. controjerv. ruditer pulver. unc. [s., shitterur decoclio, & adde vin. alb. generaf. unc. ij., tinctur. myrrh. unc. [s., mell. optim. drachm. vj., utatur pro gargari [mo.]

o se ne facciamo injezioni in bocca ai fanciulli, co non sapesfiero gargarizzare. I gargarifini, o le injezioni si denon ripetere sovente, perche la materia non goccioli nell'esosgo, o troppo non si accumuli nelle fauci, e nella bocca. Quando l'estare sono larghe, e tardano troppo a distaccarsi, vi si può aggiungere il mete estataco to sessione della bocca il vapore d'infusione calda di rose rosse posca il vapore d'infusione calda di rose rosse solliti nell'aceto. In Francia, o ve si questa malattia l'anno 1753., giovò una dissoluzione di xxtv. grani di state si fasurno in due once d'acqua di piantaggine, con cui se

toccavano l'escare. Ci avverte l' HUXAM, che le parotidi, le quali gonfiarono nell'impeto del morbo, restarono, quantunque esso fosse terminato, così dure, che non fu possibile di rifolverne il tumore, se non coi mercuriali esterni. ed interni, i quali però sarebbero stati sommamente nocivi da principio con produrre una maggiore diffoluzione degli umori. Questa difsoluzione e putrefazione alcune volte fu tale che accadevano, come già fi è detto (122), emorragie dal naso, o dalla gola, contro le quali nessun rimedio giovava, oppure i malati morivano esausti dal flusso di ventre col ventricolo, e cogl'intestini cancrenati per la causticità di quella materia, che giù colava dalla bocca, onde raccomandano gli Autori, che i malati non la ingoino. Quando ciò fosse accaduto, ci afficurano effere state utili le bevande emollienti, e mucilagginose, e le mucilaggini steffe applicate all' ano, che n'è ardente, ed esulcerato (122), non tralasciando però i soprallodati antifettici interni (123), ed esterni .

Dell' infiammazione delle mammelle .

## S. IV.

Cagioni congiunte, e antecedenti di tale infiammazione, 125. Se alle puerpere, ed alle nutrici è per alcuna cagione impedita la circolazione, o l'evacuazione del latte, raccogliendofi questo morbosamente nelle glandule delle mammelle, le distende, e le gonsia con sintomi d'infiammazione più o meno forte, secondo la quantità, e la qualità del latte raccolto, e secondo la forza accreficiuta de vasi (50). Possono essenzione di questa impedita, o suppressa circolazione, o evacuazione del latte l'aria fredda, che improvyisamente sorprenda le mammelle,

o tutto il corpo, gli astringenti, che alcune puerpere vi fogliono applicare, per far passare, come dicono, il latte, la fua troppa craffezza; abbondanza, o cattiva qualità, la suppressa evacuazione de' lochj , le passioni dell' animo , il contatto de' corpi duri, irritanti, comprimenti ec. Egli è raro, che una mammella fola fia affetta, vicendevolmente, e successivamente or l'una, or l'altra s'inzuppano, o amendue infieme.

116. Se il latte fi fosse aggrumato nelle mam- Cura del tumelle folamente per la fua soprabbondanza, e spessezza, nè il tumore sosse accompagnato. come alcune volte accade, da perspicui accidenti d'infiammazione, è molto lodato l'ungere la parte, o l'applicarvi fopra un pezzo di tela spalmato del seguente linimento:

Rl. Ol. amygdal, dulc. quantum cupis : huic exacte mifce in mortario lapideo, aut vitreo spirit. Sal. ammoniac. cum calce viva parati q. f. pro componendo linimento.

ll Klein nella sua scelta de' medicamenti (a) propone, e raccomanda come molto efficace un linimento composto con butiro fresco e sale volatile di corno di cervo. Il BARBEYRAC (b) nelle sue formole loda il seguente:

R. Axung. ferp. unc. j. fs.: butyr. veter. unc. fs. agitentur simul, & liquentur ad ignem : dein adde succ. menth. unc. j.,

BERTRANDI TUM. TOM. I.

<sup>(</sup>a) Selettus rationalis medicaminum. Francofurti 1756.

<sup>(</sup>b) Medicamentorum conflitutio , feu formula. Lugduti; 1751. in 12.

camæmel. q. s. stat linimentum, quo illiniantur mammæ ter in die; & linteis calidiusculis operiantur.

Oppure

pl. Mell. commun. & ung. dialth. a unc. iij., pulver. radic. ireos florenin. unc. ss., misce stat linimentum.

Dell'infiammazione decita, ma ancor rifolvi bile,

127. Ma, fe colla turgidezza vi fosse infiammazione, fi dovrà dapprincipio, come lo potrà permettere lo stato del puerperio, cavar sangue dal braccio, o dal piede una, o più volre. secondo la veemenza del tumore, e le forze della malata. Il vitto farà severo, e tenuissimo, e i rimedi topici anodini, e rifolventi, come i cataplasmi di pane, tuorli di uova, e zafferano colle farine risolventi di semi di lino, di riso, o di fiengreco cotte nella decozione di piante ammollienti . E se con questi rimedi si abbassasse il tumore, e svanissero i fintomi dell'infiammazione, si useranno allora i risolventi soli; come il cataplasma di pane, e di officrato, l'acqua falata animata col vino, la diffoluzione di fal fisso di tartaro nell'acqua destillata di pioggia, o finalmente il fale ammoniaco sciolto in una decozione di piante vulnerarie, avvertendo però di non applicare questi rimedi, se gli ammollienti non hanno prima prodotto il lore effetto.

Segni dell' Infiammazione tendente alla suppurazione, effetto.

1.18. Che se sopraggiunge la febbre, e l'ammalata soffre un dolore pulsatile in tutta l'estentione della mammella coll'accressimento de'intomi dell'infiammazione, mostrando allora di tumore di determinasti alla suppurazione, bisogna prontamente ricorrere ai suppuranti ammolicienti. E perchè l'inzuppamento infiammatorio od occupa solamente il tessuo cellulare della mammella ( ciò che è di raro ), o solamente le

le fue ghiandole ( ciò che è affai comune), o queste, e quello infieme, è necessario di ben diftinguere i fegni, che ci fanno conofcere la

precifa fede di tali inzuppamenti:

a Nel primo caso, cioè quando l'infiammazione occupa folamente il teffuto cellulare, la mammella uniformemente si distende, e gonfia, talmente, che non cangia figura, fuorchè la materia si accumulasse in diversi ascessi, e medesimamente suole in tal caso accadere, che, rompendosene i tramezzi, e poscia comunicando insieme, la mammella di nuovo si faccia regolarmente globosa, ed uniforme. Questa sorta di ascessi produce vivissimi dolori, primacche si aprano naturalmente, o che la fluttuazione della materia divenga affai sensibile, perchè se ne possa fare l'apertura; e non di rado la gonfiezza si stende sino all'ascella, ed al braccio, ficchè la donna è obbligata tenerlo disteso, ed immobile .

Segni dell' inzuppamento cellulare

B Nel secondo caso la mammella è di superfi- Del giandite cie disuguale con elevazioni a varie distanze: col tatto si conosce, che i vari tumori non fono molto vicini, nè dapprincipio gl' integumenti della mammella sono molto distesi, nè il dolore così forte, non crescendo proporzionatamente come cresce il tumore, ma si fa poi maggiore ful fine, quando la suppurazione è affatto determinata.

γ Nel terzo caso la manmella è inugualmen- Del misso. te.gonfia con durezza maggiore in un luogo, che in un altro, e i dolori pulfatili si fanno fentire, come nel caso precedente.

& La suppurazione si fa prontamente, e anche abbondante nel primo (a), ma la marcia è di colore, e di confistenza disuguale; contuttocciò l'ulcere, che vi rimane, fi deterge facil-E 2 mente.

mente, purchè non vi si aggiungano altre complicazioni, e principalmente se l'ascesso si apre

spontaneamente.

e Esta fuppurazione si fa più lentamente nel secondo caso (B), e non si produce nel medesimo tempo in tutta l'estensione della mammella: comincia in un luogo, poi si fa sentire in un altro, e mentrecché si vuota un ascesso, dividi dolorosa un'altra parte della mammella, quivi formandosene un altro, e più e più se ne formano, sinche tutte le ghiandole sieno suppurate le une dopo le altre: perlaqualcosa alcune volte la malatita dura per alcuni mesi.

E Nel terzo caso (y) si formano anche differenti ascessi; in siccome in ciascuno di essi somprese varie ghiandole, la mammella si scarica più prontamente che nel secondo caso, e

più lentamente che nel primo.

Cura della mammella Suppurata

129. Molti Autori raccomandano di aspettare la spontanea apertura del tumore, non solamente acciocche l'aria meno offenda le tenere parti interne, ma ancor più perchè la lunga dimora della materia acceleri la distruzione de tramezzi. da' quali il tumore è diviso in vari ascessi. sciolga, ed ammollisca sempre più le ghiandole, onde non si debbano moltiplicare i tagli: inoltre lo strumento tagliente lascia sempre cicatrici più o meno grandi , e difformi , che molto ipiacciono alle donne. Allo incontrario, se si lasciano aprire spontaneamente, dopo la guarigione appena vi rimane vestigio dell'apertura. Se, perchè l'inzuppamento si è fatto lentamente, e con pochi fintomi d' infiammazione, la suppurazione troppo tardaffe, bisognerebbe scuoterla con qualche suppurante efficace, come farebbe il feguente: .

R). Radic. alth., lilior. albor. a unc. ij, folior. aevof. & acanth. a m ij , coque ad purrilaginem; deinde pulpa per cribrum trajetta adde. ung. bafilicon., & ferment. veter. a unc. j., ol. lilior. albor. q. f. fat cataplafma.

Si potrebbero applicare gli empiafiti di gomma ammoniaca di diaquiton semplice, delle mucitaggini, riformandogli inseme con olio di gigi; bianchi, ed aggiungendovi zesserano, serco di cotombo, e simili, i quali rimedi vopici si debbono continuare, anche dopo che la mammella è aperta, nel caso che vi. seno nimade durezze, le quali pure sogliono difficilmente sciorsi, e suppurare. Con morbidi stuelli intris d'unguento digssirvo gli afeessi in terranno aperti, e si faranno purgare, e, se sia necessario di astergere, non solamente vi si aggiungeranno polveri asserbire, come mirra, incenso, aristolochia, iride fiorenina ec., ma nelle sinussità, sendo bisogno, si faranno injectioni, come la seguente:

RI. Decott. hord., & flor. hyperic. a uno. iv.; mell. rofac. unc. ij. mifce.

Se dal fondo di qualche afcesso le materie potessero difficilmente colare, si faranno le opportune controperture; che se sono di buona qualità, e consistenza, e colano facilmente, e se
le dutezze vanno sciogliendosi, si trasasciera
l'ulo di que cataplasmi tanto attraenti, bastando
allora di applicarvi l'unguento di attea, il sosso,
o, come dices, della madre, la pomata di spermaccii, e cera vergine stata coll'olio di mandorte dotci, oppure l'empiassiro di Norimberge
tecentemente composto.

E 3 130. Quana

Cura delle durezze, che qualche volta rimangono,

110. Quantunque la suppurazione fosse succeduta bene, tuttavia, se colla diminuzione della marcia non si vedessero sciogliere tutte le durezze della mammella, converrebbe allora L'empiastro di galbano, quello di cicuta, il de ranis riformato con quello delle mucilaggini . o di fapone. Il LEVRET (a) raccomanda come fommamente efficace in questo caso, lo stilli-cidio, o, come dicono, la doccia d'acqua piovana, o della defillata, in ciascuna pinta della quale fiansi disciolte due dramme, o mezz' oncia di sal fisso di tartaro. Può alcuna volta bastare di applicarvi compresse bagnate in quel liquore caldo, oppure nella lisciva di ceneri di farmenti, o di ginestre, o anche una leggiere dissoluzione di fapone di Alicante nell'accura comune. Quando l'ammalata non abbia più alcun dolore alla mammella, giova allora farle fare qualche muovimento del braccio corrispondente, pel quale, mettendosi in azione i muscoli grande, e piccolo pettorali, la maminella n'è anche scossa, dal che gli umori sono pure smossi, sicchè possano o evacuarsi, se già fono travasati, o mettersi in muovimento colla massa universale, se solamente stagnanti ne' propri vafi.

Degli altri tumori prodotti dal latte si parlerà quì appresso tra gli ascessi interni (221., 4 seg.)

· De'

<sup>(</sup>a) Nel fuo libro intitolato: L'are des accouchemens démontré par des principes de Physique. Paris 1762, in 8.

### De' tubercoli infiammatori .

### S. V.

131. Tra i tubercoli infiammatori sono compresi il fima, il figetlo, il terminto, ed il furoncolo: non sono essi guari differenti tra di se, se non per la maggiore, o minore profondità, ed elevazione.

Definizione dei tubercoli infiammatorí, cioè

a Il fima (a) è un tubercolo circoscritto. cutaneo, non molto elevato, che presto suppura, riducendosi tutto in pus:

Del fina

& Il figetlo (b) è più ampio, ed ancor meno elevato, più dolorofo, ma che difficilmente fuppura:

y Il terminto è un tubercolo roffeggiante, e Del termine dolorofo con una pustula in cima nera, o li- 10, vida, che si secca come una crosta: dicesi che abbia tratto il suo nome da questa pustula, che raffimiglia al frutto del terminto (c):

(a) Il vocabolo Greco phyma propriamente fignifica qualunque tubercolo nascente da se senza cagione esterna, epperció CELSO ( de Medic. lib. 5. cap. 18, pag. 254. n. 16. ) dice: malagma ad frumam, & orientia tubercula, qua phymata vocantur. Lo stesso Autore però ( lib. 5. cap. 28. pag. 325. n. 9. ) dà il nome di fima a un tubercolo particolare furunculo fimile, fed rotundius, & planius, fape etiam majus.

(b) Il figetlo dai Latini dicevali panus: panum ad fimilitudinem figura nostri vocant (CELS. loc. ultimo cit. n. 10. ); e panus presso i Latini significa propriamente un gomitolo di lana, o il fulo carico di filo, oppure la navicella, che serve per tessere, detta la spola: dalla figura adunque o della spola, o del fuío, o, ciò, che è più probabile, del gomitolo panus è stato chiamato il figetlo

(c) Il terminto è l'albero, da cui stilla la trementina, meglio chiamato terebinto, il qual albero fa un Del furen-

\$11 fuvoncolo è un tumore maggiore dei tre nominari, il quale però di rado (upera la groffezza di un uovo di colombo: effo è refiftente al tatto, appuntato quasi in piramide, di un color rosso intenso, con calore, e dolore acerbo, urente, e pungente. Alcuni pretendono, ch'esso abbia tratto il suo nome dal surore, con cui si produce, altri dai molti forellini, co' quali resta bucherato, quando suppura.

Cagioni di questi tur bercoli

132. La viscidità del sangue, per cui effo diventa acre, è la cagione principale di questi tumori, i quali per lo più sogliono nascere nello stesso in vari luoghi, o succedersi.

Cura del

neilo tempo in vari luogin, o luccecern. I rimedi interni debbono effere gli stessi, con altrettanta si effica, che di rado gli si debbono applicare rimedi; l'empiastro di spermaceti con quello di altea, delle mucilaggini, o di metiloto ne promuovono la suppurazione: servono per efficcarlo l'unguento di tuzia, o di litargirio. Sul siguto, quantunque dissilimente suppurati più attivi dei sovradetti; imperciocchè pel loro simulo portebbe crescere, e fassi di

Del figetlo,

Cura idel

pel loro fitmolo potrebbe creteere, e tarti di maggior eftensione, come se sossi un sianonolo. Pel terminuo, se è molto doloroso, come suole alcune volte accadere, giovano i cataptassi composti delle mucitaggini di semi di psilito, è di radici di altea, le soglie di mativa macerato nel latte calado, quelle di tasso barbisto, di pare

frutto ovato, che può beniffimo aver dato il nome a questo subercolo. Galeno però con maggiore probabilità nel fuo Comment. Iv. al libro vi. de' anobi epidemici d' IPPOCRATE lo deriva dalla fomiglianza, che ha coi ceci chiamati in Greco therebintoi, o themintoi.

rietaria, di viole, la polpa di pomi cotogni cotti, ed impaffati col burro. Fatta la suppurazione per lo più il tumore è esausto, e si secca facilmente (a).

133. Il furonzolo maggiore di quegli altri tumori alcune volte è accompagnato da febbre, e dolore intenfissimo, e se è vicino a parti nervose, e tendinose, produce anche lungi dolore, tensione, inzuppamento, ed infiammazione. Debbonsi allora ripetere le cavate di sangue, raccomandare maggiormente la dieta; e i diluenti, ed antispogistici interni, i quali

faranno tanto più necessari, quanto più i sironcoli vedrannosi moltiplicare, e succedersi in
varie parti. Giovano, per promoverne più presto la suppurazione, tutti que cataplasmi emoslicarii, che abbiamo proposti per sar suppurare il
stemmone (77, 78, 79, e 80.). Gii empiastri gommoss, come abbiamo avvertito del figetto
(132), fogliono crescere il dolore, ed il calore, senza però eccitare ne più presta, ne più

Del furon-

perfetta la fuppurazione.

134. Il furoncolo fuole fuppurare in punta; fenza che tutta la maffa del tumore fia ammollita; nè bifogna effere troppo folleciti a farne l'apertura, prima perchè quafi fempre fi fa da fe, poi perchè il nimanente più difficilmente fi potrebbe trarre alla fuppurazione. Quella folle-

Il furencolo fuppurato deefi lafciar aprire da fe.

(a) Quando in vece di fuppurare il terminto fi effica, fotto quella crofta nera fi raccoglie una materia fpefsa, e untuofa, la quale, comprimendo la base del tumore, n'elec fotto la forma di vernicelli. Dal che fembra poterfi conchiudere, che la fede del terminto fia nelle glandule febacce. Efso è frequente ne' giovinaftri dai 17, ai 20, anni, e fuol comparire moltiplicato, non mai folitario, alle tempia, alla fronte, alle alj del nafo eca.

conviene aprirlo coll' arte,

citudine però non sarebbe tanto condannevole. se il furoncolo fosse in parti molli, e adipose, ove facilmente si potessero produtre seni . co. me all' ano, al perineo, alla vulva, e al canto interno dell' occhio, e in questo ultimo luogo. fosse anco un fima, un figetlo, o un terminto. presto pure dovrebbesi aprire, perchè la marcia non vada ad offendere il facco lagrimale,

come dimostreremo altrove (a).

135. Quando il furoncolo si apre da se, suole uscire poca marcia viscida, e tenacissima, a cui vien dietro po' poco d' icore : allora giovano i medicamenti gommosi mescolati co' mucilagginosi. imperciocche è necessario, che suppuri tutta la fostanza cellulosa, ove il tumore ha la sua sede. Se v'è una sufficiente apertura, si applicheranno filaccica intrise nell' unguento basilicone, o nel balíamo dell' ARCEO, o in altro ancor più efficace digestivo, per cui la tenacissima materia maggiormente si sciolga; se nò si dilaterà, e per poter fare a dovere le necessarie medicazioni, e per rendere più facile l'uscita non meno di essa materia, che di certi fiocchetti (b) di quella sostanza macerata, e semiputrida, che vedonsi poi uscire, e lasciare un vacuo più o meno grande fotto la cute. Sonvi furoncoli, come fu già notato dal FORESTO nelle sue offervazioni (c), che estendono le loro radici molto lungi, tali fogliono effere quelli, che vengono alle natiche, alle guance, al collo, e fotto le ascelle nella fostanza cellulosa, che

O dilatare l' apertura fpontanea.

Tieme

<sup>(</sup>a) Traus. delle Operazioni tom. Ir. cap. XVI. (b) Questi fiocchi di cellulofa, che escono, suppurazo che è il furancolo, sono chiamati da CELSO ventriculus furunculi ( vedafe il luogo cit. della fua Medicina ). (c) Chirurgicarum observationum libri novem . Leida x190. in 8.

riempie gl' intervalli de' muícoli, che trovansi in quelle parti. Sissati suronosi, se non si fanno a tempo le necessarie aperture, e dilatazioni, come suole non di rado accadere per la trascuraggine de' malati, lasciano poi seni, e sissati

136. Quando i furoncoli fi aprono con molti fori ( 131. ), alcune volte al di fotto di que' pezzi di cute, che sono tra i fori, rimanvi un vuoto; i feni non foglionfi allora riempire, nè la cute riattaccarfi, se non si tagliano le aje di cute, che fi stendono dall' uno all' altro foro. Altre volte quella fostanza cellulosa lacera, macerata, e fordida di marcia vifcida (135), profondamente, e lungi ai lati si stende, sicché difficilissimamente si può muovere alla suppurazione, e far separare, se al digestivo qualche cateretico, e corrofivo non fi aggiunge. E in generale ne' furoncoli l'abbondanza della marcia. che n'esce, eccede la massa del tumore, nè secondo quella questo sempre cede, e ciò perchè la materia suol venire da lungi per certi anderivieni, che si stendono nelle parti vicine: bisogna dunque esaurirli con una lunga, e copiofa suppurazione, facendo anche, come diffimo (135), le opportune dilatazioni, e debellando il vizio degli umori, pel quale i furoncoli fono stati prodotti (a).

Attenzioni da averficirca certi particolari furoncoli.

 $D\epsilon l$ 

<sup>(</sup>a) Non si sgomentino però i malati di certe durezze qualche volta assai prosondo, che sovente rimangono dopo la cicartice de funencii; soglioni ese a poco a poco risolvere da se senza il minimo aecidente.

#### Del Panereccio.

#### C. VI.

Definizione, ed etimologia del pancreccio i 137. Il paneteccio detto da Toscani patereccio, o paterecciolo, e dai Latini panaritium o reduvia (a), è un tumore infiammatorio, che viene alla estremità di alcun dito ordinariamente alle radici delle ugne. La fua etimologia fu tratta da due vocaboli Greci para contro, ed onyx unghia, quasi si dicesse tumore contro l'unghia, onde i Greci il chiamarono paronychia.

Perchè il panereccio sia tanto dolotoso. 138. Siccome i morbi fono sempre gli steffi, ed il luogo solo ne sa la differenza, non dee recar maraviglia, se questa infiammazione, quantunque d'una parte piccola, è alcune volte dolorossissima, ed accompagnata da gravi accidenti, essendo essa parte guernita di molti nervi, che

<sup>(</sup>a) Quantunque comunemente s'interpreti la parola latina reduvia per panereccio, noi crederemmo però, che propriamente fignifichi le pipite, cioè quei pezzetti di cute, che fovente si follevano, e si staccano dal rimanente verso la punta delle dita, e c'induciamo a così pensare, prima perchè Festo così spiega questa parola; Rediviam quidam, alii reduviam appellant, quum circa ungues cutis fe refolvit, quia luere. est folvere; poi perchè la reduvia era riguardata come un morbo leggeriffimo, onde CICERONE nell' Orazione pro Roscio AMERINO: Intelligo me ante tempus, Judices, hac scrutari, & propemodum errare, qui, quum capiti SEXTI ROSCII mederi debeam, reduviam curem . Anzi n'è perfino nato il proverbio: De reduvia queritur, quando uno si lagna di cose di nessun momento, distimulando le maggiori. Ma chi non sa, che il panereccio, parlando anche foltanto di quello, che viene fotto l'unghie, che era il folo così chiamato dagli Antichi, è una malattia dolorofiffima, che non vuol esser negletta?

che quivi terminanfi con papille piucchè in altre parti capaci di sensazione, e con un intreccio di vafi, che vi formano corona, oltrecchè la cute delle dita non è capace di molta eftentione.

139. Le cagioni del panereccio possono essere tutte quelle, che abbiamo accennato dell'infiammazione in generale ( 64., 65. ): fovente dipende da punture d'aghi, di spine, o sestuche, che fianfi infiffe in quella parte, o dall' impru-

dente estirpazione delle pipite.

140. Quattro fono le spezie de' panerecci. La prima è, quando il tumore, e la infiammazione sono nella tunica adiposa sotto la cute: la seconda, quando sono sotto l' unghia: la terza, quando il perioftio stesso è infiammato: infine la quarta, quando la infiammazione occupa la guaina de' tendini fleffori, e questi stessi sono infiammati, qualche volta fino al loro corpo mufcolare (a).

141. In generale i segni di queste varie spe- Segni del zie di panerecci (140) fono gli stessi, che quelli panereccio di ogni altra infiammazione; ma in una Spezie specie. più che in un'altra, per ragione della struttura delle parti, fono più intenfi, e vanno più lungi. Nella prima spezie il dito è più tumido. il malato fente un ardore, un martellamento veramente nella cute, e quantunque il tumore fi stenda lungo il dito, nulladimeno però evvi un luogo, dove la elevazione è più circoscritta. 142. Nella

Quali ne fiano le cagia-

Quattro ne fono le spo-

<sup>(</sup>a) Stando all' etimologia, non vi farebbe altra spezie di panereccio, che quella, che si sa sotto, o contro l'unghia; con tutto ciò noi crediamo, che l'ASTRUC (Traité des tumeurs & des ulceres tom. L. pag. 157. ) biasimi a torto i Cerusici di averlo distinto nelle quattro spezie suddette, perchè l'etimologia non ha mai fatto regola, come già fi è detto, parlando del bubone.

73

Della feconda . 142. Nella seconda specie (140) il tumore lungo il dito è per lo più minore, maggiore però attorno l'unghia, la qual cangia di colore, facendosi da principio livida, e rossigna, poi pallida, e vacillante: il malato vi sente sotto un acerbissimo dolore, e un senso di gravezza lungo il dito.

Della terga.

143. Nella terça speçie (140) il tumore per la lunghezza del dito è ancora minore, che nella seconda (142), i dosori sono più acerbi, e sentonsi veramente contro l'osso: alla cute per lo più non appajono, se non alcune strisce erispetatose.

Della quar-

144. Nella quarta Spezie (140) il tumore non è grande alla estremità del dito, sono più tumidi gl'internodi, gonfia la mano, sentesi quasi uno strangolamento al luogo del ligamento detto anulare interno del carpo, il dolore si stende lungo il cubito fino al condilo interno dell' omero, onde traggono origine i muscoli slessori delle dita, e infine fi avanza fino alla fpalla à Nella seconda, e terza spezie evvi sempre la febbre, veglie, e dolori atrociffimi, ma in questa per lo più succedono anche le convulfioni, ed il delirio: la mano, l'avan-braccio, ed il braccio fino alla fpalla fi fanno a poco a poco tumidi con istrisce dure, nodose, che occupano gl' interstizi de' muscoli: il tumore su quelle parti cresce poi con furore, come un vero flemmone suffocativo (85., 86., 87.), tutto l'articolo diventa pesantissimo, ardente, ed infiammato, si fanno ascessi in vari luoghi, se pure non anticipa la cancrena, e si pericola della perdita del braccio, e perfino della vita.

Cura interna, ed efterna de' panerecej in generale.

145. Di qualunque speçie sieno i panerece, , egli è raro che si risolvano. Perciò, nel tempo stesso, che si somministeranno i rimedi interni, come per le altre insammazioni (161, 170.); e che

e che le cavate di sangue si faranno copiose, e si ripeteranno secondo gli accidenti, e le diverse cagioni, che gli hanno prodotti, i locali dovranno effere emollienti, come farebbero le fomentazioni di decozione di malva, parietaria, melitoto, o viole, nelle quali il malato terrà immerso il dito. Alcuni propongono l'acqua pressocchè bollente, altri il latte. Se le fomentazioni incomodano, o annojano, fi applicheranno cataplasmi fatti di quelle piante cotte a putrilaggine, e mescolate colle farine di orzo. avena, semi di lino, o fiengreco, aggiungendovi qualche poco di mele, o qualche grafo, come quello di gallina, di anitra ec. Sonvi Autori anche metodici, che raccomandano l'applicazione della triaca disciolta nello spirito di vino canforato, l'aglio macerato, e cotto nel latte. o nella decozione di fabina, o di faordio, oppure lo stesso aglio contuso, e impastato colla triaca, e colle foglie di affa fetida (a); e certamente tali rimedi acri, e calefacienti poffono eccitare una più pronta suppurazione, ma è anche facile a capire, ch'effa con tali rimedi dovrà produrfi con maggiori dolori . Fabrizio Secondo IL-ILDANO (b) raccomanda, che fenza afpettarne la fuppurazione perfetta, ammollito po' poco il dito col latte, in cui fianfi fatti cuocere fiori di camomilla, e di melitoto, semi di fiengreco, e di pomi cotogni, fi tagli a poco a poco, e fuper-

DANO.

<sup>(</sup>a) La pianta dal nostro volgo, e qui dall' Autore chiamata affa fetida e il chenopodium vulvaria del LINNEO ( Systema natur. tom. 3. pag. 195. ), offia l' atriplex facida di Gioanni Bauino ( Hiftor plantar. tom. H. pag. 974. ). Vedafi la pag. 197. del tom. H. della Flora Pedemontana del nostro illustre ALLIONI n. 2014.

<sup>(</sup>b) Observas. Chirurgiear. centur. 1. observ. 97.

fuperficialmente la cute, finchè fi vedano alcune macchie rubiconde, dalle quali fiilli una
materia roffigna, e fottile, poi vi fi applichino
compresse imbevute nello fpirito di vino, nel
quale sind disciolta della risica, e dasficura, che
in questo modo senza fuppurazione si possono
guarire panerecoj, credi io, della prima spezie,
accompagnati eziandio da gravi accidenti, com
erano certamente quelli, de quali a questo modo curati ci ha lasciate le storie.

Cura particolare di quello della prima spezie,

146. Nella prima spezie di panereccio (140) non di rado fuol elevarsi alla punta, ed ai lati del dito una vescichetta piena d'una materia roffigna, o citrina, della quale proccurando l' evacuazione, mirabilmente scemano gli accidenti; ma se la infiammazione si avanzasse alla suppurazione, fi potranno applicare gli empiastri diaquilon delle mucilaggini, di meliloto, o di altea; e quando in alcun luogo vedafi raccolto alcun poco di marcia, quivi tosto si dovrà fare l'apertura, o dilatare quella, che si fosse fatta spontaneamente, se sosse troppo piccola, perchè la rigida cute del dito non avesse potuto rompersi sufficientemente : che se il malato si opponesse a tale apertura, o dilatazione, converrebbe avvertirlo, che ne potrà accadere perfino la carie dell'offo.

de.

147. Se il panereccio fosse della seconda spezie (140), bisognerà recidere l'unghia, perchè non faccia pressione, no limpedisca l'uscita della materia: si taglierà ai lati, alla radice, od in mezzo, o medesimamente si separerà tutta intera, secondo la sede, e l'estensione del morbo, tanto più ch'ella dovrà per lo più cadere, dopo che il malaro avrà fosser i sossississimi dolori, perchè non su separata dapprincipio, con pericolo innoltre che la marcia abbia guastata la fottopossa falange. Dopo avere in patre recisa, o portata via intera l'unghia, si applicheranno rimedi, che possano eccitare la suppurazione, come il balfamo dell' ARCEO, l' unguento basilico, o altri fimili co' fovranominati empiastri (146).

148. Ma se il panericcio fosse della terza spe- Della ura zie (140), il che si conoscerà dall'acerbissimo dolore ofteocopo (143), non bisognerà aspettarne la perfetta suppurazione, anzi, ancorchè immaturo, dovrebbe aprirfi, penetrando col ferro fino all' offo, finchè ne fia recifo il perioftio; che un'apertura, che non vi pervenisse, sarebbe affatto inutile. Quantunque poco, o nulla n'esca di materia, nulladimeno, tolta la continuità del periostio, come nelle ferite del capo. quando è teso, ed infiammato il pericranio. colla semplice dilatazione i sintomi si acquetano.

149. Nel fare quella dilatazione (148) alcuni Autori raccomandano di farla ai lati del dito. per non offendere i tendini del sublime, e del profondo, la quale attenzione certamente converrebbe, se il tumore fosse alla prima, o alla feconda falange; ma quando foffe full' ultima alla punta del dito, si potrà francamente tagliare in mezzo, non effendovi più pericolo, che fi offendano que' tendini, il folo tendine del profondo giungendo fino alla base di quell'ultima falange, ma non fino alla fua punta. Bifogna tagliare francamente, e fermamente, per effere ficuri di avere inciso il periostio; che altrimenti per le graffiature, che si facessero a quella membrana, gli accidenti piuttofto crescerebbero. che diminuire. Quando l'infiammazione, e il sumore fono alla prima, o alla feconda falange. fe', fatta ad un lato l'apertura, gli accidenti non iscemassero, se ne dovrà fare un'altra simile all'altro lato, che a questo modo sarà BERTRANDI TUM. TOM. I.

tagliare

interamente tolta la tenfione del periostio, cas gione di tutti que' fintomi.

Medicazione da farfi dopo recifo il periofio. 150. Dilatato il umore, e recifo il periodio (149), se ne medica poi il sondo, come si sa nelle serite con iscopertura dell'osso come si sa nelle serite con iscopertura dell'osso come si trovasse carioso; avvertendo però, che l'ultima s'alange, quando è cariosa, piuttosso si seriosa, più seriosa, più seriosa, più seriosa, più seriosa, più seriosa si seriosa si suma seriosa si suma si suma si suma si seriosa si suma si su

Cura delle earoncole fopravvegnenti ai panereccj.

curarne la totale separazione. 151. Dalle aperture fatte nell' una, e nell' altra spezie di panerecci (146. e seg.) suole pul-lulare una carne sungosa colla forma di caroncola, la quale occupa principalmente i lati dell' unghia. Si dee essa consumare co' cateretici. quali sono l'alume, il vetriuolo, i precipitati mercuriali, il verderame, l' unguento egiziaco. il mondificativo di apio, e fimili; oppure fi dovrà recidere, toccando poi il luogo reciso colla pietra infernale, o applicandovi filaccica intrife nell' acqua di calce, per impedirne la nuova vegetazione, che suole sovente accadere, onde fi debba più d'una volta recidere, e cauterizzare. Ceffata la pullulazione, fi useranno l' unguento di tuzia, o l'empiastro diacalciteos. E se si vedesse, che l'origine di quella caroncola dipendesse dalla pressione dell' unghia, que-

<sup>(</sup>a) Vedasi nel Tratt. delle ferite il cap. delle ferite del capo.

<sup>(</sup>b) Vedafi nel Tratt, delle ulcere il cap, delle ulcere

sta si dovrà tagliare o in parte, o affatto; che altrimenti non cesserà di pullulare.

152. Quantunque negli Autori d'ogni fecolo si leggano offervazioni di panerecci, che cagionarono cancrena, e morte, i quali perciò dovevano certamen'e effere stati della quarta spegie (140), nulladimeno il GARENGEOT fu il primo, che ne ha meglio dimostrata la sede, ed insegnatane la cura, nè potremo far meglio, che di trascriverla: " fi dovrà primieramente , aprire quel piccolo tumore, che è verso la punta del dito, fotto il quale per lo più fi ", sente la materia; il taglio si farà in lungo . , fino che fi abbia penetrato nella stessa guaina , del tendine, e ci accorgeremo di avervi , penetrato, vedendo uscire una linfa rossigna, ,, e giallognola con qualche instantaneo allevia-" mento de' dolori , i quali però non tardano " a ritornare egualmente forti . Può accadere . , che pel furore del morbo crepi fenza taglio ,, la guaina steffa, ed allora dalla screpolatura " esce una sostanza fungosa, e rossigna, dotata ,, di squisitissimo senso. Questa non si dee ta-, gliare, infino a tanto che non fiafi tolto lo " strangolamento, che vi fa al di sotto la stessa 22 guaina.

Del panereco cio della quarta spen tie.

"" 153. Perlaqualcola entro quell' apertura
"" 153. Perlaqualcola entro quell' apertura
"" (152), comunque sia essa sia tata ast'antrodurtà una tenta scanalata, che si spingora
"" oltre la prima angustia, che suol essere all'
"" internodio di sotto, e strisciando lungo la
"scanalatura della tenta un gammautte, che vi
"" appoggi col dorso, si taglieranno integumenti,
"" e guaina fin oltre quell' internodio, e qual"" e che volta nel prosondo vi si scorge una
"" materia crassa, che era la cagiona congiunta
"" del male. Se quella materia qui non fi trova,
"" del male. Se quella materia qui non fi trova,
"" del male. Se quella materia qui non fi trova,
"" ole si cidenti diminuiscono, si seguiera a
"" pingere

Modo di tagliare la guaina de' tendini flessori delle dita lungo il dito. " spingere oltre la tenta, e a tagliare, sino " che appaja la fede del morbo; e fe fi dovesse , tagliare fin fopra la metà, o fino al princi-" pio della prima falange, il taglio dovrebbesi , poi continuare per qualche linea fin fopra la , mano stessa, ove la guaina molle, rallentata, ., e tenue, potrà meno cagionare strangolamento. ., 154. Fatta questa dilatazione (153), si ta-" glierà quella fostanza fungosa (152), che al-

Lungo la palma.

" cune volte si trova per tutta la lunghezza del ,, tendine. Che se non si fosse ancor trovato " il fonte del morbo, fi continuerà a spingere " la tenta fotto la guaina lungo la mano steffa, " e si dovrà forse penetrare sino all'avan-brac-, cio; concioffiachè in questi casi suol essere " fuppurata quella pinguedine, che è tra il mu-" scolo pronator quadrato, ed i flessori delle ., dita. Si recide adunque in simil caso per " tutta la lunghezza della mano, e giunti al ,, legamento anulare interno del carpo, vi fi ", farà passare sotto la tenta, facendo piegare " la mano, perchè le parti meno tese, meno " anche refistano, e sentita col dito la punta " della tenta, che passò già oltre il ligamento. ", ivi si dovrà tagliare, ed aprire, spingendo " la tenta appoco appoco semprepiù in avanti, " ficche fi possano allargare, e spartire con , leggierezza que' tendini, e scoprire l'ascesso, , che farà quivi fotto, il quale alcune volte , è affai grande. Perchè il tumore, e la tenfio-" ne delle parti qualche volta non cedono, , non fempre è possibile di far penetrare la ,, tenta fotto quel ligamento; allora il Cerufico, " conoscendo, che in quel luogo dell'avan-" braccio vi debb' effere ascesso, taglierà tra " il margine interno del radio, e l'esterno de' " muscoli i soli integumenti universali, poi col

All' avanbraccio.

dito indice cercherà l'ascesso; conciossiachè.

operando altrimenti, potrebbe effervi pericolo ,, di offendere i muscoli, se prima non si fos-, fero ben distinti, e separati: trovato l'ascesso, " fi dovrà recidere la tunica cellulofa, che " facesse argine, e subito vedrassi la marcia a , uscire. Ciò fatto, se si è potuto passare colla tenta fotto il ligamento anulare, vi dovrà anche paffare un fetone, per cui fi poffa meglio " espurgare quel fondo, e sar colare la materia, , che quivi fotto fi potrebbe raccorre; e ancorchè non si avesse prima potuto passare " colla tenta fotto quel ligamento, aperto poi, ,, ed evacuato l'ascesso, le parti cedono mag-" giormente, ficchè non fia allora difficile di

, paffarvi ugualmente il fetone .

" 155. Non fempre però con queste dilata-" zioni (153., 154.) gli accidenti cedono, , anzi alcune volte diventano fempre più mi-, naccianti; ed allora l'ultimo rimedio è di , tagliare il tendine del dito malato vicino alla " parte muscolosa, anzi la tensione dipendendo ,, in parte dallo strangolamento, che fa alle , parti foggette il ligamento anulare, perchè , non può cedere, nè rilaffarfi, egli è anche ,, talvolta necessario di reciderlo, massimamente , che farebbe poi ugualmente corrofo dalla , materia, che vi si fa sotto. In caso della " recifione di questo ligamento, si dee tenere ,, la mano sempre piegata, non solamente per-, chè fe ne faccia più facilmente la riunione,

, ma anco perchè i tendini non fi spartano , ., nè fi allarghino. 156. Se nel tempo delle dilatazioni foffe ac-

caduta emorragia pel taglio di qualche vito, fi dovrà preferire l'allacciatura; che le compressioni? e gli astringenti in questo caso di grave infiammazione potrebbero fommamente nuocere. Se vi iono, o fe si faranno ascessi in ahre parti

In che cafo debbanti recidere il tendine, e il ligamento anulare.

lungo l' avan-braccio, o lungo il braccio, tofto fatta la suppurazione, si dovranno aprire: le piaghe si medicheranno co' digestivi, e si userà la fasciatura a 18. capi (a). Quando lungo l' avan-braccio, ed il braccio vi fosse; come suol fuccedere, il flemmone suffocativo, si faranno le scarificazioni, e si useranno que' rimedi, che abbiamo proposti trattando di quel siemmone (88. e feg.), altrimenti vi potrebbé accadere la cancrena, onde si dovesse fare l'amputazione dell' articolo, se pur sosse possibile; che sovente, quella fi ftende fino alla fpalla. Quando fi è dovuto tagliare il tendine vicino al fuo corpo muscoloso (155), soglionsi fare spandimenti di materia lungo, e fotto quel tendine, i quali difficilmente si espurgano, se quello non si taglia anche dall' altra parte, per separarlo affatto (b) .

Per

(a) Vedasi nel Tratt. delle fratture il cap. delle fratsure complicate, nel quale questa fasciatura è descritta. (b) Quafi tutti gli Scritiori parlano comunemente foltanto de' panerecci, che accadono alle dita della mano, quan che questa malattia mai non accadesse alle dita del piede, anzi l' ASTRUC ( Traité des tumeurs, & des ulceres tom. 1. pag. 161. ) asserisce pofitivamente, che mai non viene il panereccio alle dita del piede. Ma l' Autore del libro della cura delle malattie citato qual testo di lingua dai Compilatori del Vocabolario della Crusca così lo definisce: Il panereccio è una postema, che nasce nelle dita delle mani, e delli piedi alle radici dell'ugne; e che questa postema possa nascere, ed in realtà nasca anche alle dita de' piedi , l'esperienza giornaliera lo dimostra , maffime ne' villani, che camminano fcalzi, addivenendo afsai fovente, che o da fpine, o da festucho fiano loro punte le dita de piedi, o altrimenti offese da altre cause esterne, od interne, dalle quali siano poi prodotti i panerecej dell' una, o dell' altra spezie. La firuttura della parte essendo la stessa, che nelle dita della mano, la cura ne farà anche la medefima Per finire l'ordine dei tumori flemmonosi, vi refterebbe ancora da trattare dell'ottalmia, dell'orcipiolo, dell'egilope, e della paratilde; ma dei tre primi si parlerà nel Trattato delle malattie degli occhi, e dell'ultimo in questo stesso Trattato coll'occasione, che dovremo ragionare dell'eguitate (326).



## DEI TUMORI CALDI

ORDINE II.,

Che tratta dei tumori erisipelatosi.

157. A Bbiamo detto (65), che i numori flemmonosi hanno la loro sede nel tessuto cellulare fottocutaneo, o delle áltre parti ancor più profonde: gli erifipelatofi all' opposto sono tumori infiammati superficiali, ne' quali il sangue è con forza, e in copia eccessiva spinto, e raccolto ne' vafi fanguigni cutanei, e più o meno anche travafato nella teflitura cellulare della cute medefima: in quegli il color rosso della parte infiammata è costante, nè svanisce colla pressione del dito ( 67., 70.); in questi quel colore è meno perfistente, da che la parte si fa quasi bianca, quando fi comprime. Molti fono i generi de' tumeri erisipelatosi, e soglionsi diftinguere in esterni, ed interni. Noi parleremo folamente degli esterni, che sono i soli, che appartengono alla Chirurgia, tali fono la risipola, il carboncello, le afte, le buganze, l' intertrigine, l'erpete, la rogna, il lattime, e tutti gli altri tumori infiammatori della cute . Della

Natura, divisione, e nomenclatura de' sumori drisspelatosi.

### Della Risipola.

S. I.

Definizione, e caufe congiunte della rifipola.

158. La Risipola detta da' Greci, e dai Latini eryfipelas (a) è un tumore infiammatorio. superficiale, cutaneo, di un color rosso più o meno vivo, qualche volta dilavato, e giallognolo, che colla pressione del dito svanisce, e quella tolta, subitamente ritorna. Per lo più occupa un' ampia superfizie, e produce un dolore urente, pruriginoso. Essa è ne' casi cerufici (157) la infiammazione propria della cute . quando alcuna cagione interna, o esterna ha spinto con forza il sangue in que' vasi pallidi . de' quali abbiamo parlato, trattando de' tumori infiammati in generale (57). La copia di questi vafi nella teffitura della cute debb' effere grandissima, dappoichè essa per le fregagioni, pel calore, pei violenti muovimenti, e per le pafsioni dell'animo diventa così facilmente rossa, e s' infiamma. Che anche in questo caso il fangue possa essere alcuna volta sparso nella cellulofa (157), ce lo dimostrano le macchie, e strisce irregolari , quasi suffusioni , che in tali sumori sovente si osservano, le vescichette, che vi si producono, la desquamazione, che ne segue della cuticola, e la pronta trasmigrazione della malattia da una parte all'altra quantunque lontana; nè la cute è altra cofa, fuorchè una denfa fostanza cellulofa.

159. La

<sup>(</sup>a) L'etimologia del vocabolo eryfipelas viene fecondo GALENO da enutros roflo, e dall'avverbio pelas quafi, come fe fi dicefic tumore quali roflo, otendente al roflo, perchè veramente il colore di queflo tumore è piutrofto fimile a quello delle rofe; guindi alcuni gli hanno dato il nome di rofa;

150. La copia del fiero, con cui fono mescolati i globi rossi, è la cagione del color rosso dilavato, o giallognolo della refipola (158): quanto perde di profondità, tanto acquista di larghezza, facendosi solamente in quel genere di vafi (158) il raccoglimento del langue, ed avendo negli altri maggiori facilissima la strada, nè essendo assai denso, perchè sì facilmente vi fi possa arrestare, onde forse anco quella facilità, che ha l'umore di ritolversi in una parte, per nuovamente comparire in un'altra: la infiammazione erifipelatofa fulle membrane de' visceri, e sul periostio si sa egualmente ne loro fottilissimi vasi superfiziali, mentrecchè il flemmone suole più o meno occupare la soda massa degli stessi visceri. Se per cagione interna accade la risipola, sempre precede la febbre. perchè dee precedere quel maggior muovimento. per cui i globi rossi del sangue passino in maggior copia in que'vasi (158), e perchè la materia della risipola è sempre per sua natura irritante, effendovi più foggetti quelli, che hanno un fangue fottile, molto divifibile, biliofo, e zulfureo.

Spiegazio-

160. La risipola si suole distinguere in beni- Sua distingna, e in maligna: quella è la descritta nella zione in definizione (158), i cui fintomi fono affai miti, e limitati, essendo prodotta da un umore men cattivo, e terminando quasi sempre colla risoluzione.

161. La maligna (160), che gli Antichi chia- E in malimarono fuoco facro, occupa le stesse parti (158, gna. 159); ma fovente è accompagnata da puftule icorose, il calore n'è maggiore, il dolore acre urente, il colore molto più giallo, e talvolta fosco, la perturbazione interna, e la febbre sono anche molto maggiori; imperciocchè questa spezie di risipola sempre dipende dalla diatest

Descrizio-, ne ti queft' ultima .

morbofa di un fangue fulfureo, biliofo, e putrefaciente; quindi precedono, o feguono naufee, vigilie, ansietà, dolore di capo, e sovente il delirio. L'ardore alcune volte diviene eccessivo. che pare, che abbruci, ond'è venuto il nome di fuoco facro: le pustule sono maggiori, o minori, più o meno sparse, alcune volte sono tanto piccole, che alcuni la chiamano risipola migliare; ma fovente crefcono, fi accumulano, fi screpolano, e si esulcerano, e n'esce un umore fetente, tenue, giallognolo, verdeggiante, od ofcuro, che infiamma, ed escoria le parti, fulle quali cade.

Perchè fia anche chiamata ferpiggine .

162. Questa risipola (161) non solamente ferpeggia ( onde alcuni la chiamano ferpentina, o serpiggine ) fopra la parte, ove dapprincipio è comparsa; ma più facilmente retrocede, e ritorna in parti lontane da quelle, ove prima fi vide. Alcune volte fi stende in una lunga striscia attraverso, o lungo il tronco, il collo, o altro membro, che gli Antichi chiamarono zona, o foster, che vuol dire vincolo, o cintura.

Zona, o So-Acr . fangue eftratto nella

rifipola ma-

Ligna .

Esame del

163. Il fangue in questa malattia (161., 162), secondo le offervazioni del celebre GORTER (a), non fi coagula, estratto ch'egli è, come nelle altre infiammazioni ( 70 ), ma rimane rubicondo, e totalmente fluido, il che dee dimostrare, che la materia di questa risipola sia veramente tenue, acre, irritante, saponacea. e putrida, per cui la concrezione del fangue, la quale dovrebbe altrimenti accadere pel fuo maggior muovimento, fia impedita. In fatti fe

Cofa indichi detto fangue .

> (4) Rapportate in più luoghi del fuo Compendia. della Medicina, e della Chirurgia repurgata,

fulla risipola benigna (160) si applicano rimedj

pingui .

pingui, oleofi, purrefacienti, essa diventa maligna: l'icore, che fgorga dalle offa cariofe, fe s' infeltra negl' integumenti comuni, colla fua acrimonia irritante vi produce una rifipola: lo stesso effetto vediamo prodotto dall'acre materia del cancro: negl' idropici, negli (corbutici) essa è sempre l'effetto d'una dissoluzione putrida degli umori, che suole terminare in can-

crena ( 235. )

164. La risipola benigna (160) suol essere di poco, o nessun pericolo, e facilmente si rifolve : l'altra può effere critica , o sintomatica, ed è sempre più o meno pericolosa, perchè fempre dipende, come dicemmo (161., 162., e 163.), da una pessima cagione interna; perlaqualcofa fi dee fempre temere, fe mai affatto retrocedesse, o si trasportasse ad una parte più nobile, e di maggior fenfo: può anche per la qualità urente, e putrefaciente degli umori facilmente passare in cancrena, tanto più se la parte, che occupa, era prima edematofa, come fi è detto (163) accadere fovente negli idropici, e negli scorbutici, oppure lascia un ulcere grondante una fanie, che difficilissimamente fi può mutare in buona, e schietta marcia: alcuna volta quello fpandimento fi fecca quafi come un'escara, e l'affezione erisipelatosa allora fi fpande ai lati, fi elevano vescichette, quindi fi screpolano, e formanfi quinci, e quindi ulcerette di quella forta.

165. L' una e l' altra risipola è stata da alcuni divifa in flemmonofa, edematofa, e scirrofa: chiamano rifipola flemmonofa quella, nella quale l' umore, che fa la cagione congiunta del tumore, sa. è in tanta denfità, e copia, che il colore n'è meno dilavato, e la fua maffa maggiore con qualche renitenza, e pulsazione. La edematosa Edematosa; è quella, in cui per l'abbondanza dell'umore

Propostico di amendue le spezie di rifipola.

Divisione delle due ri-Flemmono-

sieroso il colore è ancor più dilavato, il tumore cede maggiormente al tatto, e si scorge un maggiore inzuppamento linfatico.

E feirrofa .

166. La scirrosa non può esservi, se pure non s' intenda quella, che può sopravvenire ad uno scirro, la quale nemmeno può dirsi scirrosa: e veramente, s'ella è benigna, farà prodotta da un accrescimento d'azioni, che avrà spinto i globi rossi in quella quantità, ed in que'vasi, che abbiamo accennato (158), ed in questo caso essa farà come accidente allo scirro, ma pura, e schietta risipola. S'ella è maligna, già fi capisce come una materia tanto tenue, irritante, e putrefaciente ( 161., 162., e 163. ) non possa divenire talmente compatta, e inerte al muovimento, per raccoglierfi, fisfarfi, e inspessarsi, e così formare una risipola, la quale fi possa dire scirrosa, anzi coll'apparizione della risipola suole lo scirro cangiarsi in cancro.

Cura interna della rifipola benigna.

167. La risipala benigna dee curarsi, correggendo prima, o togliendo quella cagione interna, o esterna, che ha spinto in quella quantità ne' fottilissimi vasi cutanei, e nello stesso teffuto cellulare della cute i globi roffi del fangue (158). Giova la flebotomia, la quale si farà una o più volte, secondo le forze, l'età, e il temperamento del malato, e fecondo la quantità, il fervore, e la fede della malattia, gli si raccomanda la quiete dell'animo, e del corpo, gli fi proccura un ambiente temperato. e gli si prescrive una dieta umettante, e rinfrescante. Beverà copiosamente decozione di gramigna, di cicoria selvatica, di lastuca, di endivia, di borraggine, d'orzo, o d'avena, acqua col nitro, siero di latte alterato con alcune di quelle piante: si terrà il ventre libero con clisteri emollienti, e attemperanti, e con

qualche minorativo, massime se si sospettasse

qualche impurità nelle prime strade.

168. Se la risipola è sulla faccia, basterà Cura estertenerla coperta con pezzi di tela fina asciutti. folamente un po riscaldati al fuoco. Può anco guarire con que' foli rimedi interni (167) la risipola nelle altre parti, purchè siano ben custodite dall'aria fredda; ma, fe essa fosse flem- Della flema monosa (165), si potrebbono usare le fomentazioni con acqua, o decozione de'fiori di sambuco, con acqua di sperma di rane, o coll'acqua semplice mediocremente calda, a cui fiafi aggiunta poca quantità di spirito di vino cansorato.

monofa,

169. Se la risipola benigna fosse edematosa Dell'edemas (165), le fomentazioni dovrebbero farsi con acqua leggiere di calce, a cui, se sarà necessaria una maggior forza, fi aggiungeranno per ciascuna libbra due once di spirito di vino, alcune dramme di sale ammoniaco, o di sal gemma, o la seguente mistura, che è tanto lodata per questa spezie di risipola dallo SCULTETO (a).

RI. Lixiv. mediocr. e cinerib. farmentor. vit. lib. j. , nitr. drach. fs., fal. comm. drach. j., acet. vini optimi unc. j., misce .

Di questi liquidi tiepidi si possono inzuppare compresse a più doppi, che si cangieranno varie volte al giorno.

170. Quan-

<sup>(</sup>a) Descritta nel suo Armamentarium Chirurgicum observ. 98. pag. mihi 312. Lo Sculteto dice, che la composizione di questa mistura è stata comunicata allo Spigelio da un Chirurgo Tedesco, come un grandissimo secreto.

Cura interna della rifipola maligaa.

170. Quando la rifipola fosse maligna (161). critica, o fintomatica (164), la cavata di fangue non fi farà se non per l'urgenza de' fintomi infiammatori, che potrebbono essere insorti pel forte continuo irritamento prodotto da quella sì acre materia ( 161., 162., e 163.). Si fomministreranno rimedi interni attemperanti, che poffano correggere quell'acrimonia biliofa, come il siero di latte semplicemente chiarificato con qualche sugo acido, o alterato colla bollitura di foglie di lattuga, di borrana, di buglossa, di acetosa e fimili, delle quali piante si potrebbono anco prendere i suchi o semplici. o mescolati col siero, o con brodo magro, ed infulfo; fi beveranno lungo la giornata orangiate, o limonate tenui, allungate; si terrà pure il ventre libero con cristerj emollienti, e rinfrescanti, e la sera si prescriveranno emulsioni fatte co' quattro semi freddi, sal prunella, e sciroppo di viole mammole, e in questi case conviene maggiormente, il proccurare una leggiere evacuazione con manna fciolta nel fiero di latte, aggiuntavi qualche oncia di fugo di limone. I purganti irritanti fi deono affolutamente evitare. Qualche volta la natura indica doversi muovere il sudore, e allora giova bevere alcuna dose di acqua distillata di fiori di fambuco, o se ne prescriva il rob alla dose di una dramma femplice, o sciolto nel suco di fumaria, di acetofa, di dente di lione, di cicoria, o fimili. La dieta farà tenuissima, usando brodi leggieri fenza graffo, e fenza fale, minestre di vegetabili, come di lattuca, o portulaca , di farina d' avena ec.

Cura efter

171. Alla parte bifogna temperare l'irritamento e l'ardore. Se le puffule, e le vescichette s'innalzano, e fi ammucchiano (161), conviene aprir le maggiori, per dar efito a quell'.

quell' icore, il quale non solamente nuoce per la irritazione, che ivi produce, ma perchè potrebbe anche retrocedere. Per quella indicazione servono i sughi di lattuga, di porcellana, di piantaggine, di embilico di venere ec., applicandovi compresse bagnate di questi sughi po' poco rifcaldati; alcuni ne fanno catapla[mi con mollica di pane secco. AEZIO (a) loda moltiffimo il fuco acerbo delle uve immature mescolato con quello di portulache verdi, per far un cataplasma con farina d'orzo finissima e vuole, che si applichi freddo, anzi si tolga, e si rinfreschi, tosto che pel calore della parte fiafi riscaldato. Ma però nel sommo furore delle vescichette, e della turgidezza del zumore meglio convengono i fomenti tiepidi, come l'una, o l'altra delle feguenti formole:

Rl. Flor. melilot., fambuc. a manip. j. . papaver. hortenf., lentis palustr., plantag., nymph. a manip. ij., coque in aq. commun. s. q. colatur. unc. xx. adde acet. rofat. unc. ij. applicetur tepide . Oppure

R. Flor. Sambuc., hyosciam, melitot. papaver. rhoead. a pugill. jraq. commun. lib. io. coque vafe claufo; colatura adde acet. sambucin., rosac. a unc. ij.

Il fervore, ed il calore alcune volte fono tali, che si videro in poche ore divenire secche, ed arefatte le molli foglie cotte di lattuga, e di ninfea, che vi si erano applicate.

172. Nel fommo grado della rifipola mali- Cura eftergna critica, o sintomatica suole alcuna volta na ucua ripote acca-

<sup>(</sup>a) Tetrabibl. IV. fermon. 2. cap. 5.

accadere, che la parte gonfi enormemente, e minacci foffocazione, e cancrena: in fimile cafo fi debbono fare alcune scarificazioni non troppo profonde, per le quali non folamente fi toglie il troppo stiramento, e quasi strangolamento. ma anche si apre una maggiore strada agli umori, per cui fi evacuino. Nello stesso tempo fi deono continuare quelle fomentazioni (171). finchè dura il fervore della febbre, l'urente calore alla parte, e finchè l'umore con copia, e con impeto continua a portarvifi; concioffiachè, finchè durano que' fintomi, evvi sempre pericolo di retrocessione, o che infine la parte si cancreni. I rimedi topici veramente astringenti, ed efficacemente repercussivi sono in quel tempo pericolofissimi; perchè con essi o si sossoca la parte, fiffandovi la materia, o se ne impedisce la crist , sicche si faccia internamente maggiore tumulto.

Suoi fintomi minaccianti.

173. E se questo accade (172) o per l'eccessiva soprabbondanza, e veemenza dell'umore, o per qualche errore commesso, allora la lingua diviene fecca, gialla, nera, adufta, ed aspra con una sete intollerabile, il malato sente un grandissimo calore tanto più di cattivo indizio, quanto più interno lo fente, parendogli fredde le parti esterne (72), la respirazione diviene faticola con un certo anelito inquietissimo. e la febbre acutiffima, l'orina è tenue, roffigna, e gialleggiante, oppure (ciò che è ancor peggio ) la pura, e schietta bevanda si piscia, perchè i rimedi non hanno potuto mescolarsi col fangue, pulsano, e si convellono gl'ipocondri, i giogoli, le tempia, ed altre parti, la cute è arida, il sudore è tenue, e sparso a gocciolette, il malato fi lagna con lunghi, e stentati gemiti ee. Vi accenno questi gravi minaccianti fintomi, perchè non ne fiate forpresi, quando li vediate accadere ad una rifipola, che dal volgo fi crede una malattia leggiere.

174. Quando coll'uso de'rimedi interni, che abbiamo sopraccennati (170), l'acre umore sia stato attemperato, e corretto, onde il tumore della parte diminuisca, e quivi l'impeto di quell' umore fia acquetato, cominciandofi già a vedere squame fursuracee di cuticola, le quali si separano, lasciando intera la cute, allora si faranno bagni d'acqua di piantaggine, di sperma di rane, di rofe, nelle quali si abbia sciolto po' poco di alume, o di zuccaro di faturno, o alcune gocce di aceto litargirizzato, del rofato, e fimili : atcuni si servono anco di una leggierissima dissoluzione di vetriuolo nell'acqua di rose, o di qualche goccia di liquor di saturno nella stessa acqua, applicandone prima fulla lingua, per fentire se non sia troppo forte, ed astringente.

175. Se coll'uso di questi rimedi (174) le Comesicopustole, e le escoriazioni non si essiccano, è fegno, che vi è ancora parte di quel fermento nel sangue, il quale si dee continuamente combattere; e se vi fossero segni di affezione scorbutica, si deono prescrivere gli antiscorbutici più efficaci, come i fughi, le macerazioni, o i destillati di nasturzio acquatico, di beccabonga, di coclearia, di trifoglio fibrino, di scorza d'aranci, e fimili, come meglio infegneremo nel Trattato delle ulcere. Infine quantunque que' rimedi esterni ( 171., e 174.) siano tali , che possano attemperare, e correggere l'umore. che viene alla parte, onde meno irriti, e meno esulceri, se però non se ne toglie il sonte, sovente il Cerufico non meno, che il malato fono infastiditi dalla pertinacia di queste ulcerette.

176. Efausto quel fonte (175), queste facilmente fi seccano o da se stesse, o con alcune BERTRANDI TUM. TOM. I.

Ouando debbanfi ufare i forti rifolventi, e

nofca, che vuolfi continuare 1' uso de' rimedi interni , e dî quali .

Quándo convengano le pol-veri efficcanti.

polveri incrassanti, che vi s'inspergano, come sarebbe la seguente:

Rl. Cret. alb. drach. fs., fiat pulvis.

Gli oleofi, e pinguedinofi fono perniciofissimi, onde nem neno possiamo far uso di alcun olio, e grafso per fare unguento con quelle polveri.

### Del Carboncello.

# S. 11.

Definizione, etimologia, e deferizione del carboncello.

177. Il carboncello detto da' Greci antrace (a) è un tumore arido e duro con gravillima infianimazione erisipelatosa, sovente mista colla stemmonofa, di un color rofto, fosco, o livido con istrisce giallognole, e tutto lucente, poco clevato, e fermamente fisso alle parti soggette, accompagnato da acerbiffimo dolore, come fe la parte fosse abbruciata da un carbone acceso, onde gli è stato dato quel nome: esso è per lo più cancrenato con vescichette nere, o cinericce, oppure prefenta una vera escara cancrenola " Il malato fuole avere un' ardentiffima febbre, vigilie, nausee, vomiti, alito fetente, inquietudine, difficoltà di respiro, lingua gialla, o nereggiante, voce rauca, dolori di testa, vertigini, tremore, palpitazioni di cuore, fincopi, sudore abbondante, e freddo, fecce biliofe, orine fottili, e crude.

Diffinzione de' carbonselli in 178. Questi sintomi sono in maggiore, o minor numero, ed intensità secondo il surore del carboncello, non essendo tutt' i carboncelli di

<sup>(</sup>a) La parola Greca antrax vuol dire la brace, il garbone acceso,

di eguale veemenza. Perlaqualcofa alcuni gli hanno distinti in benigni, maligni, e pestilenziali. Chiamano benigni quelli, che hanno in fommo grado i fintomi del furoncolo (131., e 133), e terminano screpolandosi con qualche fessura cancrenosa nel mezzo: il maligno è quello, che abbiamo descritto (177): il pestilenziale quello, che accade in tempo di peste.

179. Tutt'i fintomi del carboncello (177) procedono da un fangue acre, che diventa putrefaciente, il quale irrita, e produce una fomma tenfione fuffocativa, che quali sempre fa la cancrena; quindi fi possono anco comprendere tutti gli altri sì delle stesso tumore, che gli univerfali, quando massime si consideri, che quell'umore acre finalmente produce una dissoluzione putrida della massa generale, per la quale per lo più i malati muojono.

180. Quanto dunque più acre, e putrefa- Pronoflico: ciente è la maffa degli umori (179), tanto più è pericolofo il carboncello, e maggiormente s' esso è in parte di struttura delicata e di senso squisito, il tumore profondo, ed ampio coi maggiori fegni d'irritamento, e di suffocazione, i quali possono anche essere intensissimi per la fola ragione delle parti affette, senzachè corrifpondano con eguale intenfità i fintomi univerfali. In occasione di peste il DIEMERBROECK offervò (a), che i carboncelli erano più pericolofi dei buboni, i quali avvenissero agli emuntorj (91), e che erano tanto più pericolofi, quanto più tardi apparissero, o gli uni agli altri fi succedessero. Più facilmente, e più prestamente fi curavano que' carboncelli, che in due o tre giorni erano circoscritti, e terminati con

Maligni, peftilene

> Spiegazio. ne de fintomi del car-

<sup>(</sup>a) Vedafi il già citato fuo libro de Peffes-

un cerchio rosso, ed erano assolutamente mortali quelli, che si estendevano con istrice nericce, e cancrenose, come anco quelli, che nel principio si fermavano, poi sparivano, indi ripullulavano.

Cagioni .

'181. L'eccessivo calore, gli alimenti acri, putrefacienti, la bile servida sono le principali cagioni antecedenti del carboncello. Accadono per lo più ai villani nel servore dell'ardentissima state, massime se mangiano pepi lunghi, aglio, cipolle, e simili altri alimenti, e abbiano mo molti esemp di carboncelli accaduti a molte persone in uno stesso e mangiata carne di animali infetti, o morti di malattia putrida, e veramente tutti gli alimenti putridi hanno una veementissima forza settica, e velenosa (a).

182. I

<sup>(</sup>a) I carboncelli fono frequenti nelle campagne, non folamente quando si mangia la carne di animali infetti, o morti di malattia putrida, ma anche pel folo scornicarne i cadaveri. Quindi ne sono sovente attaccati i Beccaj, e ancor più i Maniscalchi, quan-do introducono le mani nell'intestino retto, o nella bocca delle bestie ammalate, o pel sangue, che loro ipruzzi addosso nel salassarle, o nel loro fare qualche altra operazione. Una donna ne fu forpresa alla fronte, perchè le faltò in quella parte una goccia di fangue, mentre fi fcorticava un cadavere infetto. Noi vidimo morire in 24. ore un Manifealco d'un carboncello venutogli fotto l'ascella destra, per aver affiffito all'apertura di un cavallo morto della fquinanzia cancrenosa. Le mosche stesse, e i tavani, che vanno a succhiare tali cadaveri, se mordono poi poco dopo gli uomini, loro possono comunicare il veleno, come è stato da noi osservato in due contadini, che morirono di carboncelli alla faccia, per essere stati morficati dai tavani in una putrida epi-2007ia, che nel 1780. attaccò nel Fauffigny principalmente i muli,

182. I rimedi interni debbono esser alessifarmaci, ed antisettici. Poco o nulla giova la cavata di sangue, quantunque i sintomi della instammazione siano alla parte sortissimi. Si sono veduti carboncelli retrocedere, per avere più d'una volta cavato sangue. Giova piuttosso il promuovere co' bezoardici un leggiero studore.

183. Se il carboncello è circofcritto, e terminato in un certo spazio, se ne dee scarificare la parte, ov'evvi fegno di cancrena, poi lavarla con officrato, con acqua di calce, o con acqua, e spirito di vino insieme mescolati, sinocchè il sangue cessi di colare. Ciò satto, si dee cauterizzare. Alcuni per quest' effetto propongono l' empiastro magnetico arsenicale (109), altri il butiro di antimonio , gli spiriti ardenti ec. Ma dee certamente preferirsi il caustico attuale. che agifce più prestamente in quella quantità. che si stima necessaria, e niente può trasmettere al sangue: con esso l'escare cancrenose de carboncelli, che sono fetide, mucose, e molli, meglio fi efficcano, e fi terminano, e perchè fono fatte da una sostanza morta, non danno fegno di fenfo, finchè l'ustione non è penetrata alla parte viva . Perlaqualcofa infino a tanto che il malato non dia fegno di questo fenso, e n'esca il puro, e fluido sangue, si dee continuare a bruciare più o meno profondamente, si applicherà poi l'unguento digestivo sopra la parte abbruciata, come farebbe quello, che abbiamo proposto pel bubone pestilenziale (109), oppure il seguente:

ura efter-

Rl. Butyr. recent. unc. jfs., ung. bafilic. drach. vj., theriac. drach. ij., cum vitello ovi misce, fiat digestivum.

Se il carboncello fosse veramente pessilenziale, il DIEMERBROECK (a) loda molto quest'altro:

R. Scord. pulverat. drach. ij., vitellum unius ovi, terebinth. venet., mell., ung. Apostol. a unc. s., misce.

Si applicheranno nel tempo flesso cataplasmi ammollitàrio, i quali diminuticano la somma tenfione, che vi può essere alla parte: e perchè è necessirai una pronta, ed abbondante suppurrazione, se l'essera per la sua durezza, e profondità tardasse a separassi, le fi faranno scarificazioni, e si pezzi più mobili si separeranno.

Quando, come, e fin dove debbanfi fare le fearificaziosi. 184. Alcune volte i carboncelli, che sembravano terminati in un certo spazio, si vedono dilarafi impetuosamente, e spanderi, sperlaqualcosa lo SCREIBERO nel suo Trattato della pesse (b) raccomanda, che le scariscationi si continuino qualche poco sin sopra la parte sana; il che decsi assolutamente sare, quando la infammazione molto si spande, ed e veramente suffocativa; imperciocchè, se per tutta la sua ampiezza quelle non si fanno in modo, che penetrino almeno sino alla sostanza adiposa, facilmente ne avverrà la cancrena, e lo sfacelo (132).

Medicazione da farfi dopo le scarificaçioni,

185. Fatte in tal modo le fcarificazioni, convengono poi quelle fomentazioni, che abbiamo accennate pel flemmone fufficativo (90), oppure la seguente;

Pl. Sal. absynth. unc. ss., herb. scord., stor. sambuc., camamet. a m. ij., aq.

<sup>(</sup>a) Loco citato. (b) Intitolato: Observationes, & cogitata de pessilentia, qua annie 1738., & 1739. in Ucrania grassata es. Berolini 1744. in 8.

aq. simplic: lib. z. ss. coquantur, & colaturæ adde spirit. vin, camphorat. unc. vj., theriac. unc. j.:

Si applicheranno compresse a più doppi inzuppate in questo bagno caldo, e si continuera, sinche sia folto il pericolo della cancena. Ma quando, non più vi sia quello sinigimento, che minacciava tussocarone, si useranno cataplassimi ammollitivi, oppure quello delle farine risolventi fatto colla decozione ammolliente. Avvertasi, che non dobbianno effere troppo solleciti a far separare l'escare, infino a tanto che i loro margini, che sono contigui alla parte sina, o infiammata, se ne scorgano divisi per una linea bianca, la quale denota la separazione del sano dal corrotto: altrimenti vi sarebbe pericolo di fare siendene la cancena più oltre, come in altro luogo dimostreremo (252., e seg.).

186. Quando l'escare stano cadute, alcune volte il fondo dell'ulcere, che vi rimane, è fordido, e mucoso, qualche volta anche con carne lussure propositione della discreta della con quello degli Apostoli, o aggiungendo al digestivo alume polverizzato, polvere di genziana, o di aristolochia, nè mai si useranno i corrossivi, nè i precipitati mercuriati, i quali possono facilmente risvegliare l'orgasmo della

parte.

187. Come ne' furoncoli violenti (135., 136.), egualmente ne' carboneelli; quantunque la infiammazione, che era molto eftela, la ridotta a certi limiti; il centro però, e il fondo del tumore rimane duro co' margini duriffimi. Perciò convengono allora i dieglivi più forti, e gli empiafiri gommofi, e mucilagginofi infieme mefcolati, onde eccitare un'abbondante fuppurato de C. 4. Zione, 2.

Dopo cadute l' escare.

Ventriglio del carbancello zione, dopo la quale, come ne' furoncoli, alcune volte accade, che fi fepari un mucchio di foftanza cellulofa, o membranofa, che è quafi il nocciuolo del tumore, e rimanvi alcun pezzo d'integumenti per un maggiore, o minore fipazio diffaccato dalle parti foggette.

Non deefi ragliar la cute diffaccata dalle parti foggette,

188. Il LE - DRAN ci ha date due offervazioni, che sono la xIV., e la xV. del I. Tomo (a). dalle quali fi vede, che non dobbiamo sì preflamente determinarci a tagliare, e separare, quanto vi è di cute sciolta dalle parti sottoposte, perchè ciò renderebbe la cura molto più lunga. La prima offervazione è di un carboncello, che si stendeva dalla nuca al mento, e per tutto il collo, e quindi dallo sterno all' omoplata. Effendofi separata un'escara della larghezza della palma della mano alla merà del collo, n'esci poi tutta la sostanza cellulosa, ficche resto scoperto tutto il muscolo platismamioideo fin dalle fue aderenze al mento, all' occipite, alle vertebre del collo, alla clavicola, e all' omoplata (b), n'esci anche tutta la so-

<sup>(</sup>a) Observations de Chirurgie, auxquelles on a joint plusieurs restexions en saveur des Etudians. Paris 1751. in 12. deux volumes.

<sup>(</sup>b) Le aderenze, che qui il le DRAN accenna del mulcolo platifiamioido alle vertebre del collo, e all' occipizio, fan vedere, che egli credeva, come noi pure famo inclinati a credere, e come l'Anatomia fembra dimoftrare, che i due mufcoli platifiamiodei, divenuti alla parte pofteriore del collo aponemotici, fi congiungono il deftro col finifiro, attaccandofi al ligimanto ervicula pofteriore, che que di aponemo fi continua ad allargarfi in fu alla nuca per congiungerfi con quella del trapezi, e pofcia, dopo aver coperto i mufgoli occipitali, uniriti alla parte pofteriore della enfia aponemotica del cranio, nello fetso modo, che anteriormente gli fteffi mufcoli platifinamioidi non finificono al mento, ma fi allargano aponemotici fui maffetri, e fulle parotidi, per andar ad uniriti solla madefinia, cultia agli arcià ripomatici, ripomatici,

stanza adiposa, che trovasi tra i muscoli dalla mafcella alla trachea, e alla bafe della lingua. e tra le ghiandole che fono in quelle parti, dimodoche fi vedevano belli, e puliti tutt' i muscoli. Fu fatta un'incisione lungitudinale verso le vertebre a quegli integumenti così distaccatia perchè le marce potessero meglio colare, e colla fola applicazione di un esatto apparecchio il rimanente della cute si riuni colle parti soggette, e la cicatrice fu perfetta in due mesi e mezzo. L'altra offervazione è di un carboncello affai grande alla nuca, dalla cui apertura angusta esciva anche molta sostanza cellulosa; perlaqualcosa rimase distaccata dai muscoli nudi non poca quantità d'integumenti, i quali niente di manco hanno potuto contrarre nuova aderenza.

189. Quando i carboncelli minaccino di retrocedere, è necessario di opporvisi co' bezoardici, co' sudorifici, e co' cordiati. Lo SCULTETO (a) racconta di un carboncello pessitione i attorno l' ano, il quale retrocesso compari nuovamente a quella parte coll' applicazione di un ferro rovente. Pottebbono per la stessa agione giovare gli epispatici, o piuttosso l'applicazione, e lo strappamento delle coppette, e tutti gli empiassiri fortemente attraenti, come quelli, che abbiamo proposti pei buboni, e per le parotidi, che difficilimente suppurano (100., 101.)

Degli altri tumori erifipelatofi appartenenti alla Chirurgia fi parlerà ne' feguenti Trattati, come dell' erpete, della rogna, del lattime, e delle buganțe in quello delle ulcere, delle afici in un capitolo delle malatite della bocca nel Trattato delle malatite degli occhi, dell' intertrigine in quello dell' arte offetricia ec.

DE'

Mezzi per

impedire la retroceffio-

ne del car-

<sup>(</sup>a) Armamentarii Chirurgici pag. mihi 43.

# DE' TUMORI CALDI

#### ORDINE III.,

Che contiene non poche offervazioni intorno alcuni ascessi interni, ai quali la Chirurgia può giovare.

Motivi, che hanno indotto l' Autore a trattare di quefti ascissi.

100. L'Arlando de' tumori in generale, fi fono rapportati i fegni, che indicano la terminazione di un tumore in ascesso, e quelli, che lo mostrano già fatto (17., 18.): ivi pure sonosi insegnati il tempo, e i modi di aprirlo, fatto . e conosciuto che fiasi ( 25. ad 39. ). Inoltre nell' esposizione di ciaschedun tumore infiammato in particolare fonosi dati più spezialmente i necessari precetti circa i mezzi da preferirfi per tale apertura ne' diversi casi ( 102. . 109., 113., 114., 129., 135., 136., 146., al 156., e altrove), e dichiarati quelli, ne' quali quell'apertura deen o fare prematuramente, o ritardare, come pure le attenzioni da aversi nel farla. Ma que' fegni, e que' precetti riguardano quafi unicamente gli afcessi, che si fanno nelle parti esterne, nè sono sufficienti per far conoscere quelli, che si fanno internamente, e ancor meno, perchè se ne faccia una cura metodica. Egli è raro, che tali ascessi si manifestino con sensibile mollezza, e fluttuazione, il Cerusico dee piuttosto raccogliere i segni razionali, pei quali possa fondatamente conchiudere, o no della loro efistenza. Le parti, ove questi afcest interni poffono accadere , variano talmente

di struttura, d'uso, e di profondità, che, per curarli, tutti richieggono patticolari cautele. Questi sono i motivi, che ci hanno indorti a considerargli in tanti paragrafi distinti, dopo avere però prima esposti i segui ganerali, e comuni a tutti.

Dei segni generali indicanti la formazione degli ascessi interni,

#### S I.

191. L'ascesso interno o è la terminazione di un tumore, che ha preceduto nella parte, o la: materia purulenta ivi è stata deposta dalla massa universale degli umori, fenza che abbia preceduto alcuna malattia in quel luogo, dove fi può sospettare esservi un ascesso. Nel primo caso. mentre perseveravano i segni patognomonici di una frenitide, peripneumonia, pleuritide, o epatitide, il malato sentiva il martellamento, e la spinta dell'umore, il dolore, il calore, la gravezza, e lo stiramento in un determinato. e precifo luogo, più che in un altro della parte affetta con vari fintomi d'azione lesa, pervertita, o abolita, secondo l'uso, e la struttura di essa parte, e secondo la quantità del morbo. che troppo lungo farebbe di minutamente descrivere. In tutto il tempo della malattia non è succeduta alcuna evacuazione critica, anzi essa malattia durò affai con tutta la violenza, con cui era pervenuta allo stato. Le urine sono sempre state tenui, chiare, al più po' poco roffigne, senza deporre verun fedimento. Il sudore, quantunque talvolta copioso, e continuo, non fu di nessun vantaggio. Quindi, dopo lunghe, e gravi inquietudini, e vigilie, il malato viene inaspettatamente sorpreso da un rigore di freddo come di

Segni della formazione dell'afceffo interno confecutivo, a una maiattia locale.

di una febbre intermittente, dopo il quale succede un calore fecco, stanchezza, nausea, vomito, e fovente un fudore, che gravemente olezza. Sono diminuiti o poco, o affai il calore, il dolore, e il martellamento nella parte, ma n' è cresciuta la gravezza: continua poi quel calore secco con un polso per lo più frequente, celere, e minuto. Ritornano quindi i rigori di freddo, i quali fogliono più frequentemente forprendere verso la notte, ai quali poscia nuovamente succede più veemente quel calore secco, e questa è la febbre, che dicesi di suppurazione, perchè denota, che la prefente infiammazione interna si termina per suppurazione. Che se dopo tali sintomi, le urine, o le dejezioni del ventre non compariscono purulente, fi può con fondamento conchiudere,

Dell' afcesso interno fatto per metastass. che la malattia locale fia terminata in ascesso. 192. Quando allo incontrario questo si produce per una nuova, e subitanea suffione di umore in una data parte, o, come dicono, per metastasi (21), (il che suole principalmente accadere nelle malattie acute e maligne, biliofe, putride, e principalmente nelle esantematiche), non essendo prima accaduta alcuna evacuazione critica, il malato viene improvvisamente sorpreso da quella febbre di suppurazione (191) accompagnata da fintomi ancor maggiori di perturbazione grave, e minacciante, dopo la quale non è molto diminuita la gravezza del morbo essenziale, finchè la materia putrida siasi determinata ad alcuna parte, dove poi forse faransi fentire i segni dell' apostasi, od ascesso: io diceva, dove forse faransi sentire; conciossiachè alcune volte tali fluffioni fanfi in parti così profonde, tanto inerti, e di così poco senso, che, quantunque poi trovinfi ne' cadaveri, non ce ne può rimanere vergogna di non averle conos

eiute nel vivente: o se pure anche per una prosonda, ed oscura gravezza, e pussarione, e per l'azione lesa di alcuna parte si poteva conghietturare, dove potesse essers si arte nostra vi giovasse. L'arte nostra vi giovasse.

193. Ne la materia della suppurazione ( fiafi questa generata nella parte, o sia venuta d'altronde ) trovasi sempre raccolta in una grande cavità, cioè in un ascesso cavo; che alcune volte abbevera la cellulofità delle vifcere, come se fosse un edema purulento, o forma una crosta sulla superficie delle stesse viscere, come se fosse trasudata, il che frequentemente si osferva fulla pia-madre, fui polmoni, e fugl' intestini. Altre volte le metastasi fansi con tanta violenza, ed impeto sui polmoni, o sul cervello, che in breve tempo il malato muore foffocato. convulso, o apopletico, senza dar tempo, che la flussione fiasi circoscritta in uno spazio limitato, acciocche se ne potesse tentare l'evacuazione. Ma perchè io come Cerufico debbo trattare di quegli ascessi solamente, ai quali forse la Chirurgia possa giovare, gli accennerò gli uni dopo gli altri, rapportandone quelle circostanze, per le quali, come già ho detto (190), si possano talvolta come meglio, e più certainente conoscere, così anche per avventura curare, e guarire.

> Degli ascessi, che si fanno dentro la cavità del cranio.

## S. II.

194. Gli ascessi, che si fanno nella cavità del cranio, sogliono essere mortali, quantunque la marcia siasi aperta la via per le narici, o per

Cafi di afcessi interni ove la Chirurgia niente può giovare. Per quali cagioni quefii a/cc/fi fiano quafi fempre mortali. gli orecchi; che di rado ciò giova. Perciocchè tale per lo più è stata la gravezza della malattia, a cui fono feguiti gli ascessi come terminazione, che, quando si conoscono, o il malato è già vicino alla morte, o tale guaffamento è stato fatto delle parti, ch' esso è irreparabile. Nella massima parte degli esempi, che abbiamo di ascessi interni del capo guariti, vediamo, che erano stati prodotti da ferite, per le quali, o perchè fossero assai aperte, e dirette verso l' ascesso, o perchè se ne avesse fatta la dilatazione col trapano, o colla leva, la materia aveva potuto evacuarfi. Ma se l'ascesso è stato prodotto per cagione interna, e confeguentemente nella integrità del cranio, o per un colpo esteriore, che non abbia aperta la via, benchè per la gravezza, pel dolore, e per la tenfione, che sentonsi dentro la cavità, per la uscita d' icore o medefinamente di vera marcia dalle narici, o dalle orecchie, o da amendue queste parti, per l'affezione soporosa, che non di rado fuol fuccedere, per la cecità, per la paralifia di alcun membro, e infine pei rigori di freddo preceduti si possa conghietturare l'esistenza di un ascesso, difficilissimamente però si potrà avere certezza del preciso luogo, dove possa essere lo spargimento, perchè si possa con ragionevole fiducia tentare di dargli uscita colla operazione del trapano. Vedere nel Trattato delle ferite il capitolo delle ferite del capo, ove quest'argomento è ampiamente trattato; imperciocchè, per determinarfi ad aprire il cranio, vagliono le stesse considerazioni, sia il raccoglimento di acqua, di fangue, o di materia purulenta. Perchè non è permeffo di giuocare della vita degli uomini, anco ne' casi difficil ssimi, e oscurissimi le nostre determinazioni debbono effere appoggiate ad una ferie sufficiente di conghierture ; che non sempre la nostra audacia sarebbe così felice come quella di un Manifealco, di cui narra il WEPFERO alla pag. 119. offervazione 46. delle affezioni del capo (a); sentitene la lepida floria, di cui fi avrebbe orrore, se non fosse stata felice. « Un villano sostriva da lun-» go tempo una crudele cefalalgia prodotta da " umore linfatico, come poi fu veduto, sparso » tra il cranio, e la dura-madre. Non potendo » più fopportare il male, pregò un Maniscalco, » che aveva costume di trapanare i giumenti » quando pativano vertigini, che gli volesse » fare la stessa operazione (b). Gliela fece con » uno di que' trapani de' Legnajuoli fopra il fin-" cipite, fenza quelle molte cerimonie, che » fogliono usare i Cerusici; ne usci gran copia " di fiero, e l'ardito villano fu interamente » guarito.

Degli

(a) Ecco il titolo di quest' Opera postuma di Gioanni Jacopo WEPFERO pubblicata da due suoi Prontpeti Bernardino, e Giorgio Michele WEPEERO: Obfervationes medico-prastica de affestibus capitis internis,

& externis . Schaffhusii 1727. in 4.

(b) I Maniscalchi sogliono trapanare i giumenti nella malattia da essi chiamata capostorno, o capogatto, che è una spezie di vertigine, o giramento di capo. Non fi può negare, che qualche volta l'indovinino, evacuando pel foro farto al cranio la linfa sparsa tra esso, e la dura madre, oppure tra questa, e la pia, quando da tale travafamento linfatico dipende il male. Ma ficcome, applicando per lo più il trapano in mezzo della fronte, non penetrano già nella cavità del cranio, ma nei seni frontali; quindi è, che quantunque vi fosse il travasamento, nol porrebbero evacuare. E' vero, che, per far credere agli (ciocchi, ( o eredendolo effi ftessi buonamente ) di aver penetrato nella cavità del cranio, fogliono mettere un candelino acceso vicino al pertugio fatto dal trapano, dicendo, che il dibattimento, che fi ofserva nella fiamma del candelino, proviene dalla fumofità

Degli ascessi, che si fanno denero la cavità del petto.

# S. III.

Segni rationali delle diverse vomiche. 195. Gli ascessi interni del petto diconsi communente vomiche (a). E queste possiono esferis fatte nella sostanza stessa del possiono esferis fatte nella sostanza stessa derenza colla pleura, e da alora niente vi può la Chirurgia. Ma, quando il polmone precedentemente infiammato si è poi fatto aderente alla pleura, come succede in molti casi di peripneumonia, o quando l'ascessi si fatto nella cellulosa della pleura tra questa, e le costole, i segni, che cel fanno conoscere, sono, che, a avendo preceduto, come dicemmo, in quel luogo il dolore, il calore, il martellamento, ne segue poi,

del cervello, che fi (vapora, mentre procede dall'aria, che not tempo dell'efpirazione cie allora per que' feni aperti, ranto più, che foglione in quel rempo tener chiuse le narici dell'animale. Anni fono girava per turte le Città dell'Italia, e l'abbiam anche veduto in questa, un Ciarlatano, il quale pretendeva di poter conficcare nel cervello di un cavallo vivo un lungo, e grosso chiodo, senza che l'animale ne soffrisse; ne faceva lo sperimento pubblico, facendo pagare a chi voleva efserne spettatore, ma il chiodo piantato obliguamente d'alto in basso nella fronte penetrava solamente nelle ampie cavità nafali, e perciò non faceva alcun male.

(a) Non a cafo l'Autore dice, che gli sic fii isteria del prote dicessi commente vonicie, ma per fair fentire, che propriamenne la parola vonica fignifica qualunque sicplo interno; in questo ampio fento dempre fe ne ferve Cerso, come fi ricava dal cap. 27, n. 4. del lib. 3, e da molti altri luoghi. Vedremo qui appreffo, che lo stessi de Berranno dà il nome di vonica ggii sicssi si di printerio (12.1).

fatta la suppurazione, un certo senso di gravezza; non di rado la cute al luogo corrispondente alla vomica diventa po' poco edematofa. o enfisematica. Ad un uomo, il quale dopo una grave peripneumonia, ebbe una vomica, che occupava tutta la faccia anteriore del polmone. gonfiò d' un enorme edema tutto quel lato del petto, la spalla, ed il braccio. Alcune volte su qualche parte della gonfiezza del petto comparifce una macchia rossa erisipelatosa (a), la quale fuole indicare il centro medefimo della vomica. Il malato ha la respirazione difficile. ed affannata, nè può giacere su certe positure, verso le quali sia mossa la materia secondo il sito. ch' essa occupa, e la inclinazione, che le si può dare. Nella vomica del polmone la tosse suol essere frequente, molesta, e purulenta, non così in quella della pleura, nella quale la toffe è piuttosto secca, e rara, eccettochè l'ascesso non venga col tempo a comunicare col polmone. 196. Il FOUBERT nel primo Tomo dell' Accademia di Chirurgia narra di un ascesso del petto fattofi dopo una peripneumonia, il quale, quando il malato toffiva, prefentava un tumore grosso come un uovo di gallina tra la cartilagine xifoidea, e il margine cartilaginofo dell'ultima vera costola, e delle due seguenti false.

Offervazione del Fou-BERT d'una vomica fina golare.

Perchè, applicandovi sopra la mano, il tumore rientrava, alcuni Pratici (dice il FOUBERT (b))

<sup>(</sup>a) La gonfiezza edematofa di alcuna parte del pertodell' afgeffo interno del petto, moftrano, che il noffrodell' afgeffo interno del petto, moftrano, che il noffrogeffo interno del petto, moftrano, che il noffrote dell' afgeffo interno del petto, moftrano, che il noffrote dell' afgeffo interno dell' afgeffo dell' afgeffo interno del petto dell'
fegni per nuovi, come fe da niuno fosero flati offervati.

<sup>(</sup>b) Pag. 717. di detto primo Tomo dell' Accademia di Chirurgia, edizione in 4.

BERTRANDI TUM, TOM, I, H

Spiegazione tratta dall' Anatomia di quefto cafo Araordina-

Rifloffione fulle confulte .

la fluttuazione, lo giudicava piuttofto l'appendice di un ascesso. In fatti all'apertura del sozgetto, che in fine morì, vel trovò continuato tino nella fostanza del polmone. Il diaframma fuol avere un'appendice carnofa, con cui fig connetre alla carcilagine xifoidea; da questa fino alle profiime costole manca per lo più il piano carnoso, e si addossano pleura, e peritoneo. Ivi dunque per la debolezza della parte aveva potuto comparire quell' ascesso tanto più, quando per la tosse era violentemente scosso. ed abbaffato il diaframma. Mi duole doverlo dire, e lo dico fine ira & siudio, quorum caussas procul habeo (a), ne' casi, ove piuttosto per una fomma di combinazioni, e di conghietture, come sogliono essere questi degli ascessi interni, si deve trarre il giudizio del morbo, dal quale poi la indicazione, s'incontrano talvolta Confultori capparbi, i quali, pronunciata che hanno una loro opinione, ne fono talmente inteschiati, che non potrebbono cangiarla, e ciò, che prima era loro semplice conghiettura, o fospetto, diventa poi nella loro immaginazione realtade, e persuasione. Non potè il FOUBERT, come egli stesso mi narrò, volgere l'opinione di que' Pratici, i quali però io conosceva assai celebri nella Città. Ma non era quello unascesso, dall'apertura del quale si potesse ragionevolmente sperare la guarigione del malato? In varie maniere, ed in vari fiti si possono presentare le vomiche, perchè più opportunamente si aprano. Un giovane mio amico, dopo una peraltro leggiere peripneumonia, rimale con

una

<sup>(</sup>a) CORNEL TACIT. Annal. lib. t. a. 1.

una molesta tosse, con sebbre lenta, la quale Osservaziopo' poco fi efacerbava nella notte, per duni ne dell'Aunuire poi ful mattino con un sudore puzzolente, altra vomied acre, il quale talmente gl'irritava la pelle, ch' era diventata scabra, e si squamava. Dopo effergli alquanto gonfiati, e divenuti edematosi ambidue i carpi, cominciò ad avere la respirazione più difficile, e grave, poi gettava colla tosse una materia salsa al gusto, e di consistenza glutinosa: la febbre su maggiore per pochi giorni, e finalmente, fatta ancor più aspra la tosse, cessò la evacuazione di quella materia, ma gonfiò edematofo tutto l'articolo superiore finistro, la spalla, e il giogolo di quel lato; la gonfiezza era maggiore fotto l'ascella, poichè ne occupava tutta la cavità, e, perchè divenne poi dolente, furonle fatte fomentazioni ammollienti, e carminative, ma due giorni dopo il loro uso la febbre venne con eccessivo rigor di freddo, gonfiò maggiormente, e dolfe il tumore fotto l'ascella, fattosi però più molle con un certo fenfo profondo, ed ofcuro di fluttuazione, e coll'apparizione di strisce erisipelatose per la lunghezza di quéll'articolo. Si applicò fotto l' ascella un cataplasma fatto colla putrilaggine di cipolle di gigli bianchi, di radice d'aliea, di foglie di parietaria, di malva, e di meliloto con poca farina di linseme, e gomma ammoniaca sciolta nel tuorlo d' uovo. Dopo l'applicazione continuata per alcuni giorni di tal cataplasma quel tumore si fece più appuntato con una mollezza più dilatata, e con fluttuazione più fenfibile, effendo però anco cresciuto l' edema del braccio colla sparizione quasi totale delle strisce erisipelatose. Allora io aprii la gonfiezza forto l'ascella, avanzando col taglio sulla prossima parte del petto, la quale pure era edematofa, e alquanto suppurata. Usci niente:

più di un bicchiere di marcia bianca, fenza chela gonfiezza diminuisse: ma nella notte seguente la febbre con freddo fo più forte, l'affanno della respirazione gravissimo, somma la inquietudine, ed al mattino fi trovò la cellulofa,. che gonfia, e abbeverata di un umor mucofo erafi allungata groffa quanto il pugno fotto l' ascella fuori della incisione. Fu determinato di mozzarla, e d'inciderla colle punte delle forbici; n' usciva contuttociò a stento quella materia inucofa. Infine dopo un nuovo accesso di quella febbre fu veduta la cellulosa nel profondo dell'ascella cancrenata in modo, che si potè trarre fuori a lembi: ne feguì poi uno fcolo abbondantissimo di una materia, che era vera meliceride (a), e della stessa natura erano gli sputi, ed il malato tanto più ne sputava, quanto più se ne diminuiva lo scolo dall'ascella, sicchè non si potesse dubitare, che fosse una vera vomica del polmone, la quale per quella parte ancora fi evacuaffe. In fatti, fe diminuiva la tosse, e diminuivano gli sputi, cresceva lo scolo dall'ascella. Fra tre mesi e mezzo il malato fu perfettamente guarito, fe non che gli rimase una gibbosità delle costole sotto l'ascella, la qual gibbolità era stata offervata fin da'primi tempi della gonfiezza dell'ascella, segno non meno valente a farci credere, che dal polmone fosse quivi venuta la materia. L'edema dell' articolo poteva effere stato prodotto in parte dalla pressione, che il tumore dell'ascella faceva fulle ghiandole fottoafcellari, e fulle molte vene linfatiche, che quì da tutto l'articolo concorrono, e in parte ancora dallo spandimento · dalla

Spiegazione te' principa'i accidenti offervatifi in quefla renica.

<sup>(</sup>a) Nel cap. delle ulcere in generale si spiegherà, cosa sia la marcia chiamata meliceride, o meliceria.

dalla stessa materia, dappoiche per tutta la spalla esso edema eta piuttosto di color di perla, come accade affai frequentemente nelle infeltrazioni cutanee, che pure vengano da un ascesso interno, infeltrazioni prodotte dalla parte più tenue della marcia, che ivi ha trapelato. Noi sappiamo, che la cellulosa è una spugna di cellule insieme comunicanti, la quale si continua per tutto il corpo, e qui appresso (219) daremo altri esempi, com'essa abbia portato lontanissimo dal primo fonte la materia della suppurazione. Riguardo a quella curvità morbosa delle costole, ella è frequentissima ne' lunghi. ed abbondanti abbeveramenti di pus, o di linfa, che siensi fatti tra esse costole, e la pleura. lo ho trovate alcune volte le coste cost flessibili. e molli, che poteva piegharle con fomma facilità come una verga di legno verde. Il CHI-COINEAU nell' Accademia delle Scienze di Parigi anno 1731. racconta di un incurvamento delle ultime vertebre del dorso fatto da un tumore umorale del petto dietro i polmoni, il quale erafi evacuato per secesso; e perchè il foggetto era nella prima pubertà, quelle vertebre poterono ancora raddrizzarsi.

197. Quando si debba aprire un afcesso del petto, bisognerà usare il gammautte piuttosto, che il lancettone: si tagliano prima gl' integumenti secondo la lunghezza del petto; dopo la qual' incissone, se i muscoli intercolali non sono aperti, come sovente in tali circostanze lo sono, si apritanno per la loro altezza. Quando per quest' apertura siasi veduta colare la marenta, si ciplorerà colla punta del dito s'essa apertura possiba bastare, e, se vi sosse mossibilità dississioni di crederia insufficiente, riconosciute che faramnosi le aderienze delle pareti della vomica, le quali sossiono ancor lontane, ed allato, si dovrà pure dila-

Modo di aprire gli ascessi del tare in traíverío, per avere una fufficiente e costante apertura: quella fatta per l'altezza de' muscoli di rado suol bastare, restando sovente otturata dalla materia glutinosa, o dal gonsiamento della cellulosa:

Segni degli ajceffi celtulari del polmone,o della picura.

198. Gl' indicati ascessi del polmone, o della pleura (195) sono qualche volta cellulari, e separati gli uni dagli altri, e soglionsi aprire fuccessivamente, il che viene significato dal nuovo affanno, e dalla inaspettata esacerbazione della tosse, e della febbre suppurativa, e se poi se ne rompono i tramezzi, sicchè comunichino infieme, fi vede allora colare dalla prima apertura maggior quantità di marcia, oppure gli sputi purulenti diventano più copiosi. Ma se il nuovo follicolo apertofi non giunge a comunicare col primo ascesso, o non si evacua per alcun' altra escrezione, darà poi forse anch'esso segni esterni della sua sede, perchè si possa aprire. Io ho dovuto in un foggetto aprirne tre a diverse distanze, ed altezze.

Segni, e cura degli afcessi fattisi nella deppiatura del mediastino.

199. Il più difficile, e oscuro ascesso del petto suol essere quello, che si fa sotto lo sterno: suole anch'esso essere terminazione di un morbo infiammatorio del mediastino, come se quivi fosse la pleuritide, la quale, oltre i segni d' infiammazione, è principalmente fignificata da un dolore, il quale si stende per la lunghezza di esso mediastino, ed è più forte, e acuto nel tempo della inspirazione con isfiramenti dolorosia e gravi verso la gola, e inferiormente alla folletta del cuore: il malato non giace meglio che fupino, e qualche volta anche prono; in fine, dopo la febbre di suppurazione (191), sente quivi una gravezza. E' accaduto qualche volta, che la materia, avendo icostato appoco appoco le lamine del mediastino, sia giunta ad alzare

alzare la cute tra l'interffizio di due costole. dove il Cerufico avendo fentito la mollezza, e la fluttuazione, abbia potuto fare felicemente un' apertura; fe ciò non accade, fuole ammollirsi l'osso, che è spugnoso, essere dilatati, o rosi i suoi pori, sicchè in sine la materia trapeli fin fotto gl' integumenti, e ficcome ne trapela prima la più tenue, per lo più non fi trova se non una leggiere edemazia agli stessi integumenti con qualche macchia erifipelatofa, Si fa talvolta un tubercolo, dal quale aperto esce una maggior quantità di umore, che non fembrava promettere il fuo picciol volume. Quando il fluffo della materia è continuo, e copioso, che ne mostra il grande spandimento in quella duplicatura, è per lo più neceffario di applicare una corona di trapano allo sterno, per renderne più facile l'uscita. Alcune volte è stato trovato suppurato il timo, il quale presentandosi con una estremità alla parte inferiore della gola, e quivi facendo tumore, fattane ·l' apertura, fi vide, che la materia veniva dal ballo, cioè dallo spazio triangolare anterior superiore del mediastino. Bisogna in questo caso essere solleciti a farne l'apertura; che altrimenti la vomica dilatandosi sotto lo sterno, può fare pericolofi guaftamenti (a). Altre volte effendo

(a) Anzi qualche volta non hafta di aprire con follectiudine il rumore apparente, che bitogna trapare lo fierno, per dare un libero (colo alle marce), chi ne occupano la parte nafcofia fotto questi la MARTINIA PER nella fun Differazione rapportata dal la MARTINIA pella fun Differazione praportata dal la MARTINIA pella fun Differazione fun Propriata dal mantana forma, inferita a pag. 44. del 1v. Tomo dell' Academia Reade di Chiurgia di Parigi. Quantunque l'Autore nol dica, fi vede niente manco dalla narrazione della froria, che il tumore ficatomofo ivi descritto era fatto dal timo. Veggafi inoltre ciò, del vegafi inoltre ciò.

Curs .

## 120 ASCESSI INTERNI DELL' ADDOMINE

suppurata la cellulosa tra i muscoli scaleni, o tra le glandole giogolari, le quali non di rado formano una catena, che fi continua fin giù nel petto, fi vide la suppurazione continuata fin nella sommità del petto, e sar tumore sopra, e fotto la clavicola. Tosto che in questo sito compajono alcuni fegni di fuppurazione, conviene fubito aprire dove, e come meglio fi potrà, per evitare il maggiore guaftamento delle parti contenute nel petto. Per una tale flussione purulenta negletta, o mal curata, difcesa dal collo nel petto, io ho trovata scoperta, e cariofa la estremità sternale della clavicola, che ho dovuto feparare. Ma il malato morì per l' ulcera cancrenosa, che si era fatta alla prossima parte del polmone.

> Degli ascessi, che si fanno dentre la cavità dell'addomine.

# S IV.

Segnirazio.
nali degli
escessi del
segato farti
per flussione.

200. Dovendo ora trattare degli afcessi interni dell' addomine, cominicieremo da quelli del fegato, i quali debbono più frequentemente accadere, dappoichè ne abbiamo un più gran numero di osservazioni. E, seguendo il MoRAND (a), noi pure li divideremo in ascessi fatti per fussione, e in quelli, che si fanno per congessione: a questi ultimi più, che ai primi, debb'esser soggetto il fegato per l'abito suo, come qui sotto dimostreremo, Quando l'. afcesso.

(a) Mêmoires de l'Academie Royale de Chirurgie Tomi

che facciamo osservare nel Discorso preliminarea questo Trattato a proposito di quella Dissertazione, e di quanto qui insegna il BERTRANDI.

ascesso è terminazione della precedente infiammazione, fono stati non equivoci i sintomi della epatitide, ed il malato ha dovuto sentire continuamente in un preciso luogo gli effetti del flemmone; il dolore però fuol effere ottufiffimo, e appena sensibile, quando l'ascesso si è tatto profondamente nella fostanza del viscere acuto. e distensivo, quando facevasi immediaramente fotto la sua tonaca, il che come avvertì lo stesso GALENO (a), è comune a quafi tutte le infiammazioni de' visceri. In fatti resta dormigliofo, quafi apopletico il malato nella infiammazione della propria fostanza del cervello, delira all'opposto, e soffre stupendi tumulti, e convultioni, quando sono infiammate le meningi. Quella ottufità di fenfo è ancor maggiore nelle profonde infiammazioni del fegato, perchè è un viscere molle, inerte, dotato di piccole arterie, e di pochi nervi in proporzione della fua grande masta, e mole.

201. Si farà l'astesso per congessione, quando appoco appoco continui a crescere la ostruzione del visicere, la quale farà dichiarata dalla itterizia, da quale rarà dichiarata dalla itterizia, dali vomiti, dalle nausee, dai vizi della bile, dalla gravezza, durezza, e tensione dell'ipocondrio destro, dalle urine gialle ec., sicchè per l'impaccio prodottovi si accumulino infensibilmente gli umori in alcuna parte di esso viscere, e si scompongano, onde facciano in sine la vonica, od apossuma, ma con tanta lentezza (alcuna volta se non fra mesi, o un anno), che si possa vota se non si messione congessione, cosa non difficile a intendersi, se si ristette alla lentezza, e viscistità degli umori, che abbeverano il fegato, e all'accennata sua

Di quelli fatti per congestione

<sup>(</sup>a) De loc. affett lib. v. cap. VII.

## 122 ASCESSI INTERNI DELL' ADDOMINE

mollezza organica. Ma, mentre fi farà quello fcomponimento dell'umore, crefceranno la tenfione all'ipocondrio, il vomito, la itterizia, e fuccederà quella fibbre, che dicemmo di fuppurazione (191).

Segni efterni comuni agli uni, e agli altri.

202. Ma perchè non tutti gli ascessi del fegato, fianfi effi fatti per fluffione, o per congestione, possono essere colla operazione guariti. e che tal cura fi può folamente eseguire in quelli, che fi presentano all'esterno con un tumore più o meno apparente, giova, oltre i riferiti fegni razionali (200., 201.), addurne altri foggetti ai fenfi, che ce li facciano meglio conoscere. Siffatti afceffi conoscibili per segni esterni, e perciò foggetti alla Chirurgia fon quelli, che fi fanno nella faccia convessa dei due lobi del fegato verso il loro margine anteriore, e inferiore, bifognando innoltre, che quivi abbiano. contratta aderenza col peritoneo. Il MORAND nel luogo citato (a) dice, che i cinque ascessi, che aveva veduti, de' quali quattro guarirono, erano tutti nella parte convessa, inferiore, e fortile del viscere quasi nel mezzo della regione epigastrica. Io ne ho veduto uno inferiormente al margine delle tre false costole superiori, sapendofi, che il fegato ne' diversi soggetti trovasi più o meno allungato ingiù, e che ancor più fi allunga nelle offrazioni (b). Quando adunque pel morbo preceduto in quel viscere,

<sup>(</sup>a) Pag. 71. di detto secondo Tomo dell'Accade-

<sup>(\$)</sup> Due afceff del fegato fono flati con buon fuccefso aperti a due malati in questo Spedale di San Giambattista, l'uno de quali si mostrava nell'interfizio intercartilaginolo delle due prime false costole, e l'altro tra la punta delle medesime cartilagini, e la linea bianca.

e per la febbre di suppurazione, che farà finalmente accaduta, fi avrà sospetto dell'escesso. fe ne dovrà cercare indizio più certo nella parte, offervando, se dalla cartilagine xisoidea per tutta la regione epigastrica verso i margini delle costole non vi sia tumidezza, edemazia, o alcune stimate erisipelatose, e infine se non fenta alcuna quantunque profonda, ed ofcura fluttuazione di un umore: quando questa si senta, fi dovrà far volgere supino all'uno, e all' altro lato il malato, per palpare il tumore, comprimendo, e battendo con una mano ad uno de' lati, onde sentire contro l'altra mano. che si tiene ferma all'altro lato del tumore, il muovimento dell' umore, e la stabilità del follicolo, ful cui vertice facendo poi anco qualche compressione, sentesi l'umore ritornare in fu. o indietro, o contro i mufcoli dell'addomine fecondo la fua fituazione, e direzione, Se vi è aderenza del follicolo dell'ascesso col peritoneo, coll'uso de' cataplasmi ammollienti, e suppuranti vedesi quasi sempre crescere il tumore, e rendersi più sensibile la fluttuazione, ficchè il Cerufico possa con maggiore fiducia farne l'apertura.

203. Abbiamo alcuni esempj, che l'apostema In qual mofiafi aperto spontaneamente, la materia avendo do tali oscesmacerati, e rofi peritoneo, mufcoli, e integumenti; ma se non si apre da se, se ne farà l'apertura fulla fua parte più eminente, o fu quella, dove fentiraffi maggiore raccoglimentodel fluido: deesi essa fare perpendicolare, e secondo la lunghezza dell'addomine, avvertendo di non iscorrere col gammautte molto in basso, per non recidere l'angolo della unione del follicolo col peritoneo, che la materia allora potrebbe versarsi nella cavità dell'addomine; vi

fi debbanfi

#### 124 ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE

farà poi tempo di dilatare, quando ne giorni feguenti fiafi potuto più comodamente esplorare il fondo, e i lati dell'ascesso. Il MORAND però vorrebbe (a), che nel medefimo tempo fi facesse anco un piccolo taglio trasversale verfo la linea bianca, anzi che essa stessa si recidesse, quando l'ascesso fosse all'epigastrio, perchè (dic'egli) per l'avvicinamento, ed abbassamento della prima incisione longitudinale non così facilmente l'apostema potrebbe evacuarfi, e purgarfi, principalmente quando debbano uscire materie viscide, crasse, e sioccose, ed egli è raro, che fi veda uscire pura, e schietta marcia; essa è per lo più tinta di materia rosfigna, giallognola, o verdastra, e la massima quantità fuol effere fimile alla feccia del vino, con fiocchetti di sostanza parenchimatosa, cellulofa, e vascolare. « Quando fi vede uscire » una tale fostanza, dice il citato Scrittore (b). » talvolta sembra, che niente affatto siavi di » pus, ma se si lascia deporre in un vaso, si w vede dopo qualche ora il pus bianco fopra » quella fostanza spessa, e rossigna, ed allora » separando per inclinazione le due sostanze, » possonsi distinguere i siocchetti, che dicemmo " vascolari, e parenchimatosi, de' quali dice di » averne una volta tratta una libbra alla prima » apertura, e per sei settimane un mezzo bic-» chiere al giorno. " Sonvi esempj, che l'ascesso del fegato, fattosi verso la sommità del viscere, abbia perforato il diaframma, e

reso il malato empiematico, o che sattosi aderente lo stessio polmone col diaframma così persorato, siasene la marcia evacuata per gli

Qualità della marcia, che ne fuole ufcire.

fputi.

<sup>(</sup>a) Nel luogo citato pag. 74-(b) Ibid, pag. 72., e 73.

fouti. Il PETIT figlio nello stesso Tomo dell' Accademia di Chirurgia pag. 59. rapporta la ofservazione di un ascesso al fegato con tumore a tutto l' ipocondrio destro, e parte dell' epigaftrio, il quale si stendeva sin sopra la parte anteriore, e laterale del petto tra la quarta, e la quinta costola, contando di basso in alto, nel qual luogo, cioè tra quelle due costole, il Cerufico avendo fentita maggiore la fluttuazione, vi fece l'apertura, e dopo che furono evacuati tre bicchieri di marcia del colore della feccia del vino ( fegno che l'afcesso era nel fegato ) introduffe il dito nel petto, e per un foro, che trovò al diaframma, fi accorse poi di avere penetrato nell'ascesso del fegato, ed il malato fu così felice, che guari perfettamente nello spazio di sei settimane. Non mancava forse la porzione carnosa del diaframma dalla cartilagine xifoidea alle costole corrispondenticome abbiamo quì fopra accennato (196), ficchè la materia non abbia perforato, che il peritoneo, e la pleura (a)? Lo stesso PETIT raccomanda conseguentemente di aprire tali ascessi con qualche follecitudine, quando fianfi conosciuti, e perchè troppo non si dilatino, e perchè forse non si sciolgano le aderenze del follicolo (b).

Offervazione del PE-TIT di un ascesso del segato penetrante nel petto, aperto, e guari-

204. Il

<sup>(</sup>a) Anzi non è neppur necessario, che abbia la marcia persorato queste due membrane; balta, che colla sua copia le abbia spinate in su, e dilatates, che se le avesse rotte, allora l'ascesso non sarebbe stato follicolare, ma sarebbesti fatto uno spargimento purrulento nel petro.

<sup>(</sup>é) Non ſarà ſuor di propoſto il narrare la ſtoria di un aʃccʃſo del fegato, la cui materia dova eſeferi raccolta tra le due lamine del ligamento ſalciſorme. Un nobile Signore Vericelleſe, allora in età di 14- anni, dopo una ¡patide ebbe un tumore cedema;

#### 116 ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE

Fumori della ciftijellea.

204. Il Petit padre nel primo Tomo della: stessa Accademia di Chirurgia pag. 155. (a) ha rapportati alcuni esempi, che la sola vescica del fiele abbia fatto tumore all' ipocondrio deftro, e quivi simulato un ascesso, dappoiche si fentiva la fluttuazione dell' umore. E perchè l'averlo aperto fu in certi casi cagione della morte de' malati, deve importare moltissimo di esattamente distinguere le due malattie, nè potremo far meglio, che esporre le riflessioni, ch' egli stesso ha fatte a questo proposito. » Bisogna essere avvertiti ( dic'egli pag. 159. ) » che l'ascesso del fegato, e 'l rattenimento » della bile nella vescichetta, essendo il più » delle volte la confeguenza della infiamma-» zione di quelle parti , hanno da principio gli

» stessi sintomi; ma i rigori di freddo sono più

lunghi

tofo all' ipocondrio destro, che si stendeva verso la linea bianca fino all' ombilico, dov' era più prominente, e dove fentivafi l'ondeggiamento della materia. Non avendo il fanciullo voluto lasciarlo aprire col ferro, bisognò ingannarlo, e applicare su quella prominenza un pezzetto di pietra infernale, la quale, lasciatavi dalla sera per tutta la notte, fece un' escara, dalla cui screpolatura uscì lungo la giornata una pinta, e più di materia oscura, la quale continuò a colare per venti giorni fempre in minore quantità, più chiara, e infine mucofa. L'ulcera fi cicatrizzò dopo due mesi circa di cura; ma un anno dopo fi riaprì, e mandò fuori altra materia meno oscura, e in minor copia. Nuovamente si chiuse quindici, o venti giorni dopo, e poscia una terza volta fi riapri dopo quattordici, o quindici mesi. Guari di bel nuovo in poco tempo, e continua ancor presentemente, che è fatto uomo adulto,

a godere perfetta salute

(a) Il titolo della sua Dissertazione è il seguente:
Remarques sur les tumeurs formies par la bile retinue
dans la vescicule du siel, e qu'on a souvent prises pour

des abscès au foye.

\* lunghi, quando si produce l' ascesso del fen gato, che quando fi accumula la bile nella » vescica, quelli sono seguiti da un maggior » calore, poi da fudore; ma quando fi fa la » retenzione della bile, la cute è quasi sem-» pre secca, ed il rigore è così leggiere, e » paffaggiero, che fembra prodotto da una fu-» bitanea accidentale irritazione. Il tumore fat-» to dall' ascesso del segato, quando compari-» sce all'epigastrio, non è così bene circo-» scritto, sembrano gonfi insieme muscoli, e » integumenti, i quali dicemmo effere alcuna " volta veramente edematofi (202): allo 'ncon-» trario il tumore fatto dalla vescichetta è di-» stinto, limitato, per lo più globoso, e tur-» gido, e si trova sempre precisamente sotto » le false costole, e sotto il muscolo retto. » mentre l'ascesso del fegato può essere in ogni " parte dell'epigastrio più dilatato, e meno » tumido. Infine la fluttuazione ne' due cafi fi » fa diversamente fentire; concioffiachè, per » quanto poco la vescichetta sia gonfia, e fac-" cia tumore, si può tosto sentire la fluttua-» zione dell' umore, la quale cresce a poco a » poco, quando dipende dall' ascesso del fe-" gato : infatti sovente in questi ascessi esta è " così oscura, e profonda, che quando uno " pure la fente, altri ne dubita ancora, nè di-" venta maggiormente fensibile, fe non con " nuove, e maggiori accessioni di quella feb-" bre suppuratoria. Inoltre la fluttuazione dell' " umore nella vescichetta da principio, come " dicemmo, meno equivoca, e meno profon-» da, fentesi in uno spazio determinato, e " circofcritto, ché è il fito della vescichetta: " il tumore, che ha preceduto l'ascesso, era " duro da principio, ed, anco fatta la suppu-» razione, n'è rimafta la circonferenza gon-

Segni, che distinguono i tumori della cist: fellea dagli ascessi del fegato.

#### 128 ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE

» fia, ed inzuppata: all' opposto il tumore

» della vescichetta del fiele, quando fiane ces-» fata la turgidezza, e la infiammazione, non

» fuole lasciare durezza, o gonfiamento alla

" circonferenza. "

Q: siche volta gli asceJi del fegato eva-cuanfi per fecesso; in che modo ciò poffa tarii .

205. Tale gonfiamento della cistifellea suot effere prodotto da un impaccio, che fiafi fatto al corfo della bile da quel facco nel condotto coledoco, fia esso un calcolo, una scirrosità, o fimili . E nell'ifteffa maniera, che qualche volta gli ascessi del fegato evacuansi colle fecce, o perchè la parte apostemata siasi unita, e pofcia apertafi nell' intestino colon ( della qual cosa abbiamo alcuni esempi (a), principalmente di quegli ascessi, ch' eransi fatti alla faccia concava del viscere ), o perchè la materia dal fegato prese la strada della bile, per portarsi nell' intestino duodeno per mezzo dello stesso condotto coledoco ( e in amendue questi casi, dopo aver preceduto uno stimolo, di evacuare le materie fecali, colle quali si trovò poi la materia purulenta dell' ascesso, quale l'abbiamo qui avanti descritta (203), diminuiscono la tenfione, ed il tumore all'ipocondrio); così anco qualche volta può fgorgare la bile dalla vefcichetta pel canale coledoco, che sia divenuto o affatto libero, o alquanto meno ostrutto, ed allora anco diminuisce o poco, od affai il tumore fotto le costole, e sopraggiungono presfanti, ed involontarie evacuazioni delle fecce ( fe non anco vomiti ), le quali poi trovanfi tinte di bile gialla, verde, oscura, o di color tanè, mentrecchè prima erano pallide, o grigie. Narra il PETIT (b) di un uomo, il quale

Anche la bile trattenuta nella vescichetta può eva-cuarfi per quella ftra-

<sup>(</sup>a) Petit loc. cit. pag. 172. (b) Loc. citat. pag. 168,

poteva alcune volte evacuare per fecesso la materia biliosa, che faceva tumore all' ipocondrio, con far quivi solamente alcune leggieri compressioni colla mano.

206. Il PETIT fu avvertito della possibilità di tali tumori della cistifellea (a) dall' averne veduti aprire, perchè erano stati presi per ascessi; ina la operazione è sempre stata mor tale, quando la vescichetta non erafi fatta aderente al peritoneo, perchè la bile fi spandeva fugli altri visceri dell' addomine; epperciò non fe ne dee fare l'apertura, se non quando la vescichetta fattasi in quel modo aderente rimanga immebile. Si può sospettare essersi fatta una tale aderenza, quando si abbiano avuti segni della infiammazione; imperciocchè le parti infiammate, quando fono a contatto, foglionfi fare aderenti tra di fe, e ciò fi potrà con maggior fondamento conghietturare, quanto più frequenti, e più violente faranno state le coliche, come diconfi, epatiche: maggiori indizi, anzi certezza se ne avrà, se sacendo giacere il malato ful lato finistro colle cosce piegate, e avvicinate all' addomine, mentre fi palpa, e fi preme all' uno, e all' altro lato il tumore, quelo non cangia di fituazione, e rimane fempre colla stessa convessità, anzi cresce ancora alcun poco; all' incontrario quando manca quell' aderenza, fentesi mobile, e scorrevole. Egli è vero però, che, durando per alcuni giorni la gonfiezza della vescichetta, nè cessando la infiammazione, fuole medefimamente fuccedere qualche gonfiezza edematofa agl' integumenti , ma i fintomi preceduti, e l'abito del tumore saranno sempre tali, che non vi possa rimaner dub-

L' apertufa del tumore della ciftifellea è tempre mortale, se non è aderente al peritoneo.

Segni razionali indicanti tale ade-

<sup>(</sup>a) Ibid. pag. 155., e 156. BERTRANDI TUM, TOM, I.

130 ASCESSI INTERNI DELL' ADDOMINE

dubbio, fe la gonfiezza fia della vescichetta, o del fegato.

207. Se l'apertura della vescichetta del fiele è sempre stata micidiale, quando non era aderente al peritoneo (206), abbiamo all'opposto alcuni elempi, che fia felicemente riescita. quando vi era quell' aderenza, quantunque il tumore fosse stato aperto, perche preso per un ascesso del fegato. Non fi apre spesso felicemente, e per ogni parte la vescica della orina? Quando siavi la semplice ritenzione della bile, il PETIT (a) pensa, che potrebbe bastare di fare una punzione col trequarti, il quale non debb' effere più lungo di tre dita trasverse. Si sceglierà il luogo più basso del tumore, conciossiachè il fondo della vescichetta penda inferiormente fotto le costole, e si diriggerà la punta dello strumento un poco in su, ed obbliquamente in dentro, come se si volesse andare verso l'intestino duodeno. Io ho veduto in Londra fare tale apertura con un faringotomo, e quando il Cerufico vide fgorgare l'umore, v'introdusse una tenta, e poi per mezzo di questa una cannella. Si conoscerà di non aver fatto errore, vedendo uscire un umore saponaceo, giallo, oscuro, o di colore di caffè, che tale fuol effere la bile in questi casi; qualche volta fi vede anco uscire un umore mucoso, e bianchiccio, che è l'umore stillante dalle ghiandolette, o follicoli della vescichetta stessa. Ma perchè non si può sempre sperare, che dopo la punzione la bile fia per riprendere così toflamente il suo corso naturale, e potendo esfere incomodo l'ufo della cannella, conviene

quafi fempre fare qualche poco di dilatazione

Quando, e come debbati aprire la ciftifellea col trequar-

Quando, e come fia necestario dilatare la punzione.

(a) Ibid. pag. 176.

col

col gammautte, tanto più fe vi fossero calcoli nella vescichetta, come sovente si trovano in fimili cafi, i quali alcuna volta fogliono urtare contro la cannella stessa: nientedimanco per averne maggiore certezza, fi potrà intro- Come ficodurre per questa una tenta di argento flessibile colla punta ottufa, o una candeletta. Per questo motivo farà sempre meglio usare una cannella, che abbia una scanalatura, lungo la quale si possa fare strisciare, occorrendo, la punta del gammautte, onde dilatare la punzione con un taglio parallelo al margine delle costole. E perchè questo taglio si potrà fare più sicuramente, e più esattamente, quando la vescichetta faccia ancora tumore, perciò fi dovrà allora otturare la bocca esterna della cannella medefima, Fatta sufficiente dilatazione, i calcoli fogliono effer tratti fuori dalla bile medefima, che continua a fgorgare, se no fi, dovranno estrarre con mollettine, le quali si portino dentro la vescichetta, diriggendole sopra una groffa tenta scanalata, che serva di conduttore.

nofcano, e come debbanfi eftrarre i calcoli

208. Alcune volte per la fomma turgidezza della vescichetta fattasi infiammazione, e quindi aderenza della medefima al peritoneo (206), formossi poi quivi un vero ascesso nelle corrifpondenti pareti dell'addomine, entro il quale essendosi aperta spontaneamente la stessa vescichetta, all'apertura di quell'ascesso trovaronsi calcoli, che avevano penetrato, trattivi dallo scolo dell' umore, tra gl' integumenti, e i muscoli, donde si dovettero estrarre colla dilatazione de' feni. In un cadavero io ho veduto un ascello al lato destro della regione epigastrica, dalla cui apertura uscì un liquore giallognolo, e mucoso, sicchè se tale ascesso fosse stato aperto nel vivente, avrebbe taluno po-

Talvolta fi fa l'ascesso. e l'apertura fpontanea della che Rifellea .

Offervasione dell' Autore di un rumore, che fimulava un afcello del je-

# 132 ASCESSI INTERNI DELL' ADDOMINE tuto credere, che fosse un' apostema del feg.to:

ma eravi un follicolo, che dalla cartilagine xifoidea stendevasi da un la o sotto il prossimo lembo del fegato, e dall'altro lato fino alla linea bianca, alle quali parti era unito: la materia di quest' apostema aveva stillato dalle ghiandole, che stanno attorno il piloro, le quali trovaronfi groffe come uova, ed ulcerate. Priina che l'ascello fosse fatto, io aveva potuto palpare il tumore globoso, e limitato di quelle ghiandole, la digestione era lentissima, e difficilissima, e facilissimi i vomiti, quando qualche copia di alimento tentava di paffare per l'angustia del piloro. Il MORAND nel terzo Tomo dell' Accademia di Chirurgia pag. 470. rapporta due offervazioni di ascessi flemmonosi, che sono stati aperti alla regione epigastrica verso l'ipocondrio destro, veri ascessi, dic' egli, flemmonost, dai quali si vide uscire veramente uno schietto pus ( nè mai tale suole uscire, come abbiamo quì fopra avvertito, dagli ascessi del fegato (203), o dal tumore della vescichetta (207)), e alcuni giorni dopo fu veduta colare pretta, e pura bile. Egli penía, che effendosi quegli ascessi fatti tra il peritoneo, ed i muscoli contro la vescichetta del fiele, questa abbia potuto connettervisi per la infiammazione, di cui avesse anco partecipato, e che poi, ammollite, e macerate le sue tonache, fiansi sinalmente aperte, come dal guastamento prodotto dal pus negli ascessi del perinco vediamo sovente aprirsi la vescica dell' orina.

ni del Mo-RAND di ascessi stemmonosti, e biliosi nello stesso tempo.

offervazio-

209. Il signor HEVIN nel primo Tomo della medesima Accademia (a) ha raccolte diverse storie

<sup>(</sup>a) Vedasi la sua lunghissima Disfertazione intitolata: Précis d'observations sur les corps étrangers arrêés dans l'assophage, se dans la trachée-arière a pag. 444, di detto Tomo.

rie di ascessi al collo, al petto, e all' addomine, prodotti dalla presenza di corpi stranieri arrestati nell' esosago, nel ventricolo, o negl' intestini, i quali fitti, e come imprigionati in un determinato luogo di quelle parti, avevanle compresse, irritate, e tumefatte, sicchè infine si fosse prodotto un ascesso, dall' apertura del quale ( dappoichè quelle parti eranfi conglutinate colla pleura, o col peritoneo ) que' corpi stranieri hanno potuto felicemente estrarsi; ma di questi ora non vogliamo parlare, e potete efferne istruiti dalla citata Differtazione dell' HE-VIN. o da ciò, che ne scriviamo nel capitolo della tracheotomia (a). Ora continuando le noftre offervazioni di quegli ascessi, che per altre cagioni, per lo più interne, si producono fui visceri dell' addomine, diciamo, che l' ascesso del ventricolo non fuol effere foggetto alla Chirargia: concioffiachè effo piuttofto fi evacui per l'esofago con vomiti, o escreati purulenti, o per secesso, essendo cosa rara, che in simili cafi il ventricolo abbia contratta tale aderenza col peritoneo, che se ne possa tentare l'apertura, e sperare la guarigione, com'è accaduto di quelli prodotti dalla presenza di corpi stranieri; aggiungasi, che tale ascesso suole produrfi tra le tonache del ventricolo, ficchè la interna possa più facilmente rompersi, dappoiche fi trova più ampia, e più rilassata. Vedetene una storia nel terzo Tomo delle Disputazioni Mediche della Raccolta Alleriana pag. 125. (b).

L' afceffo del getto alla Chirurg .

210.

<sup>(</sup>a) Ved. il Trattato delle operazioni Tom. 11. cap. XX. (b) Gothofredi SAND, & Georgii Alberti STOLZ garus ventriculi abscessus.

## 134 ASCESSI INTERNI DELL' ADDOMINE.

La milea è pochistimo soggetta agli ascessi.

Distinzione, e sede degli ascessi del mesenierio.

Segni, e caule dei fatti per fluffione,

210. Nulla diremo degli afcessi della milza. perchè ce ne mancano gli esempj: questo vifcere cotanto molle, spugnoso, e pieno di fangue piuttosto s' indura, o secondo le diverse cagioni si sfacela: Ma moltissime osservazioni fi leggono di ascessi del mesenterio, conseguentemente ad ostruzioni del fegato, della milza, del pancreate, alle suppressioni del slusso emorroidale, o menstruale, ec., la materia de' quali ascessi alcune volte è stata trovata tra le lamine dello stesso mesenterio, altre volte erano le ghiandule stesse mesenteriche apostemate. I primi fogliono effere fatti per fluffione, principalmente quando repentinamente, e violentemente sopprimansi quelle evacuazioni, la diarrea, o la diffenteria critica, del quale accidente abbiamo molti esempi. Cessata la violenza del morbo precedente, è il malato sorpreso dalla febbre suppurativa, gli si contraggono gl' ipocondrj, il ventre diventa poco, od affai tumido con un dolore gravativo ai lombi; fembrando però, che il peso si faccia anco sentire verso la regione ombelicale; sono preceduti dolori colici più o meno forti, i quali pur anco continuano dopo fatto l'ascesso, comecchè più miti, la suppressa evacuazione non è più comparsa, nè il morbo della milza, del fegato, o del pancreate, che fu la cagione predisponente, l'ascesso è pienamente terminato; conciossiache l'ascesso in simile caso sia per lo più piuttosto un epifenomeno (a), che la terminazione di effo morbo. Gli ascessi del mesenterio fatti per congestione sono prediposti da una

<sup>(</sup>a) Epifenomeno, o epigennema ( che fono finonimi ) fignifica un accidente, un fintoma aggiuntos un morbo, fenza che questo sia terminato

una lenta, ma continua congerie d' umori, che si fa nelle sue ghiandole conglobate nelle perione cachetiche, foggette a febbri intermittenti pertinacishime con ostruzioni anco lentamente prodotte della milza, o del pancreate, ma ancor più ne' soggetti strumosi: loro si guastano le digestioni, succede la inappetenza, i vomiti fono frequenti, rara la escrezione delle fecce. oppure accade la vera lienceria, l'addomine è teso, duro principalmente alla regione ombelicale, si tocca sotto de' muscoli nell' aja della cavità il tumore, che non si potrà pel sito. che occupa, dubitare effere del mesenterio, e quando fiafi disposto lo scomponimento, avranno preceduti alcuni accessi della febbre di suppurazione.

211. Pietro ESTANOVE alla pag. 62. del

primo Tomo della Biblioteca Cerufica del MAN-GETI racconta di un fanciullo, il quale, perchè aveva il ventre molto gonfio, era creduto idropico; ma gli crebbe tanto il tumore all'ombilico, che infine da se si aprì, donde n'escirono otto, o dieci libbre di pus lodevole, ed il fanciullo perfettamente guari. " Avvertano 2, i Giovani Cerufici ( dice lo stesso Autore ), ,, che sovente tali tumori ne' fanciulli si pro-,, ducono, come se fossero idropiste; ma se si , aprono in tempo, i malati per lo più guariscono." L' Autore non ha determinata la precisa sede di quell' ascesso, si può però conghietturare, che fosse nel mesocolon trasverso

dietro l'omento, e che divenuto aderente al peritoneo nella regione ombelicale, abbia quindi

potuto evacuarfi con quella felicità. Pare an-

Offervazione dell' Es-TANOVE di un afceffo del mefocolon

apertoù da

fe, e guari-

Di quelli,

che fi fanno per congestio-

Altra dell' HEURNIO di un afceffo del mesenterio guarito coll' operazione .

che, che fosse del mesenterio quell' ascesso, di cui ci ha data la storia l' HEURNIO nel suo Commento all'aforifino fettimo della fezione

## 136 ASCESSI INTERNI DELL'ADDOMINE.

VI. d' IPPOCRATE (a): " Ho veduto, dice egli, , una donna, la quale aveva il ventre più du-, ro d'un fasso: gli feci applicare sopra un , empiastro delle mucilaggini, ed essendovi nata , in un luogo qualche roffezza, quivi feci fare un'apertura affai profonda, da cui usci molta , copia di marcia, e la donna fu guarita. Ho , veduto ( fegue lo stesso Autore ) che tali , ascessi, se non si aprono, induransi come . fash, ed ugualmente duro diventa tutto il , mejenterio, e i muscoli dell' addomine fanno ,, troppa refistenza, onde non se ne possa così ,, facilmente sperare la spontanea apertura. Nel zerzo Tomo delle Disputazioni Mediche della Raccolta ALLERIANA pag. 513., e feg. (b) potete leggere un gran numero di offervazioni di afcessi al mesenterio, che occupavano diversi fiti, ed avevano diverse direzioni, e perchè il Cerusico non ha potuto operare, quasi tutti furono mortali . Alcune volte fiffatti tumori fono meliceridi (387) così recondite, e mobili, ovvero ateromi (389), o fleatomi (388), o farcomi (505) fitti, e conglutinati con diverse parti, che ogni operazione farebbe pericolofa. se non micidiale, onde di questi niente più diremo.

Afieffi Zelle intestina come ii possano aprire esternamen-

212. Appresso gli Autori trovansi molti esempi, che dopo pertinaci ostrazioni de visceri dell'addomine, dopo lungsi, e continui dolori colici, o anche per colpi ricevuti, qualche pezzo d'intessimo sassi fatto aderente al peritoneo nell'issesso che dicevamo ciò qual-

<sup>(</sup>a) Hippocratis aphorismi grace, & latine, brevi enarratione, stague interpretatione illustrati a Johanne HEUR-NIO. Ultrajecti 1601. in 4.

<sup>(</sup>b) În una Disfertazione Henrici HENRICI, & Gregorii Ludovici NOTTNAGEL de abscessiu mesenterii, & mujculorum abdominis plane singulari,

che volta accadere per corpi firanieri nel tubo intestinale arrestatisi (209) : nel luogo dell' aderenza fattofi poscia tumore, ed ascello, e questo apertofi o spontaneamente, oppure anco col ferro ( dappoiche l'ascesso era stabile, e con peripicui fegni d' ondeggiamento ) furono vedute ulcirne le fecce, la marcia, o vermini ( vedetene varie offervazioni nell' accennato Tomo della Biblioteca cerufica fono l'articolo ascesso), cioè, come si è detto, della vescichetta del fiele (208), può alcuna volta l'intestino fatto aderente infiammarsi, suppurare, e romperfi, e perciò fenza ragione fi condannerebbe un Cerufico, di avere aperto un tale ascello, quantunque colle marce vermini fi vedessero uscire, o materie fecali. Le vomiche del mesenterio ( 210. 211. ) possono alcune volte romperfi, e spandere la loro materia nella cavità dell'addomine; ne leggiamo alcuni esempi presso gli Autori: succedono allora lipotimie gravissime, nausee, vomiti, sudori freddi , tenfione agl' ipocondej , infine fente il malato una gravezza come una fpinta, che inopinatamente lo sorprende verso il pube, e verso le anguinaglie; conciossiachè le materie sparse Segni. nell' addomine ivi quafi fempre fi determinano. Vedete il capitolo delle ferite dell' addomine, che quivi abbiamo trattato affai ampiamente l'argomento degli spargimenti, che in questa ria, cavità si possono fare, e del modo di curarli. se pure il malato sopravvive ( la qual cosa raramente può accadere), alla screpolatura di una vomica, la quale suole effere affai grande in fimili cafi .

Ouelli del mesenterio fi aprono talvolta nell' ampia cavità dell'addomine.

Ove fi prefenti per lo più la mate-

Cagioni della nefri-

213. La nefritide, o sia l'infiammazione de' reni può effere moffa da calcoletti, da fabbie, da muchi, da orine acri, dall'abufo delle be-

#### 138 ASCESSI INTERNI DELL' ADDOMINE.

vande spiritose, dalle cantaridi, ec., e all' infiammazione succede non di rado l' ascesso.

Quando questo siasi fatto, sovente la materia
se ne evacua per la via delle orine; ma qualche volta si trattiene nel viscere, dove muova
materia continuamente accumulandosi, infine appare talvolta qualche gonsezza alla regione sombate sotto il margine dell' ultima falsa costola,
sche à avendo preceduti i segni non equivoci
dell' affectione infiammatoria del rene, ora non
si possi dubitare del suo ascesso si bisogna dunque raccoglieri, concissachi la prosondià
dell' afsesso si concissachi la prosondià
dell' afsesso si suttata concissachi la prosondià
dell' afsesso si suttata concissachi e della si prosondià
dell' afsesso si suttatazione della marcia.

Segni dell' ascesso del rene.

214. L'abbiamo già detto in altri luoghi ( 191. & alibi ), e nol diremo mai abbastanza, che la suppurazione fatta si può conghietturare dai fegni forti, e continui della infiammazione preceduta, dalla calma apparente, ma breve, che ne seguì, essendosi poi fatto sentire un dolore gravativo, talvolta pulseggiante con rigori di freddo, fudori, ec. Gli ascessi consecutivi alla nefricide (213) sono per lo più colla suppressione, o almeno con molta diminuzione delle orine, le quali escono sempre con un dolore, che fi stende dai lombi per la via degli ureteri fino al pene, mescolate di fangue, di mucchi, di marcia, di calcoletti, di fabbie; quindi è, che il loro sedimento è torbido, spesso, rossigno, e purulento. Quell' atroce dolore de' lombi si fa ancor più sentire, quando quelle parti si toccano, e tosto si propaga, come dicevamo, per gli ureteri fino al pene, anzi vedonfi convellere, e ritirare i teflicoli medefimi; qualche volta al semplice toccare la parte de' lombi, che è affetta, il malato strilla fortissimamente, come se gli si faceffe una puntura, ed allora è segno, che qui-

V1

vi fia fitto un calcolo nella patre inferiore del rene verso il pelvi; e veramente la maggior patre degli afcessi de reni, dei quali abbiamo le offervazioni, sono stati promossi da calcoli, come dalla cagione più possente, e in questi casi il malato ha ordinariamente prima patito di renella. Io ho veduto seguire la nestritate, e a questa l'afcessi de tene alla suppressione della podagra, ed è antica offervazione, che non solamente l'afecsione renale, ma il calcolo stessi occidente promo per la calcolo stessi della podagra.

215. Abbiamo più che di ogni altro ascesso delle viscere dell'addomine, molte offervazioni, che il rene apostemato o siasi spontaneamente aperto, o se ne sia fatta felicemente l' incisione. Quando dunque l'ascesso del rene sia evidente pei segni sovra esposti (214), e per così dire palpabile fotto il margine inferiore dell' ultima falsa costola, si dovrà fare una incifione lungitudinale parallela alle vertebre nel luogo della maggiore protuberanza, tagliando integumenti, e muscoli. Come si avanza col ferro, si esplorerà sempre più col dito l'ondeggiamento della materia, ficchè infine fi penetri nel follicolo dell' ascesso. Quando il rene suppurato ha dati que' segni esterni della postema (213), la materia non è sempre tutta compresa nella sostanza di esso rene, ma, essendo anche suppurata la tunica adiposa, che lo avvolge, non fempre alla prima apparizione della marcia fi dee credere di avere aperto il follicolo dell' ascesso : bisogna, per accertarcene, portare il dito indice della mano finistra più in dentro, e tafteggiare, se non si sente ancora esso follicolo pieno di umore, il quale poi, quando fi apra, non folamente fi vedrà colare, ma versare impetuosamente altra marcia, la quale allora verrà precisamente dal rene, I groffi vafi

Maniera di aprirlo.

#### 140 ASCESSI INTERNI DELL' ADDOMINE.

vasi di questa viscera sono più in alto del luogo . dove si può fare l'apertura dell' ascesso . non potendosi il rene aprire, se non sotto quel margine dell' ultima falla costola (213) fin dove debb' essere giunto l'ascesso; operando adunque con esattezza, que' vasi non possono essere offesi. Ma se sosse stato tagliato qualche ramo arterioso di qualche riguardo, il quale si sosse trovato tra i mufcoli, s' introdurrà un pezzo di fungo di quercia, o di esca, ed altri ligati ad un refe, fino che sia fatta sufficiente compresfione. Quando per la ferita fatta ai muscoli si porti il gammautte veramente sul rene, bisogna farlo penetrare lentamente, e con cautela, per non giungere ad aprire il peritoneo, che copre il rene nella sua faccia anteriore, perchè allora potrebbonfi offendere con grave pericolo altre parti, o le marce spanderebbonsi nella cavità dell' addomine . Colla marcia vedesi sempre uscire la urina (a), e sovente calcoletti, o sabbie.:

<sup>(</sup>a) Non è vero, che dall' apertura di tali ascessi esca sempre insieme colla marcia dell'urina. À un Pittore di questa Città, dopo atrocissimi dolori del rene finistro, i quali durarono interpolaramente ora maggiori, ora minori un mese circa, comparve infine alla parte finistra della regione lombale forto il margine inferiore dell' ultima falfa costola una poco elevata gonfiezza quasi edematosa, che si stendeva in giù due, o tre dita trasverse lungo it margine anteriore dell' origine comune da' muscoli facro-lombale, e lungo dorsale. Nel mezzo della gonfiezza eravi una macchia nera fimile a un' ecchimofi non più larga di un' unghia. Perchè dai segni precedenti fi aveva giusto fondamento di credere, che fi fosse fatto un ascesso a quel rene, si applicò il caustico potenziale su quella macchia, e n' uscirono per sette, od otto giorni materie icorose, e tenui, le quali probabilmente trapelavano dal profondo dell' ascesso a traverso i muscoli. Alla caduta dell' escara fi fentì col dito una mollezza circoscritta grossa

bie; anzi quando esce un calcoletto, bisogna restare in aspettazione di altri, poiche di rado un sol calcoletto impaccia la via delle orine,

e produce l'afcesso.

216. Sonvi inolte offervazioni, che dopo l'apertura dell'ascesso del rene siavi rimasta la fistola, la quale non potè guarire, se non colla estrazione di un nuovo calcolo, che era stato negletto, oppure non erafi da principio potuto estrarre. In caso di simile tistola, bisogna, per farne l'esplorazione, far uso di una candeletta, o di una tenta flessibile di pioinbo; si curerà poi con quelle cautele, che insegneremo nel Trattato delle ulcere. Enrico ROON-HUYSEN nella Parte prima delle sue Offervazioni Offervazione XXII. (a) narra di un uomo, a cui due anni dopo di avergli aperto un ascesso del rene destro, dal quale aveva estratto un calcolo affai groffo, fu obbligato di riaprire l'antica cicatrice, che si era un poco infiammata, dalla quale potè ancora trarre un altro calcolo poco più piccolo, e dopo quella feconda operazione godette una perfetta fanità. Egli è vero però, che tali fistole rimangono alcune volte incurabili, principalmente quando non cessa la nuova generazione di calcoletti, o

Onde naf a lafiflola, che rimane dopo l'apertura degli afcessi del rene,

quafi come la merà di un uovo, dentro la quale efsendofi fipitat la punta di una lancenta ranto profondamente, quanto fi potè, n'efci fubito una buona chicchera di marcia fichietta fensa cattivo odore, la quale continuò a colare per due mefi, e più, poi fi fece una foda cicarrice, nè mai fi vide Uticre la come menoma goccia d'urina. Sembra, che in quelto cafol' afeglo occupafse, e penerrafse nella fortanza medefima del rene, da che per tre mefi circa il malato pificiò del pus coll' orina.

(a) Queste Osservazioni Cerusche, che sono in numero di quaranta, sono state pubblicate in lingua Olandese a Amsterdam l'anno 1672, in \$.

## 142 ASCESSI INTERNI DELL' ADDOMINE

di arene; ma i pericoli di quegli ascessi sono così grandi, e pressanti, quando si presentano fino alla cute de' lombi, che il Cerufico non dovrà mai pentirfi di averne fatta l'apertura, maffimamente che fogliono restare ancor più facilmente fistolosi quelli, che si aprono spontaneamente. Leggete la seconda, e la terza sezione della prima, e feconda parte della grande Dissertazione dell'HEVIN sopra la nefrotomia, inserita nel terzo Tomo dell' Accademia di Chirurgia (a), che quivi troverete raccolte moltissime osservazioni, per le quali con maggior fiducia oserete aprire tali ascessi, e minor fastidio avrete della fistola, che talvolta rimanesse dopo la vostra operazione. Egli è sempre utile di effere armati contro i detrattori malevoli, i quali fogliono quali fempre condannare le operazioni più riguardevoli, perchè meno trequenti.

Afcessi tra il peritoneo, e i muscoli dell' addomine.

217. Nel paragrafo seguente ( 212. e seg. ) esporremo i segni, pei quali si possano conoscere gli ascessi prodotti dal latte nella cavità del pelvi, o tra il peritoneo, e i muscoli dell'addomine: quegli stessi segni topici indicano ogni altro ascesso, che si faccia in quelle parti; qui solamente debbo prevenirvi, che, conosciuta la flussione dell' umore ad una di effe parti tra il peritoneo, ed i muscoli, non bisogna argomentare della maggiore, o minore suppurazione dall' esterna elevazione del tumore; conciossiache più facilmente possa cedere il peritoneo verso la cavità, che i muscoli in fuori, ma bensì dalla continuazione, e veemenza de dolori, dal fenfo di maggiore, o minor gravezza,

Da quali fegni fe ne debba conghietturare l'ampiezza,

<sup>(</sup>a) Recherches historiques & critiques sur la néphroto-

#### NELLA REGIONE IPOGASTRICA: 143

vezza, dalla violenza della cagione, che ha prodotto il tumore, dalla frequenza degli accessi della febbre suppuratoria, dall'ampiezza dell'edema, o delle stimate risipelatose, infine dalla estensione, che si sente del vano al di sotto, mentre si comprime, senza poter comprendere colla mano alcuna globosità. Avendo io aperto ad un uomo un tale ascesso sotto, e da canto all'ombilico, ho potuto col dito indice, che v' introdussi, prima che il pus ne fosse tutto evacuato, toccare le vertebre de'lombi; conciossiachè il tumore interno ( il quale però era anche un poco elevato in fuori ) aveva alzati, e gettati da canto gl' intestini. Questi ampi In che moascessi possono essere evacuati per una piccola incisione di due, o tre dita trasverse, perchè, tolta la pressione alle parti interne, queste sempre più premono il peritoneo contro i muscoli, ficchè minor copia di marcia vi posta restare, e sempre più diminuendosene il ricettacolo, infine fi conglutini, e fi chiuda. L'apertura fi dee fare per la lunghezza del ventre. e non in trasverso, che più facilmente ne accadrebbe l' ernia ventrale.

do fi debbano aprire .

218. Nelle pertinaci iscurie, o strangurie può alcuna volta infiammarfi, e suppurare la cellulofa tra il peritoneo, ed i muscoli superiormente al pube: succede anco quella febbre suppuratoria, sentesi una tensione de' muscoli sopra quella parte, una gonfiezza distinta da quella della vescica con una certa gravezza; nasce presto l' edema degl' integumenti, e fassi un vero ascello, di cui sovente si può persino sentire la fluttuazione. Bifogna effere folleciti ad aprirlo, perchè altrimenti la materia macerando le tonache della vescica, questa può screpolarfi, e spandersi con grave pericolo insieme colla marcia la orina. Io ho veduto screpo-

Afceffi fopra il pufe trail eritoneo, e i muscoli come fi conofcano, e da che proce-

Voglione effere prefto aperti, e

#### 144 ASCESSI INTERNI DELL' ADDOMINE

Offervazione particolariffima dell' Autore, larfi la veſcica, ed aprirfi un tale aſceſſŋ in due luoghi, cioè ſuperiorimente alla ſnnfif del pube, e al lato ſiniſtro verſo l' anguinaglia, da dove la materia paſsò nel ſacco di un' ennia. Il malato gia da alcuni giorni non poteva ſoſrire il brachiere, e come per la giacitura ſinina più non erano caduti gl' inteſſini, i ſacco n' era reſato vuoto, il quale poi ſin, come disſſi, riempiuto di quelle materie, onde ne ho dovuto ſare l'apettura (a). În caſo di tal aſceʃſſi, ſe non ſi poteſſe mantenere nella veſcica una ſciringa, per togliere la preſſinoe, che è la cagione principale dell' aſceʃſo, biſognerebbe ſare un tagſio al perineo, o perſorare la verſcica per la parte dell' inteʃſino rato.

Ascessi interni nella regione lombale indipendenti dai reni.

219. Gravissimi, e di guarigione dubbiosissima fogliono esfere quegli afcessi, che si fanno nella regione lombale, fenza che ne sia stata cagione la infiammazione del rene. Giace la materia , che quasi sempre si è radunata per congestione, fra il peritoneo, ed i muscoli de' loinbi, i quali essendo molustimo crasti, e denfi, non permettono, che per quella parte fi possano avere perspicui segni topici dell' ascesso. Sente, egli è vero, il malato una gravezza, una ofcura distensione, o, come dicono, una lombaggine, cammina col corpo poco, o affai inclinato, giace più comodamente con certa obbliquità del corpo verío il lato opposto dell' ascesso, egli è cachetico, ed a misura che crefce la quantità dell'umore, e si scompone, succede quella febbre suppuratoria, ed allora fi la-

Loro fegni.

<sup>(</sup>a) Non si può capire, in qual maniera la marcia, e l'urina abbiano potuto penetrare nel facco emiolo, sidvo che si supponta o corrosso esto facco dalla stessa marcia, o un'ernia della refeira medesia, ma in un con quella deel' intestini.

gna di un profondo ofcuro bollore in quella parte, la quale, comparendo anche infine con una qualche elevazione esteriore, parrà indicare la vera fede dell' ascesso, onde il Cerusico possa prendere coraggio, e farvi un' apertura, con cui forse si potrà salvare la vita all'ammalato. come ne potete leggere alcun caso in Guglielmo Fabrizio ILDANO (a). E'alcuna volta accaduto, che la materia, facendofi strada, fia giunta a produrre un tumore all'anguinaglia fotto l' arco crurale: il qual tumore alla prima fua apparizione toccasi già fluttuante, quantunque affai profondamente, ficchè, avendo preceduto que fegni, fe tosto fe ne fa l'apertura, vedesi colare tanta marcia, che si possa credere venire essa da lungi, cioè dalla regione lombale, ed iliaca. Siate dunque avvertiti di non ritardare l'apertura di fimili ascessi, tofto che si presentino a quel luogo sulla cofcia (b).

(a) Vedasi tra le altre sue Opere Observationum, 6 curationum Chirurgicarum Centuria 11.

BERTRANDI TUM. TOM. I.

<sup>(</sup>b) Tutte le vertebre lombali, oltre i ligamenti particolari, che tra di se connettono due vertebre vicine, ne hanno alla faccia anteriore del loro corpo uno, che è comune non folamente ad esse, ma anche alle vertebre dorfali, chiamato dal WEIT-BRECTH ( Syndefmolog. tab. x. fig. 37. a b ) ligamento anteriore comune, o fascia lungitudinale anteriore. Quefto ligamento nella decrepitezza efficcandosi, e ritraendofi, è la cagione dell'incurvamento della fpina, che suole accadere in quella età. IPPOCRATE nel suo libro de articulis lasciò scritto: Ex his, quibus sub fepto transverso gibba spina est, nonnullis renum, & vefica vitia superveniunt, sed & abscessus ad ilia, & inguina, qui diu manent, & ægre sananiur, quorum neutrum gibbum folvit. GALENO nel Commento 111. testo X. a quel libro d' IPPOCRATE attribuisce la formagione di tali afcessi nelle regioni iliache, e negl' ingui-

Afceffi delle natiche. : 220. Le affeçioni ischiatiche possono anche terminare con un ascesso, il quale talvolta si

ni consecutivi alla gobba, che si fa sotto il diaframma. l'attribuisce, dico, al consenso delle parti, ma non ispiega, come questo consenso si faccia. Il celebre CAMPER ( demonstrat, anatomico-patholog, lib. 2. eap. 1. n. 6. ) fa con molta fagacità offervare, che, dipendendo quella gobba ordinariamente da un tumore, che per lo più degenera in ascesso, nato tra al corpo delle vertebre, e quel ligamento lungitudina. k, la marcia trova una strada bella, e fatta, per portarfi dai lombi nella foffa iliaca, e da quefta agi" anguini fotto l' arco crurale, stanteche quello stesso ligamento dà origine alla guaina aponeurorica, che veste i due muscoli psoas, e poscia l'iliaco interno, donde viene poi a inguainare al di fotto dell' arco erurale il tendine comune al psoas, e all'iliaco. Noi ne abbiamo trovato uno di questi ascessi nel cadavero di un fanciullo rachitico, e gobbo, che occupava tutta la fossa iliaca destra al di sotto di gnell'aponeurofi, che ferviva di follicolo alla marcia. Una fanciulla abbiamo ancor di presente in cura, alla quale, dopo essere comparso esternamente al lato destro de' lombi un ascesso, il quale su aperto col caustico potenziale, s'incurvarono indietro le tre prime vertebre de lombi, e fei mesi dopo comparve un tumore alla regione iliaca dello stesso lato, nel quale non fi potè fentire un qualche ondeggiamento, se non molto tempo dopo tra le due spine anteriori dell'offo ilio. Si apri nello stesso modo questo nuovo ascesso, e n'esci per molti giorni, e n'esce ancora molta marcia, e si conosce colla tenta, che il feno va oltre la regione iliaca fino ai lombi. Abbiamo pochiffima fperanza della guarigione di questa fanciulla, si perchè probabilmente le vertebre sono già cariofe, sì perchè ella è al fommo emaciata e da questo ascesso, e da altri fattisi in diverse altre parti del corpo. Il lodato CAMPER nel luogo citato dice di averne veduto guarire uno, che occupava la natica, e tutto l'osso iliaco finistro, soggiungendo, che il malato rimafo rigido de' lombi era coffretto d'andare col tronco inclinato all'orizzonte. In un fanciullo, che era gobbo al di fopra del diaframma, formaronfi diverle fifiche e all' inguine, e lungo

#### DELLE NATICHE, E DELLA COSCIA. 147.

fa fotto i due primi muscoli gluzi, sicchè la natica ne fia elevata in tumore, ma fenza alcuna varietà di colore alla cute a cagione della profondità della materia: il muovimento dell' articolo è difficile, e dolorofo, esso articolo poco, o affai greve, e quafi stupido per la pressione, che la materia sa sopra i nervi sacroischiatici, il tumore rappresenta un emissero, e quando si comprime da un lato, e dall'altro, fentesi l'ondeggiamento della materia, come se fosse racchiusa in un denso, e tesistente follicolo. Nello scomponimento di essa materia succede poi anche la febbre suppuratoria. Anche in questo caso bisogna essere solleciti ad aprire l'ascesso, acciocche la marcia non giunga a spandersi in luoghi ancor più prosondi, dove collo strumento non si possa forse arrivare, o infine non tia afforbita con grandiffimo danno. In questo ascesso il taglio si dee anche fare asfai profondo, dovendo il ferro oltrepassare la spessezza di que' muscoli, e si dovrà fare secondo la lunghezza della natica. L' HOLLERIO nel lib. 2, cap. 1. delle Instituzioni Cerusiche ci avvertifce non folamente di non tagliare, ma neppure di scoprire il nervo sacro-ischiatico, perchè ne potrebbe restare stupido l'articolo, quanto poco quel nervo fosse osfeso, non dice già dallo strumento, ma solamente dall' aria. Alcuna volta la materia sparsa contro i muscoli

Come fi con

Quando, e come fi debbano aprire.

Non fi dee fcoprire il nervo facroifchiatico.

la cofcia, ed efsendo finalmente morro consunto; trovo il corpo delle vertere lombali, e di alcune di quelle del dorso affatto corrofo dalla marcia. Vedefi da quefla ultima ofservazione, che gli afceffi alla regione illuca, e agli inguini fi fanno fia che la gobba trovifi al di fopra, o al di fotto del diriffammas, persente quel ligamento fi flende, come fi è detto, anche lungo il corpo delle vertere dordra.

Afceffi profondi della parte fuperiore della cofcia. quattro-gemelli della coscia giunge a comprimere il collo del femore, che poi il capo n'è spinto fuori della cavità contoidea: allora la coscia divien gonfia sotto l'arco crurale, e attorno i trocanteri. Ma per lo più così tardi fi conosce un tale ascesso, e così tardi se ne sente la fluttuazione, per poter diriggere il taglio, che, quando pure si apra, trovansi disfatti, e laceri que' muscoli, macerato, ed aperto il ligamento capsulare, consunto il rotondo, e carioso l' osso; onde, se pure il malato non muore tabido per la continua generazione della marcia, e più prestamente pel suo riassorbimento, resta almeno storpio dell' articolo, e questo medefimamente per lo più emaciato, e stupido. Nel Trattato delle ulcere insegneremo il modo di curare i suppurati internamente, e i cachetici: per ora basti di avervi avvertiti di questi cafi, i quali potrete ancor meglio conoscere, ed acquistar maggior fiducia per trattarli, se vi accostumerete a leggere gli Scrittori di offervazioni; che artem experientia fecit , exemplo monstrante viam (a).

Degli ascessi lattei.

§. V.

Sede, cagioni, e differenze degli spandimenti lattci. 221. Accade qualche volta, che nelle nutrici e ancor più fovente che nelle puerpere l' umor l'atteo fi spanda nella cavità del pelvi, il che suole avere per cagione principale l' impedita, o la suppressa s'eparazione del latte nelle mammelle, onde queste sogliono, prima che quello spandimento si faccia, rendersi ricascan-

<sup>(</sup>a) Manil. Astronomic, lib. 1, verf 61.

ti, ed esauste. La sede dello spandimento è o nel teffuto cellulare contro le pareti del pelvi, e negl' interstizi de' muscoli, o nella duplicatura de' ligamenti larghi, in una comune cavità, oppure egli è cellulare, e diviso in vari follicoli.

222. Quando tale inzuppamento si fa nella Loro fegni, cellulosa del pelvi, e negl'interstizi de' muscoli . l' ammalata fi lagna , tofto che comincia . di debolezza nella cofcia, di dolore ottufo nell'inguine, e di peso nel pelvi a quel lato. ove fi fa l'inzuppamento, o ad amendue, fe ad ambi i lati va facendosi. Quando poi è fatto, alcune volte col tatto possiamo assicurarca del tumore, sentendosi in quelle parti una certa fpugnofa mellezza, turgenza, o spessezza: stando l'ammalata coricata ful dorfo, prova molto maggior dolore, quando allunga le cosce, per la pressione, che allora fanno sul tumore il muícolo pfoas, l'iliaco interno, e il loro tendine comune, ed ecco perchè in fimil caso fuol tenere le cofce piegate: anco il cordone de' vasi crurali è doloroso per qualche tratto fotto l'inguine, e vi si scorgono attorno e per la lunghezza piccioli nodi, o gonfiezze della tunica cellulofa.

223. Se il tumore si è fatto nella duplicatura de' ligamenti larghi (221), essendo allora elevato, e distratto il ligamento rotondo accanto la vulva ( che è il luogo della fua inferzione ). fente quivi la donna un dolore più, o meno acuto. Egli è raro, che l'inzuppamento fi faccia da principio in amendue que' ligamenti, piuttosto si dilata nella cellulosa del peritoneo. onde si osserva qualche gonsiamento dall' osso ilio. di quel lato al pube, o in vicinanza delle vertebre de' lombi, e dell' offo facro, anzi fovente si dilata giù per la coscia alla gamba, e

quando fi cellulofa del pelvi.

fanno

fino al piede, le quali parti allora divengone curgide, e tese, ma non trasparenti, e lucide, come nell' edema, piuttosto di un color di perla biarico, e latteo, nè da principio così facilmente vi rimane l'impressione del dito.

Segni della loro dilatagione alle eftremità inferiori.

224. La dilatazione dell' inzuppamento lattes dal pelvi alla coscia, abbia esso la sua sede nella cellulosa (222), o ne' ligamenti larghi (223) ( che in amendue i casi suol farsi ), si annunzia con una tenfione fommamente dolorofa alla cofcia, principalmente lungo il cordone de' vasi, e nervi crurali, cioè dall' inguine alla parte interna della cofcia, al poplite, e profondamente nella gamba, ma sovente senza calore, nè roffore, o gonfiamento apparente : ne' seguenti giorni cresce la tensione nella gamba, e trattanto compare il gonfiamento della coscia, la quale però diventa men dolorosa, ed a questo modo la tensione, ed il gonfiamento fi fuccedono fino al piede, diminuendo fempre il dolore, come cresce il gonfiamento, anzi accade piuttofto una certa stupidità, e impotenza di quell'articolo. Tale modo, col quale questi inzuppamenti procedono, oltre lo stato di nutrice, e del puerperio, e qualche volta anche della gravidanza, che come cagione li muove (221), li fa abbastanza distinguere dai gonfiamenti semplicemente edematosi: sogliono anco esfere annunziati della perdita dell'appetito, e del fonno, da una febbre leggiere, alcuna volta continua, altre volte intermittente, i cui accessi cominciano con un piccolo, e freddo tremore. Alla loro apparizione fono quali fempre suppressi, o colano scarsamente tenui, e fierofi i lochj . Il LEVRET scriffe (a) non ac-

<sup>(</sup>a) Nella già citata fua Opera intitolata : L'ag

cadere a quelle donne, che allattano, e poterne essere sorprese le nutrici, quando cessano di allattare. Bifogna anche notare, che nome fempre gl' inzuppamenti lattei, che fi fanno nelle estremità inferiori, hanno origine dallo spandimento del latte fattosi prima o nella cellulofa del pelvi (222), o nella duplicatura de' ligamenti larghi dell' utero, dal qual luogo fi intuppamenti propaghi in quell' articolo; che alcune volte cofcia fono veramente gontia primitivamente lo stesso arti- primitivi. colo, non essendovi segno di alcun numore in quelle parti fuperiori alle quali talvolta piuttosto accade conseguentemente allo spandimento fatto alla cofcia.

lattei della

225. La rifoluzione dei descritti inzuppamenti Facilmente fuole cominciare alla cofcia, fiegue poi alla ne accade la gamba, e finalmente al piede; ma fe, mentre diminuifee il sumore della cofcia, non fopravvengono fudori, orine, o fluffo di ventre abbondanti, e lattei, bisogna temerne la metastasi, o lo spandimento in altro luogo. In fatti si vede sovente . che l'umore in simili casi trafcorre dalla cofcia alla natica, e ai lombi del medefimo lato, o alle stesse parti dell'altro lato, alla gamba, ed al piede. Allora l'ammalata he una maggiore interna, e universale agitazione, la respirazione affannata, mal di capo, e la febbre più forte, i quali fintomi appoco appoco diminuiscono, e' infine ceffano, terminata la metastasi . Accade qualche volta, che l'umore a ripartifce ad amendue gli articoli, o fi spande per tutto il corpo.

metastasi, come, e dove quefte ff factia, e come fi cono-

226. Sul principio degl' inguppamenti lattei bisogna tentarne la rifoluzione, la quale in quelli, che hanno avuto origine dalla suppressione del latte nelle mammelle (221), più facilmente fi ottiene; richiamando il latte ad esse mammelle. Conviene trar fangue dal braccio o dal piede fecondo

Cura interna per ottenorne la rifoluzione .

lo stato presente dell'ammalata; anzi il celebre Puzos in una sua disfereazione dei tumori prodotti dal latte (a) vuole, che le cavate di fangue fiano frequenti, e fuccessive, parendo che in esse egli mettesse tutta la fiducia per risolverli. Beverà l'ammalata decozione, o acqua distillata di parietaria, di malva, di viole, e fimili, aggiungendovi qualche cucchiajo di sciroppo delle cinque radici aperitive, e XII. granidi sal fisso di tartaro, supposto però che non visia molta infiammazione, nè orgasmo, ed in fimile caso si terrà l'ammalata sufficientemente coperta in letto, e le si proccurerà un leggiero, e continuo sudore, facendole anco bevere alcuna dose di acqua distillata di fiori di sambuco, e di ninfea .

Cure efter-

227. Alle parti si faranno fomentazioni ammollitive, e risolventi, e vi si applicheranno cataplasmi di pane, e di latte con tuorli d'uova, ed olio di gigli bianchi, oppure con zafferano, se non vi fosse molto dolore, oppure quelli fatti colle quattro farine risolventi, e colla decozione di fiori di sambuco, e di camomilla. In fimile caso il Puzos propone medesinamente le unzioni col sapone molle, e butiro fresco mescolati insieme, o coll'olio di palma, o di mandorle dolci mescolato con quello delle amare. ai quali si aggiungano ( supposto però, che niente vi sia d'infiammazione ) alcune gocce di Spirito volatile di sal ammoniaco: infine, movendosi la risoluzione, si potranno usare quegli stillicidi, bagni, o lavande del LEVRET, che abbiamo proposto per le mammelle (130). Ma que' due celebri Maestri vogliono, che la risoluzione si

<sup>(</sup>a) Vedasi il suo Traité des accouchemens &c. avec trois mémoires sur les acports laiteux. Paris 1759. in 4.

ajuti con leggieri purganti, quando essa abbia una volta cominciato, e perciò dapprincipio si daranno due, o tre clisteri al giorno semplicemente ammollitivi, quindi qualche purganie per bocca, come il sale de duobus ec..

218. Malgrado l'uso de' risolventi (227), niente di manco alcune volte cresce l'interna agitazione, succede una maggiore elevazione suppuraziodel polío, ed un forte rigore di freddo, come se fosse di una febbre intermittente, ed allora maggiormente duole . e gonfia la parte . perchè vi fi determina la suppurazione.

229. Qualche volta la materia di tali tumori suppurati si evacua per la via delle orine, e delle fecce, come ne abbianto alcuni esempi, la qual evacuazione non di rado continua per settimane, e mesi con sebbri irregolari; nel qual caso convengono le decozioni vulnerarie, e i balfamici aggiunti ai clisteri. Ma se ciò non accade, quando il tumore è stato fisso, e limitato attorno il pelvi, la suppurazione suole presentarsi esternamente all' inguine o sotto il legamento del FALLOPPIA più insù, o più ingiù, ma sempre in que' contorni con un tumore lungo non molto elevato, fotto cui affai fovente fi sente piuttosto un inzuppamento edematoso. che la fluidità di un travafamento: quivi fi debbono applicare cataplasmi quanto più si potrà ammollitivi, e suppuranti, e, quando i segni della suppurazione fatta siano evidenti, qui pure dovrassi aprire. Non sempre però tanto si attenua la cute, nè fi estende tanto ingiù il tu-

more, che non vi resti dubbio sulla presenza della marcia, corcioffiachè la materia del tumore trovandofi nella cellulofità del peritoneo fotto i muscoli dell' addomine, questi non posfono cedere, come cede il peritoneo (217); consequentemente oscura, e profondissima n'è la Segni, che indicano farfene

volta la natura ne evacui la mar-

Segni della Suppurazione fatta .

fluttuazione, fe pure alcuna fe ne può fentire ; tutto al più, dissi, agl' integumenti si osserva qualche poco di edema con qualche striscia, o marca rossigna, sicche si dee piuttosto co' segni razionali della fuppurazione conghieturarne il raccoglimento, combinando infieme i fintoini preceduti, ed i prefenti, e poscia con certa ragionata fiducia facendo l'apertura, si vede da un piccolo tumore uscire per lo più tanta quantità di marcia, che ben dimostra venire da lingi. Non di rado la suppurazione tarda moltissimo a produrfi, che bisogna aspettarla con grande fastidio e settimane, e mest; ma quanto più presto si produce, essa è sempre meno putrida. Dall' apertura di un tale ascesso io cho veduto uscire puro latte con grumi veramente caseofi (a).

<sup>(</sup>a) Non sempre gli ascessi, che si fanno nella fossa iliaca nelle puerpere, fono prodotti dal latte; qualche volta dipendono dalle contufioni fatte in quella parte dalle ruvide mani degli oftetricanti, i quali ne' parti disficili, mentre le introducono nell' utero, o per mettere nella natural fituazione il feto, o per istaccare la placenta, non di rado oltre le pareti dell' utero ammaccano le parti, fulle quali esto appoggia, quali fono in quello ftato i mufcoli píoas, ed iliaco interno coll'abbondante membrana adipofa, che li copre . Dall' espertissimo Chirurgo signor Giambatista VERNA, che è con onore più d' una volta citato dal BERTRANDI nelle sue Differtazione de hepate, & oculo, sonoci ftate graziosamente comunicate moltiffime osservazioni di Chirurgia fatte dalfuo Bisavolo Alberto VERNA, di cui faremo a suo luogo ufo, tre delle quali fi aggirano intorno ascessi fattifi nella faccia interna delle ofsa iliache per fimili consusioni. La prima narra di una puorpera, a cui, dopo gravi delori di ventre, più forti però nella regione iliaca destra, sopraggiunsero dejezioni purulente, e fetide, per le quali emaciata mori quattro mefi dopo. Nel cadavere fa trovarono quali tute

230. L'ascesso aperto fi medichera secondo Cura interil metodo ordinario: fi darà una fituazione alla parte, per cui le marce colino più facilmente, e si continueranno i rimedi vulnerari interni (229), finche fia esaulto il fonte della supprerazione, il quale alcune volte dura moltiffimo fino a ridurre al marasmo le misere donne.

na. ed citerna dopo aperto 1º ajceffo.

te le intestina livide, e tra le loro anfrattuosità molta marcia. Questa veniva da un'apertura fattasi al peritoneo dirimpetto alla fossa iliaca di quel lato, la qual fossa conteneva un ampio ascesso, che stendevasi verso i reni quasi sino al diaframma. Tutta la cellulare di quelle parti era confunta, e nudi vedevanfi i muscoli psoas, ed iliaco, e il cordone de' vasi iliaci: l' accennata apertura del peritoneo comunicava con un foro fattofi alla proffima parte del colon, onde si spiegano quelle lunghe dejezioni purulente. Hoc exemplo ( riflette molto a proposito l'avveduto Osservatore ) aliifque quamplurimis edocti, ubi perfectae suppurationis signa habeantur, serro viam esse exterius aperiendam sentimus, duos, vel tres digitos transversos supra inguen, & infra cristam ossis ilii, incifionem, quantum satis sit, profundam instituendo. Multis quidem (soggiunge egli) operatio isla imprudens, ac prope temeraria videri potest, propter periculum intestina perforandi, quod tamen periculum vitari poteft, si instrumentum instituenda apenura deftinatum aliquantisper ilii offi adharendo introducatur, ita tamen ut iliacus muscus eidem offi accumbens non lædatur - Colletti enim humores inter peritonaum, & membranas ( cioè nel tessuto cellulare, e forse anche sotto la guaina di quel muscolo ) vel inter membranas, & musculum, idem peritonaum, adeoque proxima intestina ab iliaco musculo separant, atque abducunt, ut ferro transitus tuto concedatur; e lo prova colle due seguenti osservazioni, nelle quali fatta a tempo nel luogo indicato l'apertura riesci felice. Nota inoltre, che gli ascessi in quelle parti negli uomini non meno, che nelle donne qualche volta procedono dalla flanchezza de' lunghi viaggi, o da violente corfe, e ne adduce due osservazioni: i malati curati in quel modo in poce tempo perfettamente guarirono.

Gli afceffi lattei lungo l'articolo inferiore fono meno utili, e perchè. le quali ne possono poi morire, potendos internamente produrre la canctena, o lo ssaccio (332), se pure non si sa una metallasse mortale, 231. Gli ascesse, che si sanno lungo la coscia, o alla gamba si debbono curare nello stesso modo: questi sogiono essere di minore utilità, perchè pel loro mezzo non sono per lo più abbastanza alleggerite le parti interne, la lessone delle quali è motto più pericolosa.

Vedasi alla fine di questo Tomo la nota \*

# DEI TUMORI CALDI

ORDINE IV.,

Che tratta della Cancrena.

Definizione della cancrena, Dello sfacelo.

232. A cancrena, altrimenti chiamata mortificazione, o necrofi, è la perfetta estinzione di ogni forza organica in alcuna parte del corpo animale: la quale, quando occupa tutta la massa di un membro, allora chiamasi sfacelo (a).

<sup>(</sup>a) La parola Greca gangaina viene dal verbo graino, comedo, depafor o node alla lettera fignificher bebbe piutrofto un'ulerra depafente, che la morificazione di una parte; ma le fi e dato tal nome petchè ordinariamente, quando fi mette la un membro, fuole ftenderfi, e far progretii nelle profilme parti. Il vocabolo necofii, che viene dal verbo necroo, morifico, interimo, cortifipode appuntino all'italiano morificazione. Spatelas poi, ovvero fibacetifimos viene dal verbo fiphago, che fignifica ammazzare, mettere a morte; dal che fi vede, che quelte tre voci hanno apprefs' appoco la medefima forza. Gli Antichi però fotto il pome di caercasa intendeg.

Diffinzione na in umida. e in fecea.

233. La cancrena è la pessima terminazione de' tumori (13), delle ferite, e delle ulcere; ne della cancrefempre le parti, quando si cancrenano, sono tumefatte; quindi fu fatta la divisione della cancrena in umida, e in secca. In quella le parti precedentemente tumefatte fono confeguentemente inzuppate di alcun umore, e prima di cancrenarsi ancor più gonfiarono: in questa la parte è piuttosto secca, arida, ed emaciata. Nelle cancrene umide suole prestamente accadere la dissoluzione putrida degli umori, perchè tali cancrene fogliono succedere agl' impetuofi muovimenti, che hanno prima infiammata la parte, e predisposta quella dissoluzione: nelle secche manca per l'ordinario dapprincipio tale dissoluzione.

234. Le cagioni della cancrena poliono effere esterne, ed interne. Tra le prime si contano le gravi contustioni, le ligature strettissime, l'aria freddissima, l'applicazione de'corpi agghiacciati, le ferite avvelenate, e quelle, a cui sopraggiunge, per ragione della struttura della parte, la infiammazione suffocativa, le forti compressioni, gli astringenti repercussivi, gli oleosi, e Soprattutto i rancidi , e tutt'i rimedj acri , flimolanti, o corrosivi applicati sulle insiammazioni, il lungo, e costante decubito sopra di alcuna

Cagioni la cancrena.

vano comunemente la mortificazione incominciante, che era ancor capace di guarigione, e fotto quello di necrosi, o di sfacelo, e i Latini sotto quello di sideratio la mortificazione perfetta di una parte, che non ammetteva più altro rimedio, che l'amputazione . Il Latinissimo CELSO, come si può vedere dal cap. 26. n. 31. del lib. v., e da altri luoghi ancora, chiama la cancrena, e lo sfacelo ora gangrana, ora cancer,

parte. le scottature, e simili.

Interne .

235. Le interne possono essere gli eccessivi muovimenti d'infiammazione, l'acre putrefaciente costituzione degli amori; come si osserva nelle fibbri matigne, nel vojuolo, nello frorduo, nelle rispose matigne (sol), nelle affezioni cancienose, la putrida spontanea dissolutione degli umori ristagnanti, i veleni, l'atonia, la rigidità, la compressione de vasse, o nervi maggiori. L'intensità delle quali cagioni, e la perseveranza possono sempes fare temere la cancena, s' essa non è ancor satta, ed accelerarne il progressione della solutione della commenza possono in migliori rimedi, come dimostreremo a suo luogo (218., e fg.).

Le cancrene umide fi fanno talvolta con fomma preftezza; e quando.

236. Sonvi sancrene, che si fanno quasi instantaneamente, non che si possano impedire di passare in sfacelo, massime quelle, che da una cagione maligna, velenosa, e deleteria procedono, come si osserva ne' carboncelli maligni (177), o pestilenziali, nelle parotidi suffocative (102), nel sommo grado dello scorbuto, nel furore delle febbri maligne, vajolose (235), e fimili; in quelle cancrene però fempre precedono i fintomi dell'inzuppamento, e della fuffocazione, onde fono cancrene umide (233). Allo incontrario le cancrene secche ( ibid. ) fi fanno quasi sempre appoco appoco, che appena il malato se ne accorge, e da minime parti principiando, lentissimamente procedono: alcune volte però alla cancrena fecca succede l'umida, e in questo caso i progressi della prima sono più celeri.

Le fecche fifanno lentamente.

#### Dalla Cancrena umida :

### S. I.

237. Il celebre QUESNAY (a) ha compresa la cancrena umida (233) fotto i seguenti nove capi, i quali sono per lo più le cagioni congiunte, o i modi fisici, secondo i quali le parti possono eslere affette, perchè si cancrenino, cioè infiammazione , strangolamento , infeltrazione , contusione, stupefazione, morsi di bestie velenose. putrefazione, congelazione, e scottatura.

Cagioni ne umida.

Segni della

238. Quando si fa la cancrena per infiammazione, diminuiscono, e infine cessano i suoi fintomi, il tumore s'abbassa, la parte diventa fredda, e stupida, senza moto, e senza senso, cinericcia, pallida, fosca, livida, e nera, molle, ricascante, e spugnosa, che non si rialza dopo la compressione, sorgono pustule, e vesciche piene d'un icore linfatico, giallognolo, roffigno, quelle pustule, e quelle vesciche infine fi fcrepolano, e n'esce quell'icore, che tramanda un puzzore cadaverico (22).

239. Trattando del flemmone suffocativo abbiamo infegnato, come dobbiamo opporci alla violenza di que' fintomi , che possono determi- Cura ropica narne la cancrena (88., 89., e 90.); ma fe finalmente i vasi hanno perduta ogni azione, e la parte è veramente mortificata ne' fuoi termini, le scarificazioni bisogna farle per tutta l' altezza della mortificazione, finchè il malato dia fegno di fentirle, e n'esca il sangue vivo. Fatte le scarificazioni, si laverà, o somenterà quella parte con acqua calda, o col vino bianco, in cui fiafi disciolto sal comune, sal gemma,

<sup>(</sup>a) Traité de la gangrene à Paris 1764. in 12,

fale ammoniaco, o borace; oppure fi facciano la vande collo spirito di vino, e fi continuino le somentazioni con decozioni di piante aromatiche, quali sono, oltre quelle, che allora abbiamo accennate (90), la centaurea minore, il cardo santo, il dirtamo, il maro ec., cotte nel vino bianco, aggiungendovi mirra, aloe, e spirito di vino, per avvivare il rimedio, e renderlo più efficace, onde possa resistente alla putresazione, che va inducendosi nella parte. Nella testa decozione di quelle piante si possono di trata decendosi manne cataplasimi colle fatine di save,

di linfeme, di meliloto ec.

L'infanmazione femplice raramente è causa
della cancrena: quasi
sempre vi
è congiunto
il vizio degli umori.

5 1..2:2

Segni, che dimostrano quel vizio. mazione semplice, quantunque grande, termini in cancrena, se gli umori non sono pervertiti, e divenuti di una natura acre, e putrefaciente. In fatti fi offerva in pratica, che la cancrena in simili casi infiammatori si fa con tanta prestezza, che pare procedere come da un contagio velenofo: fi perde quafi in un attimo tutta la fenfitività della parte, ed il malato, dopo il tormento di un violentissimo orgasmo. rimane debole, e spossato, impallidisce, e soffre alcuna fincope, perde fempteppiù le forze, e ha un polfo languido, e picciolissimo. I rimedi semplicemente antiflogistici hanno poco, o nulla giovato, e si vede, che le ripetute cavate di sangue furono piuttosto perniciose, avendo accelerata la cancrena, perchè hanno dato uno spazio maggiore alla dissoluzione putrida ( 123., 170., 182.). Conviene piuttofto allora ravvivare le forze vitali cogli alessifarmaci, e diaforetici , come fono le decozioni di scorsonera , di contrajerva, di scordio, di cardo benedetto, di sambuco, di camomilla, la decorione della raspatura del corno di cervo , la confezione alkermes, la giacintina, il bezoar, la triaca, il mitri-

Cura interpa . mitridato sciolti nell' acqua alessiteria, in quella di tutto cedro, di menta spiritosa, o triacale. Altre cautele per la cura della parte accenne-

remo quì appresso (250., e seg.).

241. Lo strangolamento dipende o da un'applicazione efferiore, come fono le forti legature, prodotta da o dallo stiramento, e somma distrazione di al- strangol cuna parte membranofa, aponeurotica, tendinosa, o nervosa. Lo strangolamento, che arresta il sangue nelle vene, può produrre un inzuppamento prodigioso anco senza infiamma. zione ragguardevole. Lo Swieten racconta (a) di un giovane briaco, a cui, essendosi addormentato ritto in piede, ed appoggiato co'go- Offervaziomiti sopra una finestra, le legaccie delle calzette ne dello troppo strette talmente avevano compresse le vene, che svegliatosi il mattino cadette per terra, come se gli fossero mancati i piedi, le gambe erano molto gonfie, e senza grave infiammazione in pochi giorni gli fi cancrenarono fino alle cosce, onde dovette morire. Ognuno Cura della fente, che tali strangolamenti si debbono tostamente togliere, ravvivare con fregagioni, e menti esteriacogli spiritosi l'azione delle parti, quando però vi fia solamente quello stupore, che dipende. dall' inerzia dell' organo, e non ancora la putrefazione degli umori; che allora fi dovrebbero fare le scarificazioni, come per la cancrena prodotta da infiammazione maligna, e suffocativa (239., 240.).

242. Gli strangolamenti, che succedono per ragione della struttura delle parti affette (241), fogliono essi pure promuovere la cancrena,

Cancrena

. .2

SWIETEN

prodotta da Strangola-

In qual mo-

do fi faccia la cancrena

per istrangopendenti dalla ftruttura della -(a) Ne' fuoi Commentari agli aforifmi del BOERAAVE parte . de cognoscendis, & curandis morbis aphor. 422. tom. I.

pag. 740. dell' edizione di Torino. BERTRANDI TUM. TOM. I.

fenza che vi precedano fempre i forti fintomi di una grave infiammazione, e di molto inzuppamento. Anzi alcune volte la infiammazione. che fi fa nelle parti, ove fonvi aponeurosi, non produce una tumefazione apparente, che annunzi la cancrena, perchè questa si fa profondamente, prima che appaja agl' integumenti, ficche sovente i Cerusici ne restano sorpresi. Non basta in questo caso di scarificare quanto v'è di cancrenato, ma bisogna penetrare più lungi, cioè a quel luogo dove pei principi di Anatomia fi può credere effervi la tenfione della parte, che fa lo ftrangolamento, e quella recidere, come meglio dimostreremo nel Trattato delle ferite. Quella tenfione bifogna principalmente togliere, e alcune volte basta un picciolo taglio al luogo preciso della medefima, perchè la cancrena tostamente si arresti, come appunto si arresta quella degl'intestini pigiati nell' anello, quando si screpolano, ficché, vuotandosi, non siano più turgidi, e conseguentemente neppure strangolati. Dopo le punture dell'aponeurosi del bicipite nella cavatadi sangue, basta, quando già comincia la cancrena all' avan-braccio, la recisione di quell' aponeurosi, per impedirne i progressi. Ma i lumi, disti, dell' Anatomia debbono in simili casi determinare i luoghi, dove, tagliando, fi poffa ficuramente togliere lo strangolamento.

Come secai da la cancrena per infeltratione.

Cura :

243. La infeltrazione degli umori, che fi fa negl'intuppamenti linfatici, produce, quando è è artivata al fommo grado, l'efinzione del movimento vitale, per la fomma dilatazione de vasi linfatici, e delle cellule; ficchè perdano la loro forza, la quale anco difficilmente fi potrebbe fostenere, effendo in queste malattie fempre debole, e infievolito il principio della vita in tutto il corpo, o almeno nella parte. Una leggierissima infiammazione precede alla cara-

crema

crena, della quale meno fi accorgono i malati. Segni ? pel gran lentore, e freddezza, che già foffrivano. Secondo la maggior parte de' Maestri, in questo caso le scarificazioni non si debbono fare sopra l'escare cancrenose; conciossiache vi fi potrebbe accelerare la dissoluzione putrida, cura; per cui essa cancrena dee maggiormente spanderfi, ma fi faranno piuttofto ne' proffimi' luoghi, ed anco superfiziali, purchè per esse si possa evacuare parte di quella linfa, la quale forma l'inzuppamento. Sulla parte cancrenata fi debbono poi applicare filaccica intrife nell' acqua di calce, e sul resto del membro edematoso cataplasmi fatti colle farine risolventi cotte nell' offimele, o nel vino colle polveri di quelle piante aromatiche, che quì sopra abbiamo annoverate (239). Poco, o nulla giovano le fomentazioni, perchè tosto si raffreddano pel continuo gocciolamento del fiero; perciò questi stessi cataplasmi si deono applicare piuttosto più caldi, che negli altri casi, ed affai spessi, acciocchè così presto non si raffreddino; se ne potrà medefimamente confervare il calore, applicando attorno il membro ampolle piene d' acqua bollente, tegole, o mattoni caldi, o facchetti pieni di fabbia, o di cenere calda. Quanto suole gocciolare l'umore, altrettanto poi si vede la cancrena circoscritta, ed allora. dalla circonferenza dell' escara scaturisce una materia purulenta, per cui quella incomincia a muoversi, e finalmente si separa ajutata dall' uso de' digestivi animati, come farebbe l'unguento di stirace rimescolato con aloe, e mirra; ma quantunque la cancrena si spandesse, ed approfondasse, siate cautissimi nel fare, o nel ripetere le scarificazioni, che poi nulla, o poco giovano, anzi, come abbiamo già avvertito, piuttosto accelererebbono la disfoluzione putrida;

e ficcome per l'inerzia del movimento vitale; che in questi casi occupa sempre una gran supperficie, sovente i malati muojono, potrebbe ad alcuni sembrare, che piuttosto per quelle scarisscazioni si sossi di accaduta la motte.

Attenzioni da averfi, quando la infiammaçiona crefce.

244. In questi casi si osserva anche, che quanto più la cancrena fi avanza, la infiammazione fi fa tanto maggiore nelle parti vicine. ma però di un color rosso molto intenso, e con una tenfione, di cui non pareva capace quella parte, la quale prima forse era per l' inzuppamento linfatico molto molle, ed inerte. Giovano allora le fomentazioni fatte a que' luoghi colle decozioni di fiori di camomilla, di sambuco, e di lupini animate con po' poco di spirito di vino; difficilissimamente però quella infiammazione si risolve, anzi piuttosto si cancrena, se tostamente non si eccita la suppuragione attorno l'escare: iono anche state provate utili in simili casi le fomentazioni fatte colla decozione, o infusione di corteccia peruviana nel vino generoso bianco, o rosso, anzi se ne può applicare la polvere nelle screpolature dell'escare, o mescolarne coi digestivi .

245. Della cancrena, che può succedere alle gravi contussoni, o suppesationi, e alle scottature tratteremo in Capitosi particolari delle serite, richiedendo essa diverse attenzioni, e cautele secondo la parte affetta, e la quantità della contussoni custosi perspessione, o scottatura, e di vi anco parleremo della cancrena, che può avvenire alle

ferite avvelenate.

La cancrena prodotta da putrefazione è di tre spezie. 246. La cancrena prodotta da putrefazione come da caufa antecedente, fi può, fecondo lo Reflo QUESNAY (a) ridurre a tre spezie. La prima

<sup>(</sup>a) Lib. cit. chap. xx. pag. mihi 308.

prima dipende dalla dissoluzione putrida della massa degli umori, la quale si scorge in alcune cacochimie biliofe, o. fcorbutiche, in alcune febbri maligne con esantemi ec. Questa cancrena fopravviene con poco, o nessun dolore; pare piuttosto esservi un enfisema di color rosso vermiglio, e a certa distanza dilavato, simile a quello delle infiammazioni erifipelatofe (158): l'infiammazione appoco appoco si fa più intensa, poi la parte diventa sempreppiù stupida, cinericcia, e livida, fi screpola, e n'esce un umore tenue, rossigno, giallognolo, affatto putrido. La generale dissoluzione putrida degli umori. fecondo le offervazioni del celebre LA-PEYRONIE (a), è ad un tale eccesso in questa spezie di cancrena, che sovente, facendosi scarificazioni, o altri tagli alla parte, succedono emorragie, le quali non possono arrestarsi, se non difficilmente, fe pure si arrestano, il sangue non zampilla dalle arterie, ma continuamente gocciola, e inzuppa l'apparecchio, nè può rappigliarfi, e fare grumi. In fatti le stesse emorragie dal naso. dall' utero, dall' emorroidi, dalle gengive, le quali fogliono succedere alle affezioni scorbutiche, o cancerose in sommo grado, quasi sempre fono mortali.

247. La seconda speție di putrefațione, che non di rado produce la cancena, ê la suppurațione putrida, cioè quando negli ulecri viru-linti, e cachoetici la materia putrida icorosa s'infeltra, e s'a trefta nella spuponită delle carni; per la qual cosa, facendosi pel soggiorno sempre più putrida, estingue infine colla sua forza fertica l'azione della parte. In simile caso l'inzup-

Prima fiezie. Dissolution putrida generale degli umori.

Segni di questa prima spezie.

Seconda fpezie, fup-

pa-

<sup>(</sup>a) Apprefio il Quesnav nel luogo poc'anzi ci-

Segni di questa spezie di canerena ; pamento fi fa maggiore, l'ulere fi dilata, e fi profonda per poi diventare affatto carcenofo, le parti membranofe, e cellulofe fi diffaccano a lembi, lafciando non di rado i mufcoli, e i tendini nudi; quelli per la irritazione divengono tumidi, e quasi canfifamatici, e quasi fi defquamano, la parte all'intorno, e per lungo tratto fi fa edematofa, iflupidifice con freddo marmoreo, e finalmente perde il moto, e il fenfo.

Terza spezie, congestioni putride.

248. La terza spezie dipende dalle congestioni patride, le quali si possono fare in alcuni tumori, come ne' cancrenofi, e ghiandolofi maligni, ove l' umore, divenuto sommamente acre, e settico, ha potuto diftruggere gli organi della vita di quella parte. In fatti si sono vedute mammelle cancerose separarsi o intere, o a frammenti, corrose, e cancrenate per la forza settica di tale umore. Si possono aggiungere a questa spezie di putrefazione quelle, che dipendono da umori travalati, i quali spontaneamente si putrefanno, e putrefatti estinguono la forza organica delle parti, che occupano, il che succede alle grandi ecchimofi, alli travasamenti di sangue, di latte, di bile, di materie fecali, di orina in alcune cavità; concioffiachè gli umori facilmente diventano viziosi, si putrefanno, e si scompongono', se non si muovono.

Pronostico della prima spezie. 249. Quando la cancena dipende dalla universale puerida dissoluzione degli umori (246), ella è quasi sempre mortale, e coll'amputatione del membro, se anco fosse possibile, i malati più presimente muojono; l'arte medica non avendo sinora trovato alcua antisettico così esticace da poter ricomporre gli elementi del fangue. E perchè le scarificazioni alla parte sarebero pericolose, preparandosi con esse un maggiore spazio al progressi della cancena (243).

Cura .

dovendosi anche temere quelle emorragie, che abbiamo sopraccennate (246), si dovrà piuttoste sperare ne' rimedi interni alessifarmaci, ed antifeuici, che abbiamo già più volte lodati (240), e negli antiscorbutici i più efficaci, quando la dissoluzione fosse scorbutica, nel qual caso gli spiriti ardenti antiscorbutici, come quelli di co. clearia, e di beccabonga, serviranno ad inzuppare l'escare cancrenose, applicandovi poi alcuno di que' cataplasmi aromatici, che abbiamo dapprincipio proposti (249); imperciocche la putrefazione cancrenofa, fattasi una volta ch'essa è in una parte, effa è fificamente sempre la steffa. da qualunque cagione fia prodotta. E' stato ofservato, che le cancrene dipendenti da causa scorbutica, non di rado accadono coll'alleviamento della maggior parte degli altri fintomi dello scorbuto, come se fossero critiche, quantunque esse divengano poi mortali pel loro progresso, il quale non si può impedire, cancrenandosi le parti a proporzione della flussione, che ad esse si fa dell' umore settico .

Le cancrent fcorbutiche fono qualche volta critiche, benche mortali.

250. Se dalla suppurazione putrida, quale l' abbiamo spiegata (247., 248.), è stata prodotta la cancrena, anche difficilissimamente si arresta, se co' vulnerarj, e cogli antisettici non si giunge a correggerne il principio, che per lo più è già fatto universalé per l'assorbimento nella massa di quel putrido umore stagnante. Gli Autori dicono, che in questo caso bisogna non solamente recidere, e separare le carni cancrenate, ma anco quelle, le quali sono ulcerose, e ritengono nella loro spugnosità i liquori putridi, i quali coll'accumularfi sempre più imputridiscono. Si difenderanno le prossime carni ancor vive co' topici antiputridi, e co' balfami più efficaci, tra' quali hanno maggiori lodi l' olio di trementina, o la dissoluzione di pece liquida fatta nella decozione d'affenzio, d'oriPronofico della feconda, e terza fpezie.

Cura :

Mediante la feparazione dell' escare.

Cogli antifertici balfamici; e aromatici gano, di ruta, di pulegio, e fimili, in cui s' inzuppino filaccica, o compreffe. Sanno gli Anatomici, che con questi liquori si conservano persino le parti de' cadaveri.

Cogli antifettici falini.

Cogli efea-

251. Se con tali rimedj (250) la cancrena non fi arresta, altri propongono gli antisettici falini, come il falmarino, il nitro, o il fale ammoniaco, co' quali abbondantemente s'asperga la parte cancrenata, ed infine ricorrone agli escarotici , quali sono gli spiriti di sale , di nitro, di vetriuolo, e di zolfo, l'acqua fagedenica, il butiro d'antimonio, i mercuriali corrosivi, e simili. « Ma mi pare ( dice il sopralodato » QUESNAY (a)), che in questo caso gli esca-» rotici debbano essere preferiti; imperciocchè » essi non solamente sono specificamente propri » contro la putrefazione, ma lasciano un'escara, » che copre le parti vive, finocchè effa fi fepari con una lodevole suppurazione, e ci avvertifce, che, fe, invece di una suppurazione purulenta, non vi gocciolasse se non una materia saniosa, egli è segno, che gli escarotici non hanno penetrato tutte le carni cattive, e putride, perlaqualcofa fia necessario di ripeterne l'applicazione, finchè giungano a quelle carni, le quali sole possono dare quella lodevole suppurazione. Ma nota nello stesso tempo, che i corrosivi, rodendo, e distaccando le carni morte, scoprono le vive, le quali sono abbeverate da cattivi fughi, e l'espongono alla impressione dell' aria, prima che fia stabilita la suppurazione, donde la mortificazione si avanza, e sa progreffi, foggiungendo, effer offervazione frequente, che nelle cancrene dipendenti da vizio d' umore quanto più fi fcoprono le carni vive

Riflessioni
contraddittorie del
QUESNAY
circa l'uso
degli escarotici, e corrosivi.

<sup>(</sup>a) Traité de la gangrene chap, XXI. pag. mihi 316.

fanto più fe ne facilita la dilatazione, perlaqualco(a, dic' egli, « gli Antichi ulavano il fuoco » o l' olio bollente per cauterizzare le ulcere » cancrenose ».

252. Dobbiam maravigliarci, che l' Autore stesso faccia questa giustissima riflessione, dopo aver poco prima proposti gli escarotici, i quali agiscono nel modo stesso, che i corrosivi. Eppure, malgrado quel pericolo di esporre col loro uso le carni vive al contatto dell'aria, e alla più pronta mortificazione (251), l'uso degli escarotici è pressocchè universale, su quel principio, che fi debba tostamente separare il corrotto, acciocchè non si guasti il sano. Ella è cosa certa, ed indubitata, che, se la cancrena è stata prodotta da cagione esterna, sarà più prestamente terminata coll'uso delle scarificazioni, e degli escarotici; ma qual profitto se ne può sperare, quando essa cancrena dipenda dalla tabe senile, da mancanza di nutrimento, da affezione scorbutica, areritica, venerea, o da qualunque altra cacochimia, primacchè essa sia stata corretta, perchè si possa credere anco terminata la cagione della cancrena? La ragione, e la sperienza ci dimostrano, che, quando in una parte si è fatta la cancrena, tosto si limita, e fi circoscrive, se gli umori abbiano riacquistato la loro balfamica natura, e i folidi la loro forza. Si fono vedute gambe, e braccia separarsi intiere dal tronco, lasciando un' ulcera schietta e pura, allorchè era cessata la cagione della cancrena; quello è il tempo, in cui conviene feparare le putride, e morte carni, o amputare il membro, la cui struttura organica fosse irreparabilmente distrutta, nè la vita del tutto si potesse altrimenti conservare. Non si può negare, che l'umore virulento debba irritare le fibre contigue delle parti vive; ma farà forse

Argomenti contro l'abuío degli efcarocici nelle cancrene prodotte da caufa interna,

minore l'irritamento, che produrranno que'rimedi ftimolanti, acidi, acri, e corrofivi? Si
dovrà forfe temere l'afforbimento dell'umore
fettico, fe tutta la maffa degli umori è anco
esfa putrida? Bisogna, che questa cessi, altrimenti il progresso della cancrana, e la morte
potranno alcune volte esfere creduti gli effetti
delle intempessive fearificazioni, o amputazioni,
o de'corrossivi, e caussicii.

Altri ricavati dai Commenti dello Swiz-TEN agli aforijmi del BOLRAA-

253. Egli è dunque certissimo, che la separazione delle fostanze morte, nella maggior parte delle cancrene critiche, dee farsi dalla natura (252): « homini quinquagenario ( racconta lo » SWIETEN (a)) in febre acuta continua unhus " noctis spatio siderabatur extrema pars pedis, » & postea decidebat, homine tamen superstite » manente. Simul ac enim morbi malignitas » hanc partem occupaverat, ceffabat febris, & » redibat reliquo corpori fanitas». Ma perchè fiate maggiormente convinti del pericolo, che vi può effere di scarificare, amputare, e cauterizzare le parti, prima, che la cancrena sia limitata, e terminata, fiami permeffo di rapportarvi il ragionamento dello stesso SWIETEN: nè ci parrà d'aver perduto il tempo nell'accumular ragioni contro una tal pratica, la quale è divenuta troppo comune : « sempre si osserva » (dice egli (b)), quando le forze vitali fono " valide, che in quel luogo, dove la crofta » cancrenosa tocca le parti vive, vi nasce un » rossore, ed infiammazione, perchè gli umori » portati dai vasi vivi sono obbligati di arre-» ftarfi in quel confine del vivo, e del morto,

non

<sup>(</sup>a) Commentar. in BOERHAAVE aphorismos de cognoscendis, et curandis morbis aphor. 253. tom. 1. pag. 412., &t. 749.

<sup>(</sup>b) Pag. 788. di detto primo Tomo.

non potendo altrimenti paffare per la crosta » cancrenosa: nè quella infiammazione può fa-» cilmente risolversi, perchè non si possono » differrare le estremità di que' vasi ostrutti : » conseguentemente essa pure dovrà o cancre-» narsi. o suppurare. L' arte dunque dee piut-» tosto proccurarne la suppurazione: epperciò » le forze vitali deono regolarfi in tal modo. » che fiano maggiori, che nello stato sano. » ma non eccessive: gli umori si dovranno » attemperare, e cogli antifettici correggere la » loro putrefazione. Allora per la continua » impulsione de liquori, i quali scorreranno pei » vasi vivi sino al luogo cancrenoso, appoco » appoco si sciorranno i lati de' vasi, e si se-» parerà la parte viva dalla morta, forgendo » da quella la fuppurazione, ed è allora, che. " non effendo la parte cancrenofa, e morta più , irrigata dai liquori vitali, ed effendofi la loro ,, parte più fottile svaporata pel calore dell'aria. ", e delle parti vicine vive (le quali anco per , la loro contrattilità fe ne possono separare ). " fi farà una rima, o un folco, per cui la , parte cancrenata farà- perfettamente divifa dalla " viva, nè vi sarà più pericolo, che la cancrena " faccia progresso. In fine ammollita, e sciolta , l'escara per la suppurazione, si potrà sepa-, rare fenza violenza, o fare l'intera amputa-. " zione del membro, se fosse necessaria, ed , inevitabile: qui plus hic fapere voluerunt , ( fegue lo stelfo Autore ), putantes, quod " fecando, urendo, corrodendo possent ci-, tius perficere hanc separationem mortui gangrænofi a vivis partibus, erraverunt certe; , omnibus enim his modis vel relinquitur pars mortui, vel una cum mortuis destruuntur

", viva vicina". Il LA-MOTTE (a) proccurò di flabilire quessa dottrina con osservazioni convincentissime; vedete tra le altre la osservazione 198., e le quattro seguenti, ove condanna fortissimamente quella cattiva pratica, che gli era stata insegnata a Parigi, di voler separare con troppi solleciti tagli le parti cancrenate, primachè la cancrena sia terminata.

A che poffano fervire le leggiere fearificatio-

Sembra, che gli stessi antifettici sion troppo convengano, e perchè.

254. E' però vero, che alcune volte le sca+ rificazioni sulle parti morte fatte con cautela, e fenza offendere le vive, possono giovare, per dar uscita ai cattivi umori, che vi si trattengono (243), o per far più facilmente infinuare i rimedj antisettici, se pure da questi si può fperare alcun vantaggio, effendo anch' effi da alcuni Autori fortemente riprovati come diffeccanti in questi casi, ne' quali, come si è detto (252), si dee aspettare la separazione del cancrenoso da una suppurazione veramente purulenta, la quale con tali rimedi potrebbe forse essere ritardata, o impedita. Antonio BENEVOLI nella offervazione XVI. intitolata di diverse cancrene in una coscia da esso con facilità separate (b), lasciò scritto come segue: " comechè a torre la siccità, ed , a temperare l'adustione, e l'acrimonia (c) cosa ,, non

(a) Traité complet des opérations de Chirurgie tom. 111.

pag, 135. 6 fuiv.

(b) Pag, 141. della fua eccellente, ma ormai divenuta troppo rara Opera, che ha per titolo: Differazioni fovra l'origine dell' entia intellinale, intornalla più frequente cagione dell' lifeuria, e fopra il leucoma, agguntevi quaranta offervazioni, re delle quali fulla rachitide, e le altre in divegfi cafi di Chirurgia. In Fischitide, e le altre in divegfi cafi di Chirurgia. In Fischitide, e le altre in divegfi cafi di Chirurgia.

renze 1747. in 4.

(c) Ciò fi riferifice alla natura delle cancrene, che fanno il foggetto di quella offervaçone. Le Compario vero ( avea detto poc'anzi) nella parte interna della coficia deftra alcune macchie livide della larse

. remain Linux

, non vi è più efficace dell'acqua tiepida, di " essa, ad esclusione di ogni altra fomenta, io " mi prevalfi. Anzi, per dire il vero, da qual-" che anno in quà comunemente mi servo dell' " istessa, pura, e semplice acqua tiepida nelle , cancrene ancora di altra qualità, ed in molte " forte di piaghe, lavandole copiofamente con ", essa, e ponendovi sopra le fila, e le pezze " in quella bagnate, con esito felicissimo. E " veramente qual altro più efficace rimedio per " le cancrene anche umide dell' acqua comune " tiepida fi trova, per rilaffare la valida ten-" fione, che fi fa ne' vafi, acciò fi accrefca , la circolazione de' fluidi, e per isnervare l' , umor coagulante, cagioni amendue principali , della cancrena? Inoltre per mezzo dell'acqua " meglio fi porta via quella gran putredine, ", che nella parte offesa si genera, la quale " colla fua cadaverica natura vieppiù l' offende. " Certo fi è, che l'acqua tutti questi buoni " effetti produce, e tanto più agevolmente, e " ficuramente li produce, quanto ella è più , pura, e meno mescolata con quelle sostanze, ,, che fon contrarie all'innocente sua qualità ... Sin

Efficacia dell' acqua tiepida in fimili cafi . Offervazione del Be-NEVOLI .

"giorza di un giulio, le quali nel corfo di pochi
"giorai fi manifeltarono vere, benche fuperticiali,
"e cutanete cancrene, e fino in diciotto ne comparvero fenza la minima tumefazione della parre,
mentre folo ne l'uoghi da effe occupati fi rendea
"la cute nera, e dura qual cuojo, o come fe vi
fosfic fiato mefso un qualche caustico. La natura
"di queste cancrene fece supporre l' origin loro alstra non efsere stata, che una maffima adustione,
"o a acrimonia de' liquidi, che inducesse una eccefsiva ficcità nella parre offesa, ed una sinsperable,
"e e valida incresparura dell' estremità de' vasa, che
terminavano nella cute, per cui, ivi rimanendo.
"il fangue immobile, egli la cancrenò, ed alla cangrenna altresi conduse le di lui constitue parti."

Sin qui il BENEVOLI, configliando egli ancora, che per le stesse ragioni si faccia uso d'impiastro di natura simile, cioè di foglie di mativa,
e di viole coll' aggiunta di un po' di farina d'
orze per tiagrae institue d'etbe. In somma pensate, che le parti putride, e cancrenos non si
possiono in alcun modo ristorare, e quando la
cancrena sia giunta al suo termine, non se ne
potrà mai ottenere la separazione con minore
violenza, che quando seno state ammolliste
dalla siuppurazione purulenta delle parti vive; e
con questa ristessimo non vi parrà tanto stravagante il consiglio del BENEVOLI, il quale
ne suoi tempi faceva l'onore, e la gloria della
Chirurgia di Toscana (a).

In quali cafi fi debba
abbandonare la feparazione
dell' efcara
alla fappuratione, e in
quali debbafi proccurare coll'
arte.

255. Stabilita che fiafi la suppurazione, fi dee badare a quelle parti, fulle quali l'escara è posta; imperciocchè se copre parti magre, le materit purulente sono il più sicuro strumento, acciocchè l'escara si separi senza accidenti, come abbiamo fin quì infinuato; ma fe coprisse parti pingui, ed umide, quelle materie possono raccoglierfi, ed infinuarfi ne' luoghi circonvicini con grave guastamento. Si sono vedute cancrene al perineo, le quali neglette hanno prodotti feni purulenti, che difficilmente fi poterono riempiere (b); per la qual cosa in simili cafi fi dee con molti tagli dividere l'escara, e tostamente distaccare quelle parti, le quali già fossero state sciolte dalla suppurazione, senza però offendere le parti vive.

256.

(b) Vedafi l' Offervazione xv. dello stesso Bene;

<sup>(</sup>a) Questo valente Cerusico; nato l'anno 1655, in un Castello del Ducato di Spoleto, efercitò con molto applaulo la fina professione a Firenze, dove è morto l'anno 1756.

256. Quando la cancrena occupasse le natiche, ci avvertisce il QUESNAY (a) di non fare le scarificazioni, infino a tanto che la suppurazione cominci a farfi vedere alla circonfe- ne, che fi renza dell' escara, massime nelle grandi malattie, quando i malati debbono giacere fupini; conciofiachè l'escara è allora necessaria per difendere quelle carni vive, che copre : bisogna piuttosto lasciarla intera, acciocche rimanga più uguale, anzi farebbe medefimamente necessario di ritardarne la separazione, e d'impedirne la putrefazione coll'olio di trementina, o colla tintura di aloe, e di mirra, principalmente se il malato perdesse involontariamente le fecce. avvertendo però, che non diventaffe troppo dura, onde potesse comprimere, ed offendere le carni vive, che vi fono fotto; e se vi fosse questo pericolo, si dovrebbe applicare l' unguento di stirace. Quando la natura promuovesse il distaccamento dell'escare, e già il malato fosse in migliore stato, si dovranno allora usare gli unguenti, che potessero maggiormente ammollire, come il balfamo dell' Arceo, l'unguento basilicone, e gli empiastri ammollitivi, coll'attenzione di tagliare le carni morte, quando dalla suppurazione fossero state maggiormente ammollite, e in gran parte distaccate, avvertendo però fempre di non iscoprire le

Regole concerneati la cura delle cancrefanno alle natiche per decubito .

257. Separata l'escara, non di rado vi rimane una fordida, e viscida sostanza cellulosa, la quale copre, e lascia appena travedere le carni vive: convengono allora i digeflivi animati, ai quali anco fi può aggiungere qualche blando cateretico, perchè più prestamente si after-

Cura efterna, ed interna delle cancrene umide, caduta che n'è 'l' escara .

<sup>(</sup>a) Lib. cit. partie 11. chap, 2. pag. mihi 396.

asterga. E perchè in simile caso la patte è molle, e quasi sempre edematosa, si debbono usare cataplasmi risilventi, e corroboranti, come quello delle quattro farine con polveri delle piante aromatiche, le quali abbiamo da principio proposte (239), altrimenti ne potrebbe succedere una suppurazione colliquativa, a cui dovesse anco fuccombere il malato. Si prescriveranno dunque decozioni vulnerarie, ed opiate antisettiche, alle quali si può aggiungere la polvere di corteccia Peruviana, che in questo caso principalmente giova, non essendo altrimenti tanto vero, che efficacemente impedisca i progressi della cancrena, quando questa non è ancora terminata. Giova anche di mescolarne co' digestivi, e fare bagnature della infusione della medesima nel vino bianco generoso. A dir vero però molto più utile fu provato, fecondo le offervazioni del celebre RAMBY (a), l' elixir di vetriuolo, bevendone gocce a grata acidità nell' acqua semplice, o in quella di tutto cedro, di menta semplice, di foglie d' aranci, nella decozione d'agrimonia, o d'iperico ec. Quando principii, o fi abbia da temere quella dissoluzione putrida, che suole succedere ad alcune cancrene, altri Iodano, come efficace rimedio antisettico, la dissoluzione di pece liquida fatta nell'acqua, o in una decozione vulneraria, usata internamente, ed esternamente, come già abbiamo accennato (250).

Segni della cancrena per congelazione. 258. Quando la cancrena è prodotta dal freddo, le parti cominciano a impallidire, poi diventano rosse con dolore pungente accompa-

<sup>(</sup>a) Nel suo Trattato delle ferite fatte da arme da succe, stampato per la prima volta in Inglese a Londra l'anno 1744 in 8., poi a Parigi 1760. in 8. tradotto in francese dal Desmonss,

gnato da molessissimo prurito: cresce poi il rossore, e si fa purpureo, quindi la parte diventa cinericcia, di color di piombo, e sinalmente nera, e ssacelata sino alle ossa, sicchè sovente si può con molta facilità dissacare. Sono soggette a questa speție di cancrena principalmente le parti estreme del corpo, cioè le dita delle mani, e de piedi, la punta del naso, i lobi degli orecchi, e qualche volta medesimanente la testa del pene.

Quali parti più vi fiano foggette.

» 250. Il calore del nostro corpo in istato di » fanità, persino nella state fervida ( offerva » il più volte lodato SWIETEN (a) ) è mag-» giore del calore dell'aere ambiente, ficche " debba effere acerrimo il freddo, per poterne " irrigidire col gelo le parti; e ficcome, tutt' » altre cose uguali, il calore è naturalmente » minore nelle estreme parti del corpo, per » chè la celerità del fangue è minore nelle » parti più distanti dal cuore, e in quelle, do-". ve i vafi fono più minuti, e tenui, quindi » si capisce, perchè gli effetti del gelo si fac-» ciano principalmente in quelle estreme parti » che abbiamo nominate (258); e come il ge-" lo converte in rigide punte, e in foda maffa " l'acqua, può parimenti irrigidire, ed affo-" dare i nostri umori, che abbondano d'acqua, » donde ne verrà la loro perfetta stast, cioè " la cancrena, nella quale però da principio » non vi farà la menoma diffoluzione putrida » ma folamente l'inerzia delle parti organiche. » E conciossiachè allora le punte degli umori » congelati fieno fisse in minimi, e delicatissi-» mi vafi, i quali sono anche dal gelo stesso

Offervazioni fifiche dello Swie-TEN circa il modo, con cui i noftri umori fi congelano, e circa l'effetto del caldo, e del freddo nelle cancrene per congelas tione,

<sup>(</sup>a) Commentat. in BOERHAAVE aphorism. tom. 1. aphor. 454. pag. 798.

BERTRANDI TUM. TOM. 1. M

» dilatati ( perchè i liquori non fi congelano » fe non acquistando maggior volume ), facil-» mente si concepirà, che, se vengono messi » in movimento coll'applicazione di un fubi-» taneo calore, debbano col loro spartimento » rompere , lacerare , e distruggere i vafi , ne' » quali fono contenuti, come appunto fi fciol-» gono, e si stemprano i frutti gelati, se s'im-» mergono nell' acqua calda, dappoiche quan-» do fiano in parte sciolte quelle punte conge-" late, e già si muovano, quelle, che non » faranno ancora state sciolte, saranno necessa-» riamente applicate, e spinte contro le pareti » de' vafi, nelle quali s' impianteranno, pun-» gendole, e lacerandole: e siccome l'impeto » del liquore, che è spinto in avanti dalla » forza delle parti vive, accresca sempre più " l' urto, e l'impulso di quelle punte rigide, » ed acute contro gli ostacoli, questi dovran-» no romperfi, e confeguentemente distrugger-» fi la loro struttura organica di maniera, che » non vi potrà poi effere altro rimedio, fe » non se di proccurare la separazione delle parti » morte. Forse anco ciò succede ( nota lo » stesso Swieten ) perchè le particelle saline » de' nostri umori sciolte, e separate per la » congelazione, come si separano dall' acqua, » e si precipitano, allorche si congela prima, » che fiano ben rimescolate, pungano, e la-" cerino d'ogn' intorno. " Sia adunque, che l'acqua freddiffima stringa a poco a poco i canali, che furono ecceffivamente dilatati per la congelazione degli umori, e che accrescendone la forza colla sua fisica azione, proccuri il discioglimento degli umori, o spinga suori, come alcuni pretendono, quelle particelle, che . hanno potuto produrne la congelazione, come pare dimostrato dalla osservazione dell'ILDANO,

the qui fotto rapporteremo (260), egli è certo, che l'acqua freddiffima, e le fregagioni colla neve, o col ghiaccio furono provate come ficuri rimedi.

.. 260. Se s'immergano nell'acqua freddiffima ( scrive l' ILDANO nel suo Trattato della . cancrena cap. XIII. ) mele, o rape gelate, , vedraffi l'umor gelato, il quale conteneva-., no, effere quasi cacciato fuori, sicchè quelle , frutta ritornano alla loro pristina natura; ma " se s' immergano nell' acqua calda, o tepida. , immantinente trovansi fracide, e poco dopo " diventan nere, e imputridiscono. Ouindi ,, nella Livonia, nella Irlanda, nella Norve-" gia, e negli altri Paefi settentrionali è costu-" me, quando fi ritorna la fera a casa, di non " entrarvi, nè di presentarsi al fuoco, o alla , stufa, se prima non si sono fregate le mani . , la punta del naso, e le orecchie colla neve, " anzi quando ritornano di viaggio, ed hanno , intirizzite, o gelate le mani, o i piedi, non , fi fanno pena, tosto che sono entrati in una ", casa, d'immergere le parti gelate nell'acqua , fredda, o nella neve, come per riscaldarle. Narravit mihi ( segue l' istesso ILDANO ) vir quidam nobilis, & fide dignus, fe, quum eas regiones peragraret, incidisse aliquando in viatorem secundum vium frigore rigidum, ac pene mortuum, quem plaustro suo impositum, quum deduxisset in diversorium, hospes illico demersit in frigidam: quo facto, undequaque ita erupit gelu , ut ipfius corpus ceu ferreo thorace conte- . dum conspiceretur. Tum quoque propinatum illi ajebat cyathum ampliorem hydromellitis, quo illi ceu potu ordinario utuntur, addito pulvere cinnamomi, caryophillorum, & macis, unde sudor in lecto provocatus est, atque ita agrum ad se rediisse, amissis dumtaxat manuum, & pe-

M 2

Narrazione dell' ILDA-No circa il coftume de' Popoli Settentrionali per, guarrale canserne prodotte dal gelo. dum extremis articulis. E chi di noi ancora non ha veduto tra la nostra gente, che le mani intirizzite, e torpide pel freddo si riscaldano, fregandole col ghiaccio, o colla neve, o immergendole nell'acqua fredda, e che allora possiono sossimi calore del fuoco, il quale prima eccitava dolorossissimo punture?

Quando convengano gli aromatici efternamente, e i cordiali internamen-

se .

261. Quando il malato non fenta più alcun dolore, e la parte cominci a riscaldarsi, si faranno leggieri fregagioni con panni caldi, poi fomentazioni con decozione di piante aromatiche, come di rammerino, di lavendula, di bacche di lauro, e fimili. Alcuni propongono quale specifico il decotto di rape. Starà il malato ben coperto in letto, e gli fi daranno bevande rifcaldanti sudorifiche, come vino generoso, in cui abbiano bollito alcuni garofani, cannella, o macis, o una dissoluzione di triaca, o di mitridato nell' acqua di cardo fanto, o di fambuco. Sopra le parti gelate, onde mantenervi un calore moderato, si potranno mettere gl' intestini, i visceri, o la pelle di qualche animale ammazzato di fresco, colombi, o polli spaccati vivi, o, ciocchè è più comodo, vesciche piene dell'accennata decozione, o della feguente lodata dal BARBETTE (a):

Rl. Scord., vincetoxic., rut. a manip. j., femin. nasturt., urtic. a drach. iij., coque in s. q. vini albi generosi, et pro qualibet libra adde unc. j. spirit. vini.

Gio-

<sup>(</sup>a) Nella fua Chirurgia pubblicata, e accrefcinta dal MANGETI con questo titolo: La pratique de Chirurgie enrichie, se augmentée de pluseurs remarques, se hisbires. Lyon 1693, in 12. 3. vol.

Giovano anco allora le unzioni con olio de' Filosofi, di cera, di trementina, di semi d'or-

tica, e di nasturzio.

262. I proposti rimedj convengono, quando pel freddo è solamente stata, per così dire, sospesa l'azione organica delle parti agghiadate dal gelicidio; che se poi molta su l'intensità del freddo, distrutta la loro sostanza organica, sostocate si ssucciano, indi si separano per la dissoluzione putrida, che sinalmente vi accade, ed allora giovano gli antistatici, e i corrobazini anco esterni, avendo prima fatte le sarissicazioni sulle parti veramente ssucciate, e morte, L'ILDANO (a) loda la seguente sometazione:

Quando le fearificazioni, e gli antifettici efterni, ed interni

R. Folior. laur., melifs., rorifmarin., rut., origan., fsord., 4b/ynth. a manip. fs., radic. vincetoxic., angelic. a unc. ij., coq. in vin. alb. generof. lib. vj. ad confumtionem quarta partis.

Si useranno i digestivi più forti, ed animati; aggiungendovi qualche cateretico secondo la maggiore, o minore putrefazione.

263. Quando il freddo succede ad un gran calore, la cancrona fi fa preftissimamente. Racconta il LAMOTTE Tomo 111. pag. 384. d'un uomo, che nel mese di Luglio essendo discesio in un pozzo, per purgarlo, senti tostamente un gran freddo, e nello stesso tempo un atrocissimo dolore al maggior dito del piede sinistro, il quale in breve tempo si propagò sino ai malleoli, e in un'ora l'articolo si trovò sfacelato sin oltre la sura, onde su necessaria

La con forma prefiezza, quando il freddo fuccede brufcamente al caldo,

<sup>(</sup>a) Nel luogo citato.

faria l' amputatione della gamba (a). A una fanciulla nel mese della canicola, per avere immerse le mani nell'acqua fredda nel tempo, ch'ella aveva un'ardente sebbre, si cancennarono sino al luogo, dov' erano state immerse, tutte, e due le mani, e dovette perdere alcune dita. Vedete l'ILDANO nel suo Trattate della cancenac acap. IF.

## Della Cancrena secca .

# C. IL

Segni, cagioni, e modi diversi di procedere delle cancrene fecche,

264. La cancrena secca è quella, che si fa, come abbiamo già detto (233), senza precedente, o attuale tumefazione della parte, anzi è accompagnata da una certa aridità, per cui essa difficilmente passa in una dissoluzione putrida (b). La parte comincia a diventar fredda, perchè diminuisce il movimento delle arterie, le quali prima si sono rinserrate: le carni poi restano morte senza senso, e senza nutrimento, e appena mortificate diventano più ferme, e più refistenti ai tagli, che le carni vive, in una parola secche, e coriacee, quasi sempre però fono morte, prima che si secchino. Si sono qualche volta tagliati membri anco superiormente al luogo, che per la ficcità vedevast can-

<sup>(</sup>a) Ma con tutto ciò non fi potè falvare la vita all'ammalato, perchè, come afsai bene riflette il l'QUESNAY (Traité de la gangrene partie I. chap. xix. pag. mibi 197.) l'amputaçione è fiata fatta intempetitivamente.

<sup>(</sup>b) L'aridità, che è il carattere distintivo di questo genere di cancerna, l'ha fatta da alcuni chiamaver aridura. Il SAUVAGES (Nosolog, method. tom, Ile pag, mihi 62).) la chiama necroste,

cancrenato, fenza che i malati abbiano fentito alcun dolore; le carni non erano putrefatte, ma un di presso simili a quelle di un uomo recentemente morto, e non escirono, se non poche gocce di fangue nericcio. Secondo la cagione, che produce la cancrena, i malati fentono alcune volte alla parte, che si dee cancrenare, un calore urente, e ciò accade, quando la cancrena è prodotta da un umore caustico, e corrosivo; nulladimeno però, se si tocca la parte, in cui dicono fentire quel calore, essa trovasi già fredda. Altre volte provano un freddo dolorofissimo per la mordacità dell' umor setsico, il quale instantaneamente produce la cancrena, ed altre di queste cancrene si fanno a poco a poco, fenza dare alcun fentimento. principalmente quelle, che procedono da infufficienza di nutrimento, e per la debolezza delle forze vitali, come nella tabe senile, o per la debol forza organica di alcun ramo principale de' vafi fanguigni, che a poco a poco cresca per l'aumento di qualche tumore, da cui venga compresso, o perchè le sue tuniche diventino offee, o altrimenti fi ferrino. Racconta il BOERAAVE di un giovane, a cui essendo stata tagliata l'arteria ascellare, il braccio di-' venne fecco, ed arido, fimile a quello di una mummia d' Egitto.

26s. Egli é rato, che in queste cantente preceda l'infammațione, come non vi precede il
tumore (264), o se pure qualche leggiere infiammațione precede, ella è di pochissima profondità, ed erespleatació con pochissimo tumore,
poco dura, e passa così presto in cantena, che
non v'è da sperare quella suppurazione purulenta, che sola può terminare la cantena, onde questa piuttos si spanda, e si dilata:

M4

y. Tale

Che fortà d'infiammazione preceda a queste cancrene, e in quali circostanze, " Tale spezie d'insammazione ( dice il QUES-" MAY (2) ) può paragonarsi a quella, che è " eccitata dall' applicazione di una pietra cau-" stica, la quale niente assatto corrisponde alla " violenza, con cui esse sissimi en essare can-" crenosa le altre parti, che abbrucia; " e anco questa leggiere insammazione accade sonmente, quando la cancerna è prodotta da vizio degli umori, e non quando dipende da qual-

Segni caratteriflici delle cancrene prodotte da difetto d'ori gano, e di quelle, che dipendono da vizio degli umori. che difetto organico. 266. Quando la cancrena secca dipendente da qualche difetto organico va facendo progreffo, i malati niente altro fentono alla parte, che un freddo, una gravezza, e stupidità, l'estensione della quale mostra l'estensione della cancrena stessa. Ma quando essa sia prodotta da vizio d'umori, il suo progresso meglio ancora fi conosce da alcuni cerchi rosti, i quali si dilatano, e si spandono, e le parti per lo più diventano livide, e nericce, mentre che nelle cancrene prodotte per vizio d' organo quasi sempre rimangono pallide, e cinericce. Quelle alcune volte si fanno con una stupenda prestezza. Il TULPIO tacconta (b) di una donna di fettant' anni, a cui in una notte per una febbre ardente si fece nero, ed arido tutto un braccio, come se fosse stato per molti mesi seccato al fole. Lo SCHENCHIO (c) parla di una can-

(a) Traité de la gangrene partie seçonde chap. I. pag.

<sup>(</sup>b) Obfevast. medicar. lib. 111. cap. 48.
(c) Molti efsende gli Scrittori di quetto nome, fi parla qui di Gioanni SCHENCHIO Dottor Medico sato a Fribourgi l'anno 1371., e morto nel 1984. I ofservazione qui accennata trovafi nell'ampia fua Raccolta do sfervazioni intioltata: Obfervationiu medicarum, raratum, novarum, admirabilium, 6 modipuo, farum volumen, Francof. 1600. 10m. 11. in 8.

cancrena . la quale rapidissimamente si propagò : avea cominciato da un dito del piede, ed in tre ore era pervenuta fino al ventre. Tali cancrene sono sovente accompagnate da un gran puzzore, e la dissoluzione putrida tosto, o tardi non manca di accadere. Che allo 'ncontrario le altre, le quali per difetto d'organo, o di nutrimento accadono, fi fanno alcune volte con una lentezza altrettanto stupenda, quanto la prestezza di quelle. Il CAMERARIO narra (a) di una cancrena, che durò un anno prima di giungere dalle dita del piede fino al ginocchio; ed io ne vidi una, che durò diciassette mesi per giungere dal piede al ventre, ed un'altra, che durò con progressi lentissimi ben per due anni. 267. Di rado si elevano vescichette nella cancrena secca, ed essa sarà già divenuta profonda, e si sarà molto dilatata, quando poi se ne veggono forgere alcune. Accade però qualche volta, che tutta l'epidermide si distacchi dalla cute senza formar vescichette, nè la pelle cangia sì tostamente di colore, la qual cosa principalmente si offerva in quelle cancrene. che sono prodotte da stupefazione, e da paralifia .

Di rado si fanno statene nelle canerene steche.

268. Dalle cagioni fovraccennate (266) producenti le cancene secche apparifice, ch' effe possione offere primitive, o esseriali, oppure consecutive a qualche altra malattia: quelle dipendono da una causa immedina monificante, queste vengono conseguentemente all'apparato, ed al progresso di una qualche malattia, e possiono effere critiche, o fintomatiche, secondo la

Loro distinzione in primitive, e in consecutive.

ag-

<sup>(</sup>a) Nelle Esemeridi de' Curiosi della Natura Centur, VI. osservazione 82,

Bellissima descrizione di siffatte cancrene fatta da Antonio Beni-VIENI, maggiore, o minore perversione degli umori, e più, o men gravi secondo la loro estensione, e secondo la parte, che occupano. Il costume, che hanno tali cancrene di fare progressi, quantunque i migliori rimedi si adoperino, è stato descritto da Antonio BENIVIENI Fiorentino, che visse nel xv. secolo (a): Qui ulcere nigro ( lasciò egli scritto nel libro de abditis morborum caussis offervazione LXXI. ) quod gangrænam Graeci appellant, afficiuntur, fi id a digito pedis incaperit, & patiens fuerit senex, vel ex his . quorum corpus mali habitus fit , celerius moriuntur. Incipit enim caro ipfa in ulcere paullatim nigrescere, & livens fieri, quin & arida interim , atque sicca , & cutis circumjacens nigris impletur pustulis: eum & quæ proxima est, amisso sensu, livet, palletque, nec prius ferpere id malum desinit, donec offa etiam inficiae: quod se quidquid aridum est, & proximum quoque locum vel ufque ad fanum prorsus excideris, revertitur tamen, & serpit.

Cancrena feeca prodotta dalla fegala infettadello fperone, 269. Una cagione fingolare della cancrena fecca è il pane fatto colla segala infetta dello sperone, le cui spighe vengono più tumide, e più allungate delle sane (b). Questa cagione di tal

<sup>(</sup>a) Poco fappiamo della vita di questo dotto Medico: si sa folamente e, ch'egli è morto nel 1501., e che la sua Opera de abditis nennullis, ae mirandis morborum, so fanationum caussis è postuma, pubblicata a firmenze in 4, nel 1507. appresso Filippo Giunti per opera di Gerolamo Brivileni fratello dell' Autore.

<sup>(</sup>b) Questa malattia della figala, che viene pure, ma più di rado, al fionento, e ad altre piante gramine, è chiamata dai Francefi ergot, ou blad contu, e dai Latini clavus, nè bilogna confonderla col carbone detto dai Latini glilago, come fembra aver fatto il SAUVAGES nel luogo qui fopra citato. Le figighe attacate dallo figone allungano i loro grani ul

tal cancrena è stata offervata nel fine del secolo paffato, nel principio di questo, e pochi anni sono nella Fiandra, e nella Normandia (a). Molti villani, dalle miserie forzati a nutrirfi di quel pane, ne morirono. Cominciano i malati a cadere in una grave laffitudine però fenza febbre, o altra agitazione interna, le estremità delle membra diventano stupide senza moto, e senza senso, pallide. e rugose; internamente in quelle parti sentono dolori atroci, i quali crescono maggiormente, fe la parte si espone al calore, ma diminuiscono qualche poco, esponendole al freddo. A que' dolori alcune volte succede una leggiere infiammazione, ed un ardore urente, il quale instantaneamente si cangia in sentimento di un freddo marmoreo: quel dolore, fe comincia dalle dita, si stende quindi al piede, alla gamba ed anco alla cofcia; da quelle della mano all' avan braccio, ed alla spalla, e termina con una cancrena, che annerifce, e fecca le parti fino a separarle dalle vive; sempre però precedono que dolori, e ad alcuni è accaduto, che, levandofi i guanti, o le calzette, vi tro-

Segni di questa can-

una ípezie di corno, fatto da una íoftanza fungofa aísai dura, quafi cartilaginea: fe ne fono veduti de lunghi più di due pollici. All'oppofto il carbone, detto volgarmente gran naro, riduce i granelli in una finifilma polvere nera, quafi fimile a quella delle vefici di luno.

<sup>(</sup>a) Circà la storia di questa malattia vedasi la dottissima Differazione de signori i a Jussitzu P, ADLEF, SAILLANT, & Abbé TESSIRR intitolata: Recherches fur le feu Saint-Antoine, inferita a pag. 360, del primo tomo de la Societé Royale de Mécieine, nella quale dimostrano, che il fueco di S. Antonio, e il fueco paro, di cui parlano le croniche dei bassi secoli, era quetta specia di canerans.

varono dentro alcune dita, le quali fi erane separate senza la menoma sensazione. Mentre che a questo modo si cancrenano le gambe, o le braccia, non fentono altro male, fuorchè una leggierissima febbre nel tempo, che i dolori fono nella loro maggior violenza, e poco sudore stilla dalla fronte, e dalla regione epigastrica, quando i malati prendono qualche alimento caldo, nel rimanente dormono tranquillamente, nè di altro male fi lagnano. E' ftato offervato, che questa cancrena accade negli anni piovofi, quando per la gran pioggia la fegala, o anche il grano fanno spighe con quello sperone (a), dal quale è pervertita la qualità della farina: essa cancrena comincia tostamente dopo la messe, e finisce qualche mese dopo (b), e i poveri villani costretti per l'indigenza

(a) Nella Sologna, e in altre Province della Francia, che fono um'die, e pantanofe, frequenti fono le cancene fecche, perche frequentifima è quella malattia della fegala. Nel 1779. anche in Piemonte si è osservata quella cancrena a Dronero, perchè l'anno su pivosolo, e molta fegala pati quel morbo.

<sup>(</sup>b) La cancrena secca suol manifestarsi principalmente fubito dopo la messe, perchè è stato osservato, che lo sperone perde moltissimo, o anche affatto la fua qualità venefica, quanto più lungo tempo è trafcorfo dalla raccolta della fegala. Gli abitanti della Sologna ne fono così fovente attaccati, prima perchè mangiano generalmente quasi tutto pane di fegala, la quale colà fempre più, o meno patifce lo sperone; poi perchè per la miseria sogliono farne del pane fubito dopo la messe, anzi sovente ne mietono una certa quantità per farfene pane, ancorchè non fia ancor matura. A Dronero accadde, come si è detto, in un anno, che su piovoso, e nel tempo stesso accompagnato da gran carestia de' grani, ficchè i contadini furono costretti, per levarsi la fame, anticipare le messi. Il BRUNNERO nell' Efemeridi de' Curiofi della Natura 1699, dice, cha

no

digenza di profittare della nuova messe sono quelli, che principalmente ne sono offesi.

269. La causticità, o settica natura degli umori, i veleni, l'inerzia delle parti organiche per difetto di organo, o di nutrimento, che fono le cagioni principali della cancrena secca ( 264. 265. ) essendo difficilissime a superarsi, non dobbiamo stupirci, s'ella fa alcune volte stupidiffimi progressi; e per essa molto più servono quegli avvertimenti, che abbiamo dato nel precedente paragrafo, di non essere troppo solleciti a scarificare, ed amputare, prima che la cancrena non fia circoscritta, e terminata, tanto più se fosse critica ( 251., e seg. ) Dissi in quel luogo (249), che alcune volte negli fcorbutici ( e lo stesso accade in altre cacochimie ) coll'apparizione della cancrena scemano gli accidenti universali, nè perciò si debbono meno usare gli specifici interni; imperciocchè quegli accidenti non diminuiscono già, perchè i liquori abbiano cangiata natura, ma perchè evacuandofi possono meno irritare in altre parti, e farvi impeto. Se la cancrena procedesse da virulenza venerea, questa, combattendosi col mercurio, di quella anco s'impedifce il progresso; ma se da altra cacochimia dipende, gli alessiteri, ed i cordiali fono i foli rimedi, che si possa-

Cura generale delle cancrene foc-

il pane caldo, e fresco molto più nuoce, che il freddo, e stantio. Leggasi pure a pag. 417, dello stesso tomo la Disserazione particolare dello stesso hator Essessa sur la matadie du feigle appellie ergot, dove dà un' cfartissima descrizione di questa malaria della segala, e le figure di diverse spiphe, che ne sono arraccare. Etopra tutto leggasti l'altra sua Dissertazione sur le refessa di eigle ergoti inferita a pag. 87, del secondo somo della medessima società.

no usare, non avendo la Medicina altro speci-

Come fe ne possa sedare il dolore. fico . 270. L'atroce dolore, che non di rado precede, o accompagna le cancrene secche ( 264. 269. ) in alcuni fu superato collo stillicidio, o colle fomentazioni di latte tiepido, di brodo di budella, e di trippe, di testa, e di collo di montone, o coll'applicazione de' visceri fumanti di qualche animale, i quali rimedi pare, che debbano principalmente convemre, quando la parte è già arida, e adusta. Nulladimeno però l'ILDANO, il quale in fomiglievoli casi aveva provate utili queste fomentazioni emollienti, ed untuofe, altre volte dovette usare lo spirito di vino canforato, che a questo solo cedeva il dolore (a). Il Muys racconta (b) di avere instantaneamente calmato l'atroce dolore di una cancrena secca, che dalla gamba già si stendeva alla coscia, con una decozione di calamo aromatico, d' enula campana, di dittamo di Creta, di ruta, e di lupini fatta collo spirito di vino. Bisogna alcuna volta ricorrere agli opiati. che altrimenti non si può sedare quell' atrocissimo dolore.

Operazioni, e rimedi da praticarfi, quando la cancrena fiafi limita271. Parlando della cancena umida, abbiamo infegnato, quali debbano effere le operazioni, e i rimedi da praticarfi, quando la cancena fi arrefti, e fi circoferiva ( 252. e fgg.) lo fieffo deefi fare riguardo alla fecca, e fe foffe
ridotta ad uno sfacelo perfetto, e la patte, che
occupa, non fi poteffe amputare, o non fi doveffe pel peffimo flato, in cui fi trova il malato, bifogna proccurare d'indurvi una maggiore

feconde partie liv. 1. chap. 14.

<sup>(</sup>a) Nel più volte citato suo Trattato de gangraena, & sphacelo cap. v.
(b) Appresso il Barbette pratique de la Chirurgie

giore efficcazione, e impedire, quanto fia posfibile. la dissoluzione putrida; che a quel mon do arefatta la parte, potrebbe lungo tempos conservarsi senza nuocere al malato, o almeno finchè se ne possa fare l'amputazione. Il BOE-RAAVE (a) ha veduto un uomo decrepito, a cui si conservò quasi un anno una gamba quantunque cancrenata coll' applicazione di rimedi spiritosi, ed essiccanti. Si dovranno però separare le carni sfacelate, se ciò si potrà fare senza offendere le fane, anzi fenza fcoprirle, ed esporle al contatto dell'aria. Quando dunque la cancrena sarà veramente terminata, s'inzupperà la parte coll'aceto zeppo di falmarino, o con ispirito di vino canforato, e s' inspergeranno polveri di colofonia, di mirra, o d'aloc, o ciò, che più giova, fi ungeranno le refidue carni morte con olio di trementina, o con quello di spico vero, co' quali sogliono gli Anatomici conservare le loro preparazioni. Possono ancor meglio efficcarsi l'escare cogli spiriti acidi di nitro, di salmarino, di vetriuolo, o co' cauflici attuali, avvertendo sempre, che la loro azione non fi flenda fino alle parti vive .

272. Dopo che si saranno, separate quelle Metodo di carni morte, della porzione di cancrena, che vi rimane, bisogna aspettare, che la natura faccia la separazione da se stessa con una suppu- suppuratiorazione purulenta: e allora fi useranno que' digestivi, e que' cataplasmi, che abbiamo proposti sul fine dell' antecedente paragrafo (257). Nè abbiate fastidio, se questa separazione alcune volte tardasse a prodursi, poiche sonvi os-

do facciafa

<sup>(</sup>c) Vedafi pure lo Swieten ne' fuoi Commentari agli aforifmi dello stesso Borranve aforismo 429. tom. 1. pag. 758.

fervazioni, ch' ella abbia tardato per molti me
6. Se in una parte, ove non fi poteffe fare

8 amputaçione, vi fuccedeffe la carie, o la ejficcazione dell'offo, se ne proccurerà la separazone con que mezzi, che accenneremo altrove

(a). Ma quando in un articolo, essentiale della cancrana, si vedesse la parte viva sopra
quel solco, che la distingue dalle parti morte,
elastica, non troppo turgida, e con una leggiere infammazione, la quale persiste, e promette una supparazione purulenta dall' estremità
delle carni vive, allora il Cerusico potrà determinarsi a fame l'amputazione.

Cura della cancrena prodotta da diferro di nutrimen-

273. Se la cancrena è stata prodotta per difetto di nutrimento, ciò dipendendo o dalla forza vitale, che diviene languida, ed inerte, come nella tabe senile, o da un vizio organico, che ha compresse, indurite, incallite, o fatte offee le arterie di qualche membro, poco vi è da sperare. Si nutrirà il malato con cibi di facile digestione, e di buon sugo, il quale possa produrre un chilo sottile, e spiritoso, che presto ristori, e nutrisca, come sono i brodi di pollo, di colombo, di pernice, e di altri fimili volatili montani: fi ungerà la parte inaridita con olio di mandorle amare, di lombrichi, di costo, di cera, e simili, fomentandola poi con qualche decozione aromatica, come di foglie di maggiorana, di scordio, di serpillo, di bacche di ginepro, di lauro, di semi di senapa bolliti in vino bianco generoso: la quale fomentazione, perchè più facilinente penetri per quelle inerte parti, alcuni propongono

<sup>(</sup>a) Vedete nel Trattato delle ulcere il capitolo delle, ulcere con carie dell'offo.

no, che prima vi si applichino le coppette, « vi si facciano fregagioni, sino che la parte dià venti qualche poco rossa. Giovano molto più le applicazioni di visceri, o di animali caldi fumanti. Se poi vi si produce lo sfacelo, si tratterà, come abbiamo detto, per le altre cancrine.

274. Il DODART, che è stato il primo a parlare nel 1676. (a) della cancrena secca prodotta dal pane fatto colla fegala infetta dello sperone, dice . che l'orvietano , e il decotto di lupini erano stati provati utili, per arrestarne i progressi, e che si poteva sperare di prevenirla coll' uso degli spiriti ardenti, e degli alcali volatili. Il LANGIO, che l' ha offervata nella Svizzera negli anni 1709., e 1716. (b) scrive. che nel suo cominciamento giovarono gli emezici, i cordiali, e i sudorifici, e alla parte gli. spiritosi, e i cataplasmi risolventi: fatta poi che era, le scarificazioni, indi i digestivi animati, e le polveri aromatiche, e assorbenti: dannoso era il ber vino, il mangiar frutti, butiro, e altri alimenti di difficile digestione. E veramente le replicate sperienze dimostrarono confistere la cura esterna nel fomentar la parte cancrenata collo spirito di vino cansorato, e coll'acqua di fiori di sambuco: i cataplasmi rifolventi giovano, quando v' è infiammazione apparente, e gli aromatici, quando la pelle è divenuta livida, fecca, e dura; all'opposto ful principio, allorchè essa è semplicemente stupida, conviene avvilupparla con compresse inzuppate in un mescuglio di ugual quantità di butiro, e

Di quella prodotta dalla fegala infetta dello sperene.

<sup>(</sup>a) Vedasi il Journal des Savans di quell'anno.
(b) Vedete Caroli Nicolai Langti defriptio morborum ex esu clavorum secalinorum. Lucernae 1717, in 8.
BERTRANDI TUM. TOM. 1. N

di spirito di vino, oppure spalmare le stesse compresse col seguente unguento:

Rl. Ol. olivar lib. iij., vini albi gener. lib. 1. s. Terebinth. lib. 1., cer. flav. lib. ss., sintal. rubr. unc. ij. misc., s. s. a. unguentum.

Non si deono fare nè scarificazioni, nè amputazioni, infino a tanto che la cancrena fia affatto circoscritta, e già incominciata la suppurazione purulenta, anzi il Cerufico non dee altro fare, che ajutare la natura nella separazione delle parti morte dalle vive, e neppur essere troppo follecito in ciò fare. La cura interna fi principierà dall' emesico, o da qualche purgante, onde nettare le prime strade; poi si farà bere all' ammalato l'infusione di fiori di camomilla, e di fambuco, entro cui sciolto fiasi uno, o due ottavi di triaca, e se il polso è concentrate, si useranno i diaforetici ancor più forti, come il fal volatile di corno di cervo, il fale ammoniaco, la polvere temperante dello Sthal ec. La china-china, che sovente ha fatto tanto bene nelle altre cancrene (257), niente ha giovato in questa: piuttosto qualche vantaggio si è ricavato dagli acidi sì vegetabili, che minerali; nè inutile fu la cavata di sangue nel principio del morbo, almeno per calmare i dolori,

Nota da aggiungerfi alla pag. 156. della feconda Parte.

(\*) Alla pag, 334, della Storia del Iv. Tom. della Società Reale di Medicina di Parigi leggefi la feguente ricetta comperata dal Re di Francia dalla Vedova del signor Weisse, il quale, mentre vivea, ne faccora uni feretto:

### RIMEDIO ANTILATTEO.

\*\* Aithholoch. rotund.,
ratic filic ma.,
calth. vincen.,
pefi.ar.
folior. hyperic., dum floret,
vinc., pervinc.,
vinc., pervinc.,
vinc., pervinc.,
vinc., verben.

Folior., & flor. ferpyll.,
primul. veris, vifc. quercin.,
laurcol., pshybod. quercin.,
gallii lutei, flor. ui.,
radic., ferophular. maior.

Dopo aver contuse le radici, e mescolare tutte queste piante insieme, se ne prende, quando se ne vuol far uso, una dramma, cui si aggiunge da mezza dramma fino a due, fecondo la forza, e il temperamento dell' ammalata, di fal d' Inghilterra, e meziza dramma di follicoli di fenna per le perfone delicate, oppure mezza dramma di foglie per le più robufte. Si mette il tutto in infusione per due ore a un fuoco moderato in un quartino di fiero di latte depurato dentro un vafe di terra ben chiufo: fi cola poi l'infusione, e si divide in due dosi uguali da prendersi a un' ora di distanza l'una dall' altra. Un' ora dopo aver presa l'ultima dose, l'ammalata può mangiare una leggiere zuppa al brodo. Questo rimedio vuol esser continuato per quaranta giorni osservando in tal tempo una regola esatta nel vitto, coll'aftenersi dalle cose salare, dagl'intingoli, dall' infalata, dai frutti crudi, e dai latticini, e bevendo vino inacquato: ogni otto giorni bisogna prescriverle un purgante composto di due once, e mezzo di manna, e mezz'oncia di fal d'Inghilterra sciolti nell' infusione di cicoria selvatica, e di cersoglio. Il giorno

della purga si sospende l'uso dell'altro rimedio, come pure nel tempo, che colano i mestrui.

I Commessari deputati dalla Società Reale a provarlo fu diverse donne affette da inzuppamenti lattei. riferirono, che questo rimedio produce costantemente più dejezioni lungo la giornata, nelle quali sovente si osservano dei grumi di latte ugualmente che nelle urine, e che l'hanno sperimentato molto falutare. Avvertiscono però, che non se ne dee sar uso, se non quando o quegl' inzuppamenti non sono accompagnati da alcuna instammazione, o questa è già calmata coll'uso degli attemperanti, e antistogistici. Vogliono, che 'l sal d' Inghilterra si adoperi alla dose di sola mezza dramma, o al più di una dramma per volta, perchè, a dose maggiore, e continuatone l'uso per lungo tempo, riesce troppo purgante, e dannoto. Allo 'ncontrario quelle leggieri evacuazioni continuate non indeboliscono in nessun modo, anzi accrescono l'appetito. Vorrebbero pure, che la formola fosse resa più semplice in questo modo:

R. Summit et. florent. Jambuc. gallii lutei , hypericon. ,	a scrupul. j.
Folliculor. fenn.,	a drachm. fs.

. N. B. In vece del Sal d'Inghilterra fi può usare il nostro Sal di Canale, che ha la stessa virtù.

# INDICE

Degli Articoli contenuti in questo primo Tomo .

De hepatis abfceffibus capitis vulneribus fupervenientibus	97 133 188 198
Ragionamento fulla viva, e lagli fludj del BERTRANDI Orazione fopra gli fludj per la chipingia. Hepatis Deferiptio De hepatis ablicefibius capitis vulneribus fupervenientibus. Apologia della pre. dente Diferrazione PARTE SECONDA. Difcorfo preliminare al Trattato de Tumori.	97 133 188 198
BERTRANDI Orazione fopra gli fludj per la chieurgia Hepatis Deferipito De hepatis abicefibus capitis vulneribus fupervenientibus Apologia della pre. dente Differrazione PARTE SECONDA. Difcorfo preliminare al Trattato de Tumori.	97 133 188 198
Hepatis Descriptio  De hepatis abicessibus capitis vulneribus supervenientibus  Apologia della pre. dente Dissertazione  PARTE SECONDA.  Discorso preliminare al Trattato de Tumori.	97 133 188 198
Hepatis Descriptio  De hepatis abicessibus capitis vulneribus supervenientibus  Apologia della pre. dente Dissertazione  PARTE SECONDA.  Discorso preliminare al Trattato de Tumori.	88
De hepatis abicefitibus capitis vulneribus fupervenientibus  Apologia della pre. dente Differtazione  PARTE SECONDA.  Difcorfo preliminare al Trattato de Tumori.	88
fupervenientibus  Apologia della pre. dente Dissertazione  PARTE SECONDA.  Discorso preliminare al Trattato de Tumori.	98
Apologia della pre dente Disserzione  PARTE SECONDA.  Discorso preliminare al Trattato de Tumori .	
Discorso preliminare al Trattato de Tumori .	ı
	I
De' tumori in penerale	
	I
De tumori classe prima, che contiene i tu-	
mori umorali	17
De' tumori infiammati in generale	18
Del flemmone	29
Del bubone	42
Dell' infiammazione delle tonsille, e dell'	_
uvola	51
Della infiammazione delle mammelle .	64
De tubercoli infiammatorj	71
Del panereccio	76
Della risipola	88
Del carboncello	98
Degli ascessi interni in generale 1	06
del cranio 1	09
	12
dell' addomine	20
delle natiche, e della cofcia . 1	46
Degli afcessi lattei	48
Della cancrena	
Della cancrena umida 1	56
Della cancrena secca	

#### PARTE PRIMA.

Pag. 74. lin. 18. colombara colobomata. Pag. 78. lin. 4, in hifiribus in his rribus. Pag. 30. Fidatici alla memoria abbiam prefo un leggier equivoco nell' eipofizione della recoir Poarsau circa gli alcefi del fegato, il qual equivoco è riparabo dall' Apologia del Berhandi pag. 188. Pag. 193. lin. 28. abrillitis abreefits.

## PARTE SECONDA.

'Alla pag. 36. note (a), e (b) aggiunguf: Vedanfi pure i numeri 469., 470., e 471. di quefto Trataro.

## Imprimatur

- Fr. VINCENTIUS MARIA CARRAS Ord. Præd., S. T. M., & Vic. Gen. S. Off. Taurini.
- V. BELLARDI Med. Fac. Prior, & Regens.

V. Se ne permette la Stampa.

GARRETTI DI FERRERE per la Cran Cancellaria.

## VITTORIO AMEDEO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOJA, DI

MONFERRATO, E PRINCIPE DI

A Fratelli Giuseppe, Giacomo, e Stefano Reycends Libraj nella Città di Torino ci hanno rappresentato il loro defiderio di dare alle Stampe i Trattati, ed Opere del fu Profesiore di Chirurgia nella Nostra Università, e Regio Cerusico Ambrogio Bertrandi, le quali con gravi fpese sarebbe loro riuscito di far compilare, e ridurre da parecchi Manuscritti dal medesimo lasciati, con avergli eziandio fatti illustrare di molte importanti, ed utili aggiunte, e note per proccurare dal canto loro in una così interessante materia un vantaggio agli Studenti di Chirurgia non meno, che al Pubblico; e di stampare altresi una nuova Edizione del Dizionario Italiano-Francese . e Françese Italiano dell' Alberti , arricchira di molte utilissime addizioni, e ridotta ad una pressocchè totale perfezione. E ficcome qualora fossero in progresso le suddette Opere ristampate, e vendute da altri Libraj, od introdotte dal fuori Stato, verrebbero i Ricorrenti a perder il frutto delle loro fatiche, e delle considerevoli spese, come sovra, fatte, Ci hanno supplicati in vista dell'utilità, che può rifultare al Pubblico dall' Edizione delle medefime ec. Epperò colle presenti di Nostra certa scienza. e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Configlio, abbiamo accordato, ed accordiamo fenza pagamento di finanza alli prenominati Mercanti Librai Giuseppe, Giacomo, e Stefano Fratelli Reycends il privilegio privato pendenti anni quindici da cominciare dalla data delle presenti di far stampare da quello Stampatore, che verrà da effi nominato, le Opere del fu Professore di Chirurgia Ambrogio Bertrandi ed il Dizionario dell' Alberti Francese-Italiano, e Italiano-Francese; inibendo a chiunque altro ne' Nostri Stati di Ramparli, ristamparli, o farli flampare fotto il medefimo, od altro titolo, oppure d'introdurli, fmaltirli, o venderli nel cafo, che veniffenisseno Rampati, suori Stato; e ciò tutto sotto la pena della perdita del libri, i quali cederanno a' Supplicanti, e di cinquanta scudi al Fisco Nostro applicandi per ogni contravvenzione, mandando a chiunque sia spediente di offervare, e fare offervare le presenti, che ral è Nostra mente. Dat. alla Veneria li nove del mese di Maggio l' Anno del Signore mille settecento ottanta sei, e del Regno Nostro il decimo quarto.

## V. AMEDEO.

V. LANFRANCHI PP. e Reg. V. ADAMI di CAVAGLIANO. V. DI CRAVANZANA.

CORTE.

Registrata al Controllo Generale li 16. Maggio 1786. Reg-69. Patenti a 22.

NASI.

TORINO.

DALLA STAMPERIA D'IGNAZIO SOFFIETTI.





